



COMUNI DI SAN SEVERO - LUCERA
PIETRAMONTECORVINO - TORREMAGGIORE
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
PROVINCIA DI FOGGIA



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA

D.Lgs. 387/2003

PROCEDIMENTO UNICO
AMBIENTALE (PUA)

VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE (VIA)

D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. (Art.27)
"Norme in materia ambientale"

PROGETTO

FENICE

DITTA

NVA Fenice S.r.l.

REL25

Titolo dell'allegato:

SIA
Componenti Ambientali
Ecosistemi-Habitat-Flora-Fauna

0	EMISSIONE	06/02/2024
REV	DESCRIZIONE	DATA

CARATTERISTICHE GENERALI D'IMPIANTO

GENERATORE

IMPIANTO

- Altezza mozzo: fino a 175 m
- Numero generatori: 51
- Diametro rotore: fino a 172 m
- Potenza complessiva: fino a 367,2 MW
- Potenza unitaria: fino a 7,2 MW

Il proponente:

NVA Fenice S.r.l.
Via Lepetit, 8
20045 Lainate (MI)
nvafigurella@legalmail.it

Il progettista:

ATS Engineering srl
P.zza Giovanni Paolo II, 8
71017 Torremaggiore (FG)
0882/393197
atseng@pec.it



DI GIANVITO
EUGENIO
12.03.2024
17:07:43
GMT+01:00

L'Ingegnere responsabile:

Ing. Eugenio Di Gianvito
atsing@atsing.eu

Il tecnico Naturalista/Faunista:

Michele Zullo



FENICE		
IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 51 AEROGENERATORI PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 367,2 MW UBICATO NEI COMUNI DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA - PIETRAMONTECORVINO - SAN SEVERO - LUCERA - TORREMAGGIORE	Data:	06/02/2024
	Revisione:	1
	Codice Elaborato:	REL 25
Società:	NVA Fenice S.r.l.	

Elaborato da:	Data	Approvato da:	Data Approvazione	Rev	Commenti
Sig. Michele Zullo	06/02/2024	ATS Engineering S.r.l	06/02/2024	1	

Sommario

PREMESSA.....	3
INTRODUZIONE	3
DESCRIZIONE DEL PROGETTO	5
UBICAZIONE	6
PAESAGGIO	11
USO DEL SUOLO	12
METODOLOGIA E METODI DI STUDIO	12
PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO	14
S.I.A (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE) E V.I.A. (VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE)	14
EUROPEO, NAZIONALE E REGIONALE RETE NATURA 2000	15
QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA SU PIANI/PROGETTO	16
PRINCIPALI RIFERIMENTI COMUNITARI	17
PRINCIPALI RIFERIMENTI NAZIONALI.....	18
NORMATIVA REGIONALE PUGLIA.....	19
COMPONENTI AMBIENTALI.....	21
ECOSISTEMI	21
HABITAT	27
VEGETAZIONE	32
FLORA.....	35
FAUNA	75
INTRODUZIONE	76
STRUTTURA DEL TERRITORIO	77
STATUS FENOLOGICO DELLE SPECIE FAUNISTICHE INDIVIDUATE ALL'INTERNO DELL'AREA DI STUDIO.....	108
STATUS LEGALE DELLA FAUNA PRESENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI STUDIO.....	130
STIMA DEGLI IMPATTI TRA OPERE DI PROGETTO E COMPONENTI.....	142
ECOSISTEMI – HABITAT - FLORA – FAUNA.....	142
AZIONI DI PROGETTO.....	146
FASE DI CANTIERE E DI DISMISSIONE.....	146
FASE DI ESERCIZIO.....	146
STIMA IN DETTAGLIO, DEGLI IMPATTI DIRETTI ED INDIRETTI, VALUTATA PER OGNI SINGOLA COMPONENTE PER LA FASE DI CANTIERE, DI ESERCIZIO E DI DISMISSIONE.....	152
ECOSISTEMI	152
HABITAT	159
CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SUGLI HABITAT INDIVIDUATI ALL'INTERNO DELL'AREA DI STUDIO	166
FLORA.....	166
CONSIDERAZIONI SU IMPATTI FLORA	329
FAUNA	330
CONSIDERAZIONI FINALI.....	440
RIEPILOGO DELLA STIMA DEGLI IMPATTI.....	445
CONCLUSIONI	448


ATS Engineering

Parco Eolico

“FENICE”

SIA

Componente Ecosistema – Habitat– Flora - Fauna



2024

PREMESSA

La società “NVA Fenice S.r.l.” è promotrice di un progetto, denominato “Fenice”, per l’installazione di un Impianto Eolico nei comuni di San Severo, Lucera, Pietramontecorvino, Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia, in provincia di Foggia, su di un’area che si è rivelata interessante per lo sviluppo di un impianto eolico. Allo scopo di identificare una soglia di ammissibilità dell’intervento proposto, consistente nella installazione di aerogeneratori eolici tripala e nella realizzazione delle opere accessorie per l’allacciamento alla rete elettrica esistente, si sviluppa una procedura di “impatto ambientale” finalizzata alla valorizzazione analitica delle caratteristiche dell’intervento e dei fattori ambientali coinvolti. Lo studio è finalizzato ad appurare quali sono le caratteristiche costruttive, di installazione e di funzionamento degli aerogeneratori eolici, gli impatti che questi e la relativa gestione ed esercizio possono provocare sull’ambiente, le misure di salvaguardia da adottare in relazione alla vigente normativa in materia. Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto eolico composto da 51 aerogeneratori ognuno con potenza nominale attiva fino a 7,2 MW, per una potenza complessiva fino a 367,20 MW, da installare nei comuni di San Severo, Lucera, Pietramontecorvino, Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia, in provincia di Foggia, commissionato dalla società NVA Fenice S.r.l.

INTRODUZIONE

L’analisi delle componenti ecosistemiche-floro-faunistiche di una determinata area, risultano indispensabili, insieme ad altre indagini ambientali, per la conoscenza delle dinamiche evolutive, dei rapporti e del modo in cui interagiscono tra loro i vari organismi viventi presenti nella stessa area, oltre che degli equilibri che in essa si sono stabiliti e che la caratterizzano. Tutto questo diventa necessario per la corretta programmazione e gestione di interventi da compiere su di un territorio. L’ubicazione del parco eolico nel contesto territoriale, ha indotto ad assumere come area di studio di riferimento, quella potenzialmente interessata dagli effetti diretti ed indiretti, generati dalle azioni cantiere, di esercizio e di dismissione dell’opera.

Sono state prese in considerazione due aree, quella di installazione delle strutture necessarie al funzionamento del parco eolico, denominata Area di Impianto (AIL Area di Impatto Locale con un buffer di circa mt. 516, diametro del rotore X 3), dove vengono

collocate le turbine e le opere accessorie, soggetta ad interferenze dirette tra opere di progetto e componenti ambientali, e quella denominata Area Vasta di Indagine con un buffer di circa 13,05 chilometri (50 volte l'altezza massima di un aerogeneratore), posta ai lati del parco eolico, soggetta a probabili impatti indiretti. L'Area Vasta insieme all'Area di Impianto, costituiscono l'Area di Studio. Le aree agricole dominano in modo assoluto sulle formazioni naturali. Sia l'area d'intervento che l'area vasta considerata nel presente studio, si presentano di scarso valore naturalistico/ambientale; uniche aree con caratteristiche naturali presenti all'interno dell'area di studio, sono ubicate a margine dell'area di studio. Le aree naturalistiche più sensibili riscontrate in area di studio sono, la vallata del fiume Fortore situata ad Nord-Ovest dell'area di impianto a circa km 11,00 dalla turbina più vicina, e il bosco di Monte Sambuco a Ovest dell'area di impianto a circa km. 8,00 dalla turbina più prossima.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'area di intervento del progetto Fenice è ubicata a nord-ovest del capoluogo di provincia Foggia. Il comune interessato dal progetto sono i comuni di San Severo, Lucera, Pietramontecorvino, Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia, in provincia di Foggia. Tutta l'area dell'intervento è situata ad un'altitudine compresa tra 50 e 200 metri sul livello del mare. L'energia cinetica del vento, raccolta dalle pale rotoriche delle turbine, verrà trasferita attraverso un riduttore di giri al relativo generatore e trasformata in energia elettrica. L'energia elettrica prodotta verrà poi trasferita attraverso il sistema di interconnessione elettrico alla Rete di Trasmissione Nazionale.

L'impianto eolico è caratterizzato dagli elementi di seguito elencati:

- N° 51 aerogeneratori con potenza nominale fino a 7.2 MW con altezza a mozzo fino a 175 m e diametro fino a 172 m e relative fondazioni;
- Potenza totale dell'impianto 367,20 MW;
- N° 51 piazzole per il montaggio, per l'esercizio e la manutenzione degli aerogeneratori;
- Cavidotto interrato interno AT a 36kV che collega gli aerogeneratori in gruppi e i gruppi alla cabina di smistamento sita all'interno della stazione di elevazione;
- Cavidotto interrato esterno AAT a 380kV per connessione della stazione di elevazione alla sottostazione Terna sita a Palmori, nel territorio di Lucera (FG);
- Una stazione di elevazione;
- Un locale misure;
- Rete telematica di monitoraggio interna per il controllo dell'impianto mediante trasmissione dati via modem.

Lo studio è volto a verificare, individuare gli ecosistemi, habitat, specie floristiche e faunistiche all'interno dell'area di studio, e valutare successivamente, i principali effetti ed interferenze, diretti ed indiretti, che l'opera di progetto potrebbe avere sull'integrità delle componenti ambientali e biodiversità presenti nell'area.


UBICAZIONE

L'area di studio è localizzata in Provincia di Foggia, nel settore Nord-occidentale della Regione Puglia. L'area di intervento del progetto Fenice è ubicata a Nord-Ovest del capoluogo di provincia Foggia (km 20). Il progetto ricade nel comune San Severo, Lucera, Pietramontecorvino, Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia, tutti in Provincia di Foggia. Tutta l'area dell'intervento è situata ad un'altitudine compresa tra 50 e 200 metri sul livello del mare, nella parte settentrionale del Tavoliere. Si presenta quasi totalmente interessata da colture agricole, sia erbacee (seminativi) che arboree (uliveti). Al suo interno esiste una fitta rete di strade di collegamento tra i comuni presenti sul territorio, autostrada, strade statali, strade provinciali, comunali, interpoderali, tratturi di minore ampiezza, che servono a collegamento tra i vari appezzamenti di terreni. Il territorio è tipico delle aree di confine tra le zone pianeggianti ed i primi rilievi collinari pre-Appenninici. Il territorio si presenta con grandi estensioni di seminativi e colture arboree/arbustive inframezzate da piccoli lembi residui di aree boscate. La monotonia dell'ecomosaico agricolo è interrotto di tanto in tanto da alvei di canali, soprattutto a portata stagionale, con sporadici segni di presenza di vegetazione igrofila-palustre. Margini stradali, scarpate ed incolti, costituiscono delle piccole aree con vegetazione naturaliforme, utilizzate dalla fauna presente, per spostamenti locali. La vallata del fiume Fortore, situata verso Nord-Ovest dell'area di impianto, risulta, insieme all'area boschiva di Monte sambuco ad Ovest dell'area di impianto, quella con la maggiore valenza naturalistica di tutta l'area di studio. L'area di impianto è ubicata completamente in area agricola a seminativi intensivi, dove la presenza dell'uomo e delle sue attività è notevole durante tutto l'arco dell'anno. L'area vasta interessata dal presente studio, presenta le stesse caratteristiche ambientali, agrosistemi ad agricoltura intensiva presente su tutto il territorio. Il paesaggio dell'area di progetto si presenta monotono e ripetitivo, dove è predominante l'habitat agricolo inframezzato da edifici urbani, rurali ed industriali. I filari di siepi che dividono le colture arboree, gli alberi lungo le vie di comunicazione, la vegetazione spontanea presente lungo i canali e bordi della rete viaria, costituiscono la modesta rete di corridoi ecologici utilizzati dalla fauna per gli spostamenti locali.

*Rete stradale rientrante all'interno dell'area di Studio nel buffer di circa Km 13,05 dall'
Area di Progetto*

Parco Eolico Fenice Rete viaria in AVI	
Strada	Denominazione
<i>E 55</i>	<i>Autostrada Adriatica</i>
<i>Sp 10</i>	<i>Torremaggiore – Casalvecchio</i>
<i>Sp 109</i>	<i>Lucera – San Severo</i>
<i>Sp 11</i>	<i>Torremaggiore Casalnuovo M.</i>
<i>Sp 12</i>	<i>Torremaggiore - Lucera</i>
<i>Sp 13</i>	<i>Foggia - Torremaggiore</i>
<i>Sp 131</i>	<i>Di Santa Maria</i>
<i>Sp 134</i>	<i>Volturino – Crocetta di Motta</i>
<i>Sp 14</i>	<i>Gatti – Santa Maria</i>
<i>Sp 16</i>	<i>San Severo – Piano Devoto</i>
<i>Sp 17</i>	<i>Torremaggiore - Torrefantine</i>
<i>Sp 18</i>	<i>Circumlucerina</i>
<i>Sp 20</i>	<i>Lucera – SS 16</i>
<i>Sp 21</i>	<i>Lucera - Palmori</i>
<i>Sp 22</i>	<i>Borgo Celano</i>
<i>Sp 24</i>	<i>Ponte di Spini – Circumsanseverina Est</i>
<i>Sp 27</i>	<i>Circumsanseverina Est</i>
<i>Sp 30</i>	<i>San Severo – Torremaggiore – San Paolo Civitate</i>
<i>Sp 31</i>	<i>San Paolo Civitate - Ripalta</i>
<i>Sp 32</i>	<i>Torremaggiore – Sant’Antonio da Piede</i>
<i>Sp 35</i>	<i>Presso Masseria De Cesare</i>
<i>Sp 35</i>	<i>San Severo – Marina di Lesina</i>
<i>Sp 36</i>	<i>Apricena – San Paolo civitate</i>
<i>Sp 369</i>	<i>Appulo - Fortorina</i>
<i>Sp 46</i>	<i>Torremaggiore – Confine</i>
<i>Sp 5</i>	<i>Lucera – Ponte Fortore</i>
<i>Sp 6</i>	<i>Lucera - Castelnuovo</i>
<i>Sp 7</i>	<i>Chianconi</i>
<i>Sp 8</i>	<i>Lucera - sculgola</i>
<i>Sp 9</i>	<i>Di Ponte del Porco</i>
<i>SS 16</i>	<i>Adriatica</i>
<i>SS 16 ter</i>	<i>Adriatica (vecchio percorso)</i>
<i>SS 17</i>	<i>Foggia - Campobasso</i>
<i>SS 272</i>	<i>San Severo - Monte Sant'Angelo</i>
<i>SS 673</i>	<i>Tangenziale Est di Foggia</i>

Avi Fenice (altezza totale della turbina moltiplicato per 50 volte km 13,05)



Gli aerogeneratori sono localizzabili alle seguenti coordinate, UTM 84-33N

Parco Eolico Fenice Geolocalizzazione turbine		
<i>Torre</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>
WTG01	516393.0254	4603930.2571
WTG 02	517571.8384	4603691.5826
WTG 03	516460.2391	4602747.0303
WTG 04	517679.2421	4602086.3775
WTG 05	519143.3717	4602406.2655
WTG 06	518326.2196	4601448.5035
WTG 07	520036.0620	4602159.2094
WTG 08	519219.0457	4601316.7805
WTG 09	519716.3419	4599896.2871
WTG 10	520177.7572	4600840.3495
WTG 11	520875.4616	4601401.9469
WTG 12	522537.4461	4601144.5822
WTG 13	521474.3400	4600700.2241
WTG 14	521207.3124	4599871.4701
WTG 15	523065.7559	4599946.2699
WTG 16	523686.2439	4601099.8199
WTG 17	524830.4074	4601204.4304
WTG 18	525740.4998	4599611.4754
WTG 19	527807.3529	4599886.7130
WTG 20	526909.4697	4600081.9887
WTG 21	527298.7471	4600993.1966
WTG 22	526181.1578	4601501.8930
WTG 23	524843.7157	4603128.4324
WTG 24	525933.8332	4603745.7501
WTG 25	526920.9500	4603756.8012
WTG 26	528182.0761	4603567.9708
WTG 27	527786.5633	4602360.0982
WTG 28	531356.8174	4602581.6296
WTG 29	533500.6383	4600795.6284
WTG 30	534498.7034	4601091.3279
WTG 31	526939.1793	4604668.8268
WTG 32	530612.3060	4604503.2577
WTG 33	531293.2036	4605304.6309
WTG 34	532836.8102	4605680.6415

WTG 35	527812.6544	4606446.1660
WTG 36	526098.5737	4606355.2498
WTG 37	525871.9507	4607907.2542
WTG 38	528464.3537	4607662.3585
WTG 39	528263.3235	4609056.4167
WTG 40	527261.2247	4608530.6142
WTG 41	525759.3293	4609143.7849
WTG 42	526889.4404	4609625.2496
WTG 43	527786.4970	4610728.5583
WTG 44	527850.9756	4612810.0779
WTG 45	526311.1525	4612168.5844
WTG 46	526510.8806	4611208.1554
WTG 47	525600.6136	4610649.4717
WTG 48	525497.6597	4611806.6965
WTG 49	523743.0375	4610505.4303
WTG 50	522441.5784	4611851.9630
WTG 51	520843.8210	4610120.1033

Tabella Coordinate Aerogeneratori

Parco Eolico Fenice Punti sensibili in AVI			
Denominazione	Posizione <i>rispetto ad area di impianto</i>	Distanza km	Torre WTG n.
<i>San Severo</i>	<i>Sud</i>	<i>3,00</i>	<i>28</i>
<i>Torremaggiore</i>	<i>Sud-Ovest</i>	<i>4,00</i>	<i>06</i>
<i>Vallata fiume Fortore</i>	<i>Nord-Ovest</i>	<i>11,00 (tratto più vicino)</i>	<i>01</i>
<i>Torremaggiore</i>	<i>Nord</i>	<i>3,00</i>	<i>48</i>
<i>Lucera</i>	<i>Sud</i>	<i>4,00</i>	<i>19</i>
<i>Pietra Montecorvino</i>	<i>Sud-Ovest</i>	<i>6,50</i>	<i>03</i>
<i>Castelnuovo della Daunia</i>	<i>Ovest</i>	<i>6,40</i>	<i>01</i>

PAESAGGIO

Il “paesaggio” è quella parte del territorio, percepita visivamente dalle persone. Esso è costituito da tutti gli elementi naturali presenti in quella determinata area, più le varie forme che l'azione antropica ha generato su quel territorio. Il paesaggio, si deve considerare come la percezione dell'insieme degli aspetti naturali e antropici. L'assetto di un paesaggio e la sua morfologia sono stati modellati da fattori fisici, climatici, biologici, storici ed attività antropiche, sia nel tempo che nello spazio. Il paesaggio dell'area di Progetto e la maggior parte dell'area di Studio è tipico delle zone agricole pianeggianti/collinari, monotono, ripetitivo, quasi monocromatico con alternanza di colori dominanti in base al periodo dell'anno. Dal punto di vista agricolo il territorio si presenta fortemente sfruttato da colture intensive, sia arboree che seminate. I pesanti interventi antropici, a cui è sottoposto il suolo, ha fortemente compromesso la naturalità di tutto il territorio. Il Paesaggio dell'area d'intervento è abbastanza uniforme ed omogeneo, di tipo pianeggiante, dominato da coltivazioni intensive, come cereali, seminativi e colture arboree. La quasi totalità dell'area di studio, fatta eccezione per alcuni tratti della vallata del Fortore a vegetazione igrofilo-palustre, e le prime alture dei Monti Dauni, costituite da boschi a prevalenza Roverella ed incolti, è caratterizzata dal paesaggio agrario. Un fitto mosaico di particelle prodotto dagli appezzamenti di terreno delimitati da bordure di flora erbacea spontanea, da tratturi, da piccole fasce di incolto che separano in modo netto le varie colture agricole praticate. Il paesaggio agrario va inteso, in senso generale, come la forma che l'uomo, attraverso le sue attività agricole, imprime volutamente al paesaggio naturale. Rappresenta il risultato dell'interazione di vari fattori, tra i quali le caratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche di un territorio insieme alle attività agricole condotte. Durante l'anno si alternano dominanze di colori che vanno dal verde nei periodi primaverili, ai gialli degli inizi dell'estate, ai toni scuri dell'autunno. Rompono la monotonia del paesaggio agrario alcune colture agricole arboree/arbustive, e le poche aree naturaliformi esistenti lungo i corsi d'acqua presenti all'interno dell'area di studio, e lungo i bordi della fitta rete viaria esistente.

Da precisare che la componente paesaggio è riportata in questo studio, solamente in funzione del rapporto con la componente ecosistema- habitat-flora e fauna.

USO DEL SUOLO

L'area di studio comprende tutta la fascia Nord.Ovest del tavoliere della Provincia di Foggia. Il territorio è contraddistinto da ambienti basso-collinari a prevalente indirizzo agricolo, pascolativo. Tale sistema comprende i paesaggi agrari tradizionali a matrice agraria prevalente con ordinamenti cerealicoli-foraggeri asciutti (seminativi) ed irrigui (colture orticole). L'ordinamento produttivo aziendale è di tipo erbaceo; il grano rappresenta la coltura più diffusa che viene praticata sia in aziende cerealicole specializzate che in aziende ad indirizzo misto (cereali, colture industriali, orticole). La presenza o meno di acqua condiziona la tecnica di coltivazione, infatti nelle aziende asciutte è diffusa la pratica del ringrano continuo, nelle aziende irrigue la coltura orticola segue il grano nella rotazione. Negli ultimi anni si registra un processo di desertificazione dovuto, oltre che alle condizioni climatiche avverse, anche ad altri fattori quali la monocoltura (ringrano) e il pascolo continuo, che tendono a ridurre il contenuto di sostanza organica e aumentare i fenomeni erosivi. Inoltre per ottenere maggiori produzioni dai seminati, soprattutto i cereali, oltre all'utilizzo di macchinari di notevoli dimensioni, spesso sia prima che dopo il raccolto, i terreni vengono trattati con concimi e fitofarmaci erbicidi per contrastare le erbe infestanti. Tutto questo provoca l'impoverimento ed il degrado del terreno agricolo.

METODOLOGIA E METODI DI STUDIO

Dopo aver raccolto il materiale storico e bibliografico sulle componenti ambientali rilevate all'interno dell'area di studio, e su tutto il territorio circostante coinvolto dalla realizzazione del Parco Eolico Aquilone 1, si è proceduto alla verifica e raccolta sul campo dei dati naturalistici sulle componenti ecosistema-habitat-flora-fauna riguardanti il comprensorio. Successivamente si è proceduto ad analizzare e verificare l'area più ristretta, quella oggetto del presente studio. Tali ricerche si sono concentrate maggiormente verso alcune elementi delle componenti ambientali dell'area di studio, tra questi, l'Ecosistema, l'Habitat, la Vegetazione/Flora e la Fauna, comprese tutti i loro elementi caratteristici. Successivamente è stata valutata la tendenza evolutiva dell'area interessata dal Parco Eolico, con e senza infrastruttura, e il grado e probabilità di interferenze tra opere ed azioni di progetto componenti ambientali presenti. È stata valutata la stima degli impatti potenziali, diretti ed indiretti, per le componenti

maggiormente interessate dalla realizzazione dell'infrastruttura, sia in fase di cantiere, in fase di esercizio, ed in fase di dismissione dell'opera.

Lo studio delle componenti ambientali, dal punto di vista operativo, è stato condotto attraverso la ricerca bibliografica di tutti dati esistenti sull'ambiente interessato dall'area di studio; raccolta e sviluppo di tutti i dati sul campo, relativa agli ecosistema, habitat, vegetazione/flora e fauna del comprensorio, inoltre è stata fatta anche una raccolta dati, attraverso la consultazione di alcuni agricoltori e cacciatori locali.

Lo studio si è articolato attraverso:

- *individuazione degli ecosistemi presenti;*
- *stima degli impatti diretti ed indiretti sugli ecosistemi in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione;*
- *sopralluoghi ed indagini sul campo, che hanno avuto come obiettivo, quello di individuare le specie floristiche presenti o potenzialmente presenti, sul territorio, durante l'intero arco dell'anno;*
- *elenco floristico delle specie censite e quelle potenzialmente presenti sul territorio;*
- *stima degli impatti diretti ed indiretti su vegetazione e flora in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione;*
- *grado di protezione della vegetazione e flora presenti all'interno dell'area di studio;*
- *individuazione degli habitat faunistici, attraverso i quali è possibile determinare le specie faunistiche potenziali, quelle magari, che nel periodo delle indagini non erano presenti perché animali migratori, o spaventati dalla nostra presenza;*
- *stima degli impatti diretti ed indiretti sugli habitat individuati in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione;*
- *sopralluoghi ed indagini sul campo, che hanno avuto come obiettivo, quello di individuare le specie faunistiche presenti o potenzialmente presenti, sul territorio, durante l'intero arco dell'anno;*
- *il riconoscimento delle specie faunistiche censite, è stato eseguito oltre che tramite l'avvistamento diretto, anche attraverso il riconoscimento delle tracce, del canto, dei nidi, dei vari segni che ogni specie inevitabilmente lascia sul territorio;*
- *status fenologico delle specie faunistiche appartenenti a tutte le classi censite;*

- *stima degli impatti diretti ed indiretti sulla fauna in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione;*
- *status legale delle specie faunistiche censite;*
- *sviluppo di tutti i dati raccolti;*
- *conclusioni;*
- *bibliografia consultata.*

PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il presente studio coinvolge sia la Regione Molise che la Regione Puglia, di conseguenza sono state prese in considerazione sia le normative della Regione Molise che quelle della Regione Puglia.

S.I.A (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE) E V.I.A. (VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE)

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è stata introdotta in Italia a seguito dell'emanazione della direttiva CEE 377/85, in base alla quale gli stati membri della Comunità Europea hanno dovuto adeguare la loro legislazione: la direttiva ha sancito il principio secondo il quale per ogni grande opera di trasformazione del territorio è necessario prevedere gli impatti sull'ambiente, naturale ed antropizzato. Il recepimento della direttiva, avvenuto con la L. 349/86, ed i D.P.C.M. n° 377 del 10 agosto 1988 e del 27 dicembre 1988, ha fatto sì che anche in Italia i grandi progetti venissero sottoposti ad un'attenta e rigorosa analisi per quanto riguarda gli effetti sul territorio e sull'ambiente. A questi principali riferimenti legislativi se ne aggiungono altri, sempre di livello nazionale, volti a regolare specifici aspetti della VIA.

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è una procedura tecnico amministrativa finalizzata a individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull'ambiente, sulla salute e benessere umano di determinati progetti pubblici o privati, nonché di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull'ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente.

EUROPEO, NAZIONALE E REGIONALE RETE NATURA 2000

Nel 1992 con la Direttiva 92/43/CEE, definita “Direttiva Habitat”, l'Unione Europea ha ribadito l'importanza del mantenimento della biodiversità nel territorio comunitario in quanto “...nel territorio europeo degli Stati membri gli habitat naturali non cessano di degradarsi e un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato...”; per tale motivo “è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione”. Per il raggiungimento di tale obiettivo l'Unione Europea, mediante la Direttiva Habitat, ha previsto la costituzione di una Rete Ecologica Europea di siti (Zone Speciali di Conservazione) denominata Rete Natura 2000. Tale rete, costituita quindi da quelle aree ove sono localizzati habitat e specie rare (elencati negli allegati della Direttiva) “...dovrà garantire il mantenimento, ovvero all'occorrenza il ripristino, in uno stato soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nelle loro aree di ripartizione naturale”. I siti della Rete Natura 2000 costituiscono delle aree di grande interesse ambientale ove sono presenti habitat e specie, di flora e di fauna, di interesse comunitario o prioritari, la cui conservazione, da realizzarsi attraverso la designazione di aree speciali di conservazione, è ritenuta prioritaria dall'Unione Europea. A livello nazionale il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE è stato recepito con DPR 8 settembre 1997, n. 357. Con la Direttiva 97/62/CEE è stata modificata la Direttiva 92/43/CEE in seguito ai progressi in campo tecnico e scientifico. Tale nuova direttiva è stata recepita con DM 20 gennaio 1999. Successivamente è stato approvato il DPR 12 marzo 2003, n.120 di modificazione ed integrazione al DPR 357/97. Con DM del 25 marzo 2004 sono stati approvati i Siti della regione biogeografica alpina. Con Decisione della Commissione del 7 dicembre 2004 (Decisione 2004/798/CE) sono stati approvati i Siti relativi alla regione biogeografica continentale (di cui fa parte il SIC oggetto di Studio di Incidenza). Infine, con Decisione della Commissione del 19 luglio 2006 (Decisione 2006/613/CE) anche i Siti della regione biogeografica mediterranea sono stati definitivamente approvati. Il quadro complessivo dei SIC e delle ZPS presenti nelle regioni italiane, è riassunto con il DM 30 marzo 2009 e il DM 19 giugno 2009 dove vengono aggiornati gli elenchi dei SIC (e delle Zone di Protezione Speciale, istituite sulla base della Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 “concernente la conservazione degli uccelli selvatici” del territorio nazionale.

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA SU PIANI/PROGETTO

Nel contesto delle opere pratiche finalizzate alla tutela dei siti della Rete Natura 2000 (territori spesso sprovvisti di qualsiasi grado di protezione formale) le procedure di Valutazione di Incidenza rappresentano tra gli elementi più importanti. In tali procedure lo Studio di Incidenza, per un piano o un progetto, è finalizzato a verificare se vi siano “incidenze” significative su un SIC, un pSIC o una ZPS, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedimento si applica sia agli interventi previsti entro i confini delle aree Natura 2000 sia per quelli che, pur esterni ad esse, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione della matrice ambientale nel sito in esame. Dal punto di vista normativo la procedura di valutazione di incidenza è stata introdotta dall’art. 6 della Direttiva Habitat, dal DPR 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione nazionale, ma soprattutto dall’art.6 del DPR 30 maggio 2003, n. 120, che ha sostituito l’art.5 del DPR precedente. Tali riferimenti sono implementati dalla L.R. 7/2004. La Direttiva 92/43/CEE afferma, all’art. 6, come “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. ...”. Il DPR 120/2003 dopo aver ricordato come “nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei Siti di Importanza Comunitaria” (art. 6, comma 1) dichiara che “I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.” Relativamente alla significatività dell’incidenza la “Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva Habitat (Commissione Europea, DG Ambiente, 2000)” fornisce il seguente contributo: “Il concetto di ciò che è significativo deve essere interpretato in modo obiettivo. Al tempo stesso, bisogna determinare la significatività in relazione alle particolarità ed alle

condizioni ambientali del sito protetto cui si riferisce il piano o progetto, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione del sito.” Come si evince da molti passaggi della Guida all’interpretazione dell’articolo 6, sopra ricordata, tale valutazione o studio di incidenza deve essere svolto prima della realizzazione dell’intervento; valga per tutti il seguente passaggio: “è anche importante il fattore tempo. La valutazione è una tappa che precede altre tappe alle quali fornisce una base: in particolare, l’autorizzazione o il rifiuto di un piano o progetto.” Secondo l’interpretazione ufficiale dell’art.6 della Direttiva 92/43/CEE, contenuta nella Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva Habitat: “La probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all’interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto. La procedura dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, è attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all’interno di un sito protetto, ma anche da quelli al di fuori di esso”. Con D.G.R. 14 marzo 2006, n. 304 sono stati definiti indirizzi in attuazione, in particolare, dell’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

PRINCIPALI RIFERIMENTI COMUNITARI

- Direttiva del Consiglio del 02.04.1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE – Direttiva UCCELLI), GU. CE n. 103/25.04.1979.
- Direttiva della Commissione del 6.03.1991 che modifica la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio (Direttiva UCCELLI) (91/244/CEE), pubblicata sulla GU.RI., II serie speciale, n. 45/13.06.1991 (con le modifiche degli allegati).
- Direttiva del Consiglio del 21.05.1992 (92/43/CEE – Direttiva HABITAT) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU.CE n. 206/22.07.92 (con gli allegati).
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, GU.CE. n. 197/21.07.2001.
- Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, Bonn il 23.06.1979.

- Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa, Berna il 19.09.1979.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NAZIONALI

- Legge n. 394/06.12.1991 – Legge quadro sulle aree protette, Suppl. n. 83 GU.RI n. 292/13.12.1991. } Legge n. 157/11.02.1992 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, GU.RI n. 46/25.02.1992.
- D.P.R. 12.04.1996 e successivi aggiornamenti, Atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'Art. 40, comma 1 legge 22.02.1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di impatto ambientale.
- D. P. R. 357/08.09.1997 – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, Suppl. n. 219/L GU.RI n. 248/23.10.1997.
- D. M. Ambiente del 20/1/1999, di modifica degli allegati A e B del D.P.R. n. 357/97 in attuazione della Direttiva 97/62/CEE.
- Decreto Ministero dell'Ambiente 03.04.2000, Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, Suppl. GU.RI n. 95/22.04.2000.
- D.P.R. 1/12/2000 n. 425, regolamento recante norme di attuazione della Direttiva 97/1409/CE che modifica l'allegato 1 della direttiva concernente la protezione degli uccelli selvatici.
- D. P. R. 12/03/2003 n. 120 – Regolamento recante modifiche integrazioni al Decreto Presidente Repubblica n. 357/08.09.1997 – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, Suppl. n. 219/L GU.RI n. 248/23.10.1997.
- D. M. Ambiente e Tutela del Territorio 25/3/2005 G. U. n. 157 del 8/7/2005. Elenco dei proposti Siti d'Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE.

- Decreto Ministero Ambiente 17/10/2007 – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).
- Sentenza Corte Costituzionale n. 425/27.10-10.11.1999, Suppl. GU.RI n. 46 del 17.11.1999.
- Deliberazione Conferenza Stato-Regioni n. 993/20.07.2000, Approvazione del III aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dall'Art. 3, comma 4, lettera c) della legge 0.12.1991 n. 394 e dell'Art. 7, comma 1, Allegato A, del D. Lgs. n. 281/28.08.1997, Suppl. GU.RI n. 19/24.01.2001.

NORMATIVA REGIONALE PUGLIA

- DGR n. 981 del 13.06.2008 "Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia della Regione Puglia - 'Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica'" (BURP n. 117 del 22.7.2008).
- L.R. 14 giugno 2007, n. 17 "Disposizioni in campo ambientale anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale".
- DGR 26 febbraio 2007, n. 145 "Adeguamento zone di protezione speciale – Procedura d'infrazione contro la Repubblica Italiana per insufficiente perimetrazione delle Zone di Protezione Speciale – causa C-378/01" (BURP n. 34 del 7.03.2007).
- DGR 14 marzo 2006, n. 304 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del DPR n. 120/2003" (BURP n. 41 del 30.03.2006).
- DGR. 8 agosto 2002, n. 1157 "Revisione tecnica delle aree pSIC e ZPS".
- L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii. "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale".
- DGR 8 agosto 2002, n. 1157 "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d'atto e trasmissione al Ministero dell'Ambiente" (BURP n. 115 dell'11.09.2002).

- DGR 23 luglio 1996 n. 3310 "Progetto Bioitaly del Ministero dell'Ambiente e della Unione Europea, siti di importanza comunitaria proposti dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 92/43/CEE".
- R.R. 22 dicembre 2008, n. 28 "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007".
- R.R. 18 luglio 2008, n. 15 "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni" (BURP n. 120 del 25.07.2008).
- R.R. 4 settembre 2007, n. 22 "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni" (BURP n. 126 del 10.09.2007).
- R.R. 28 settembre 2005, n. 24 "Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)" (BURP n. 124 del 4.10.2005).
- Regolamento Regionale 4 ottobre 2006 n. 16 "Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia".
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2012, n. 2122 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale".
- DGR 26 aprile 2010, n. 1084 - Piano di Gestione dei SIC/ZPS del Fiume Fortore approvato - Progetto LIFE05NAT/IT/000026 "Azioni urgenti di conservazione per i pSIC del Fiume Fortore"
- Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n.1435 "Piano Paesaggistico territoriale Regionale" (PPTR).

COMPONENTI AMBIENTALI

Ecosistema – Habitat – Flora - Fauna

ECOSISTEMI

La comunità di organismi viventi che vivono in una determinata area, insieme all'ambiente abiotico, costituiscono il cosiddetto Ecosistema. I sistemi ecologici sono unità funzionali che comprendono tutte le comunità biotiche, cioè tutti gli organismi che vivono e interagiscono in una determinata area, e le componenti ambientali abiotiche cioè quelle non viventi. Si tratta quindi di relazioni di varia natura, relativamente stabili, che riflettono l'adattamento di un gruppo di popolazioni vegetali e animali tra loro ed in rapporto all'ambiente. In ognuno di essi si stabiliscono rapporti di reciproca dipendenza attraverso lo scambio di energia tra tutti gli organismi viventi, instaurando un rapporto diretto tra le varie specie floristiche e faunistiche esistenti. Il concetto di ecosistema individua un determinato spazio fisico nel quale le componenti biotiche ed abiotiche interagiscono e si relazionano; per componenti biotiche si intendono tutti gli organismi animali (zoocenosi) e vegetali (fitocenosi), mentre per componenti abiotiche le caratteristiche fisiche e chimiche del sito (biotopo). Una determinata specie animale e/o vegetale ha bisogno di ben precise caratteristiche fisiche e/o chimiche e biologiche (ad es. presenza di prede idonee per gli animali carnivori), per poter vivere in un dato ambiente. Nell'area vasta di studio, è possibile caratterizzare essenzialmente gli ecosistemi trattati di seguito. Ogni ecosistema può essere più o meno ampio, i confini tra Ecosistemi non sono mai ben delineati e riconoscibili. Parlare di veri e propri ecosistemi diventa difficile in relazione alla limitata estensione dell'area oggetto di studio, oltre alla quasi omogeneità della stessa. In ogni caso nel suo ambito sono stati individuati le seguenti tipologie di ecosistemi. I caratteri principali delle “*macchie ecosistemiche*” sono connessi soprattutto all'influenza antropica, cioè all'azione di trasformazione forzata degli ambienti naturali, effettuata dall'uomo; intenso utilizzo della zona a scopi agricoli; notevole presenza di infrastrutture viarie, industriali.

Caratterizzazione della struttura degli ecosistemi presenti:

- ***Ecosistema Agricolo***
- ***Ecosistema Prativo-Erbaceo***
- ***Ecosistema Igrofilo/Palustre***

- **Ecosistema Forestale (Boschi/Macchia Mediterranea)**
- **Ecosistema Antropico**

Applicando un grado di valore, ad ogni singolo ecosistema riscontrato all'interno dell'area di studio, in relazione alla propria importanza e funzionalità ecologica, naturalità e biodiversità, da 1 a 5, dove 1 è la naturalità più bassa dell'ambiente, mentre 5 è quella più alta, possiamo stabilire che:

- *Ecosistema Agricolo - 2*
- *Ecosistema Prativo/Erbaceo - 3*
- *Ecosistema Igrofilo/Palustre - 4*
- *Ecosistema Forestale (Boschi/Macchia Mediterranea) - 4*
- *Ecosistema Antropico - 1*

Nella scala dei valori l'Ecosistema Forestale e quello igrofilo/palustre, risultano essere quelli con la più alta naturalità all'interno dell'area vasta di studio. Il grado di naturalità, in generale, viene attribuito alle aree, sia pure con superfici limitate, dove sussistono ancora elementi naturali o naturaliformi, che più si avvicinano allo stato di aree naturali ed ambienti ancora non coinvolti dalle azioni antropiche. A Nord-Ovest dell'area di impianto, a margine dell'AVI è presente la vallata del fiume Fortore, il quale rientra soltanto per una piccola porzione, mentre a Sud-Ovest si trovano e le prime alture dei Monti Dauni, costituite da boschi a prevalenza Roverella ed incolti. Queste due aree, sia pure con superfici ridotte ed a margine dell'AVI, risultano essere quelle con il maggior grado di naturalità presenti all'interno dell'area di studio.

L'Ecosistema Agricolo occupa la maggior parte della superficie dell'area di studio, interessa tutte le aree coltivate, sia esse a seminativi (soprattutto frumento) che colture arboree (oliveti, alberi da frutto), vigneti e colture orticole. Questo ecosistema occupa la quasi totalità dell'area di Progetto. In questo ecosistema troviamo specie vegetali comuni con basso valore naturalistico (malva, tarassaco, cicoria, finocchio e carota selvatica, cardi e altre specie spinose come eringi o i fichi d'india che bordano le strade), stesso discorso vale per le presenze faunistiche, le quali sono tipiche di ecosistemi antropizzati. La fauna presente è quella comune, abituata, ormai da tempo, a convivere con la presenza dell'uomo e delle sue attività.

L'area di progetto insiste totalmente all'interno di questo ecosistema

La tendenza futura ipotizzabile senza la realizzazione dell'impianto. L'ecosistema continuerebbe il suo lento degrado verso una struttura sempre più antropica, le moderne tecniche di agricoltura, l'utilizzo massiccio di prodotti chimici, contribuirebbero ad abbassare ancora la naturalità del territorio, già fortemente compromessa. *La tendenza futura ipotizzabile con la realizzazione dell'impianto.* Attraverso gli interventi di compensazione naturalistica, mirati ad azioni di ripristino ambientale, quali piantumazione di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, si potrebbe ridare al territorio interessato dal progetto, un assetto più naturaliforme. L'inserimento e l'incremento di vegetazione in alcune zone dell'area di studio, come sponde di fiumi, di canali, alcuni tratti della fitta rete viaria, corti di casolari abitati e disabitati, aree perimetrali alle infrastrutture industriali ed artigianali etc..., ricostituirebbero dei corridoi ecologici utili per gli spostamenti della fauna, oltre ad incrementare la nicchia trofica e quella rifugio per la fauna. Dal punto di vista paesaggistico, l'inserimento nel paesaggio agrario di formazioni vegetali naturali, potrebbe compensare l'interferenza che provocano le tipologie di progetto.

L'Ecosistema Prativo-Erbaceo interessa le aree ad incolto/prato-pascolo presenti all'interno dell'area di impianto con piccole superfici, mentre sulle prime alture dei Monti Dauni con aree di maggiori superfici, tutte le aree marginali lasciate incolte che delimitano i confini tra i vari appezzamenti, quelle che a rotazione vengono lasciate incolte, le aree situate a margine delle infrastrutture viarie, che le separano dal terreno agricolo, le aree di pertinenze delle aziende agricole, e le aree limitrofe ai corsi d'acqua, utilizzate come casse di espansione durante i periodi di piena. Questo ambiente si caratterizza per la scarsa copertura arborea (rari sono infatti gli alberi e persino gli arbusti, notevole la presenza di Ferule, Asfodeli, Cardi, Eringi ecc. Sporadicamente vengono utilizzate anche come aree di pascolo.

Fuori dall'area di progetto.

La tendenza futura ipotizzabile senza la realizzazione dell'impianto. L'ecosistema continuerebbe a mantenere il suo stato di degrado e scarsa naturalità. Non è ipotizzabile, senza interventi di compensazione naturalistica una evoluzione futura verso formazioni vegetazionali con maggiore naturalità. *La tendenza futura ipotizzabile con la realizzazione dell'impianto.* Attraverso gli interventi di compensazione naturalistica, mirati ad azioni di ripristino ambientale, quali piantumazione di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, si potrebbe ridare questa tipologia di habitat, interessato

indirettamente dal progetto, un assetto più naturaliforme. L'inserimento e l'incremento di vegetazione naturale in alcune zone dell'area di studio, come alcuni tratti della fitta rete viaria, corti di casolari abitati e disabitati, aree perimetrali alle infrastrutture industriali ed artigianali etc..., ricostituirebbero dei corridoi ecologici utili per gli spostamenti della fauna, oltre ad incrementare la nicchia trofica e quella rifugio. Dal punto di vista paesaggistico, l'inserimento nel paesaggio prativo/erbaceo di formazioni vegetali naturali, potrebbe compensare l'interferenza che provocano le tipologie di progetto.

L'ecosistema Igrofilo/Palustre interessa soprattutto la parte della vallata del fiume Fortore che rientra in AVI, dove si estendono zone di canneto e piante igrofile, in parte su terreno asciutto ed in parte su terreno melmoso che ogni tanto, soprattutto nei periodi di pioggia, aumenta la sua superficie grazie all'apporto di acqua piovana. Inoltre tutti i corsi d'acqua sia perenni che stagionali dove si è insediata, sia pure in minima parte la vegetazione palustre, piccole zone a canneto. In queste zone, a volte, si rinvencono formazioni vegetali azonali, cioè tipiche dei corsi d'acqua, come ad esempio il pioppo (*Populus alba* e *tremula*), il salice (*Salix alba*), lo scirpo (*Scirpus lacustris*), l'equiseto (*Equisetum fluviatile*) ecc. Le formazioni di pioppo e salice, che prima occupavano una fascia più ampia lungo l'argine di questi torrenti, in molti casi sono state estirpate per far posto a colture agricole.

Fuori dall'area di progetto.

La tendenza futura ipotizzabile senza la realizzazione dell'impianto. L'ecosistema continuerebbe a mantenere il suo stato di scarsa naturalità. Non è ipotizzabile, senza interventi di compensazione naturalistica una evoluzione futura verso formazioni vegetazionali con maggiore naturalità, l'utilizzo massiccio di prodotti chimici, anche se indirettamente, contribuirebbero ad abbassare ancora la naturalità del territorio, già fortemente compromessa. *La tendenza futura ipotizzabile con la realizzazione dell'impianto.* Attraverso gli interventi di compensazione naturalistica, mirati ad azioni di ripristino ambientale, quali piantumazione di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, si potrebbe ridare a questa tipologia di habitat, interessato indirettamente dal progetto, un assetto più naturaliforme. L'inserimento e l'incremento di vegetazione naturale in alcune zone dell'area di studio, come in alcuni tratti della rete idrografica, ricostituirebbe dei corridoi ecologici utili per gli spostamenti della fauna, oltre ad incrementare la nicchia trofica e quella rifugio per la fauna. Dal punto di vista paesaggistico, l'inserimento nel

paesaggio Igrofilo/Palustre di formazioni vegetali naturali, potrebbe compensare l'interferenza che provocano le tipologie di progetto.

L'Ecosistema Forestale: interessa principalmente i boschi di Roverella e Cerro presenti soprattutto nelle aree boscate dei Monti Dauni. Inoltre all'interno dell'area vasta esistono piccoli lembi isolati di aree boscate situati in zone dove non è stato possibile coltivare.

Fuori dall'area di progetto.

La tendenza futura ipotizzabile senza la realizzazione dell'impianto. L'ecosistema continuerebbe a mantenere il suo stato di naturalità. Non è ipotizzabile, senza interventi di compensazione naturalistica una evoluzione futura verso formazioni vegetazionali con maggiore naturalità. L'utilizzo massiccio di prodotti chimici, anche se indirettamente, contribuirebbero ad abbassare ancora la naturalità del territorio, già fortemente compromessa. *La tendenza futura ipotizzabile con la realizzazione dell'impianto.* Attraverso gli interventi di compensazione naturalistica, mirati ad azioni di ripristino e riqualificazione ambientale, quali piantumazione di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, si potrebbe ridare a questa tipologia di habitat, interessato indirettamente dal progetto, un assetto più naturaliforme. L'inserimento e l'incremento di vegetazione naturale in alcune zone dell'area di studio, come il rinfoltimento ed integrazione della vegetazione presente, ricostituirebbe dei corridoi ecologici utili per gli spostamenti della fauna, oltre ad incrementare la nicchia trofica e quella rifugio per la fauna. Dal punto di vista paesaggistico, l'inserimento nel paesaggio Boschivo di ulteriori formazioni vegetali naturali, potrebbe compensare l'interferenza che provocano le tipologie di progetto.

L'Ecosistema Antropico è costituito da tutti i centri abitati e dalle infrastrutture urbane, rurali, industriali ed artigianali presenti nell'area, è certamente l'area più degradata dal punto di vista naturalistico, quella che arreca più disturbo alla fauna, tranne che per alcune specie che da tempo si sono abituate a convivere e quasi a dipendere dalle attività umane. La zona è caratterizzata dalla presenza, di infrastrutture antropiche (abitazioni urbani e rurali, aree destinate ad attività industriali e/o commerciali) ed infine da una fitta rete di strade di diverse categorie.

Fuori dall'area di progetto.

La tendenza futura ipotizzabile senza la realizzazione dell'impianto. L'ecosistema continuerebbe a mantenere il suo stato antropico. Certamente la sua evoluzione futura potrebbe prevedere soltanto l'aumento di tali superfici. *La tendenza futura ipotizzabile con la realizzazione dell'impianto.* Attraverso gli interventi di compensazione naturalistica, mirati ad azioni di ripristino e riqualificazione ambientale, quali piantumazione di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, si potrebbe ridare a questa tipologia di habitat, interessato indirettamente dal progetto, un assetto più naturaliforme. L'inserimento e l'incremento di vegetazione naturale in alcune zone dell'area di studio. Dal punto di vista paesaggistico, l'inserimento nel paesaggio Antropico di formazioni vegetali naturali, potrebbe compensare l'interferenza che provocano le tipologie di progetto. La realizzazione del Parco Eolico non influisce in maniera rilevante sugli ecosistemi presenti all'interno dell'Area di Impianto e Area Vasta. Infatti, le zone scelte per l'intervento, sono quelle maggiormente antropizzate dalla attività dell'uomo (agroecosistema agricolo), quelle con la minore valenza naturalistica, quelle maggiormente presenti su tutto il territorio circostante. L'impatto sugli ecosistemi naturali sarà insignificante e comunque ristretto soltanto a piccole aree naturaliformi. All'interno dell'area di studio si trovano, lembi ridotti di Macchia mediterranea o soltanto alcune piante isolate appartenenti a tale tipologia vegetazionale. Per la loro scarsa presenza sono state trattate come ecosistema Forestale (Boschivo/Macchia).

Le macchie ecosistemiche di maggiore valore naturalistico, non vengono interessate direttamente dalla realizzazione del parco eolico, l'unico ecosistema interessato direttamente dalla realizzazione del parco eolico, è quello agricolo, quello con il più basso valore ambientale.

HABITAT

Nell'ambito dell'area oggetto di studio sono state individuate delle zone di predilezione della fauna, indispensabili per la loro sopravvivenza. Tali zone devono garantire la disponibilità di rifugio, quella alimentare e la possibilità di nidificazione e di riproduzione, oppure qualcuna soltanto di queste disponibilità, fattori determinanti per la presenza di una specie sul quel determinato territorio.

Caratterizzazione della struttura degli habitat presenti:

- ***Seminativi e colture arboree ed arbustive***
- ***Flora erbacea ed arbustiva***
- ***Canneto e vegetazione palustre***
- ***Boschi-Macchia Mediterranea***
- ***Edificati (urbani e rurali)***

Applicando un grado di valore, ad ogni singolo habitat riscontrato all'interno dell'area di studio, in relazione alla propria importanza ecologica, naturalità e biodiversità, da 1 a 5, dove 1 è la naturalità più bassa dell'ambiente, mentre 5 è quella più alta, possiamo stabilire che:

- *Seminativi e colture arboree ed arbustive - 2*
- *Flora erbacea ed arbustiva 3*
- *Canneto e vegetazione palustre - 4*
- *Boschi/Macchia Mediterranea - 5*
- *Edificati (urbani e rurali) - 1*

Nella scala dei valori gli Habitat Boschivo e Habitat canneto e vegetazione palustre hanno il valore più alto. Anche se la superficie dei due habitat è limitata all'interno dell'area di studio, la presenza di una fitta rete di canali, scarpate ed altro, ricoperti di boschi e vegetazione naturale, gli conferiscono il valore più alto tra tutti gli habitat riscontrati.

L'Habitat Seminativi e colture arboree (seminativi, vigneti, oliveti, ortaggi) occupa la maggior parte della superficie presente nell'Area di Studio, interessa tutti i campi coltivati, le colture arboree-arbustive, le colture orticole. Visto il continuo disturbo causato dai frequenti lavori agricoli la zona risulta scarsamente popolata da specie di

pregio. Questo habitat attrae soprattutto la classe degli uccelli, mammiferi qualche rettile, e in maniera molto limitata agli anfibi.

L'area in esame è in grado di offrire solo disponibilità alimentari e disponibilità di rifugio; inoltre la presenza delle varie specie faunistiche è legata anche ai vari cicli di coltivazioni ed alle colture praticate. Alcune specie maggiormente presenti sono: Volpe (*Vulpes vulpes*), Riccio (*Erinaceus europaeus*), Faina (*Martes foina*), Passera europea (*Passer domesticus*), Gheppio (*Falco tinnunculus*), Poiana (*Buteo buteo*), Barbagianni (*Tyto alba*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Cappellaccia (*Galerida cristata*), Rondone (*Apus apus*), Lucertola campestre (*Podarcis sicula*), Ramarro (*Lacerta viridis*), Biacco (*Coluber viridiflavus*).

L'area di progetto insiste totalmente in questo habitat (seminativi)

La tendenza futura ipotizzabile senza la realizzazione dell'impianto. L'habitat continuerebbe a mantenere il suo stato di scarsa naturalità. Non è ipotizzabile, senza interventi di compensazione naturalistica una evoluzione futura verso formazioni vegetazionali con maggiore naturalità. L'utilizzo massiccio di prodotti chimici, contribuirebbero ad abbassare ancora la naturalità dell'habitat, già fortemente compromesso. *La tendenza futura ipotizzabile con la realizzazione dell'impianto.* Attraverso gli interventi di compensazione naturalistica, mirati ad azioni di ripristino e riqualificazione ambientale, quali piantumazione di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, si potrebbe ridare a questa tipologia di habitat, interessato direttamente dal progetto, un assetto più naturaliforme. L'inserimento e l'incremento di vegetazione naturale in alcune zone dell'area di studio, come il rinfoltimento ed integrazione della vegetazione presente, ricostituirebbe dei corridoi ecologici utili per gli spostamenti della fauna, oltre ad incrementare la nicchia trofica e quella rifugio per la fauna. Dal punto di vista paesaggistico, l'inserimento nell'habitat agrario di ulteriori formazioni vegetali naturali (siepi ed alberature a confine degli appezzamenti), potrebbe compensare l'interferenza che provocano le tipologie di progetto.

L'Habitat Flora erbacea ed arbustiva: si intende gli incolti, il prato-pascolo, quelle fasce poste ai margini delle strade, inframezzate da alberi, arbusti e cespugli. Interessa la classe dei mammiferi, degli uccelli, dei rettili e in maniera minore quella degli anfibi.

L'ambito in questione risulta frequentato da: Volpe (*Vulpes vulpes*), Lepre comune (*Lepus europaeus*), Donnola (*Mustela nivalis*), Riccio (*Erinaceus europaeus*), Poiana (*Buteo buteo*), Gheppio (*Falco tinnunculus*), Tortora (*Strptopelia turtur*), Barbagianni

(*Tyto alba*), Rondone (*Apus apus*), Upupa (*Upupa epops*), Cappellaccia (*Galerida cristata*), Sturno (*Sturnus vulgaris*), Gazza (*Pica pica*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Saltimpalo (*Saxicola torquata*), Pettiroso (*Erithacus rubecula*), Cinciallegra (*Parus major*), Passera mattugia (*montanus*), Cardellino (*Carduelis carduelis*), Strillozzo (*Emberiza calandra*).

Fuori dall'area di progetto.

La tendenza futura ipotizzabile senza la realizzazione dell'impianto. L'habitat continuerebbe a mantenere il suo stato di naturalità. Non è ipotizzabile, senza interventi di compensazione naturalistica una evoluzione futura verso formazioni vegetazionali con maggiore naturalità. L'utilizzo massiccio di prodotti chimici, contribuirebbero ad abbassare ancora la naturalità dell'habitat già fortemente compromesso. *La tendenza futura ipotizzabile con la realizzazione dell'impianto.* Attraverso gli interventi di compensazione naturalistica, mirati ad azioni di ripristino e riqualificazione ambientale, quali piantumazione di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, si potrebbe ridare a questa tipologia di habitat, interessato indirettamente dal progetto, un assetto più naturaliforme. L'inserimento e l'incremento di vegetazione naturale in alcune zone dell'area di studio, come il rinfoltimento ed integrazione della vegetazione presente, ricostituirebbe dei corridoi ecologici utili per gli spostamenti della fauna, oltre ad incrementare la nicchia trofica e quella rifugio per la fauna. Dal punto di vista paesaggistico, l'inserimento nell'habitat prato/pascolo di ulteriori formazioni vegetali naturali (siepi ed alberature), potrebbe compensare l'interferenza che provocano le tipologie di progetto.

L'Habitat Canneto e vegetazione palustre: si intende tutta la vegetazione igrofila palustre lungo il corso del fiume Fortore a margine dell'Avi, e dei canali a portata annuale, e di piccoli canali con portata stagionale, che raccolgono l'acqua piovana durante il periodo delle piogge. Interessa la classe dei mammiferi, degli uccelli, dei rettili e in maniera minore quella degli anfibi.

L'ambito in questione risulta frequentato da: Volpe (*Vulpes vulpes*), Lepre comune (*Lepus europaeus*), Riccio (*Erinaceus europaeus*), Poiana (*Buteo buteo*), Gheppio (*Falco tinnunculus*), Tortora (*Strptopelia turtur*), Barbagianni (*Tyto alba*), Rondone (*Apus apus*), Upupa (*Upupa epops*), Cappellaccia (*Galerida cristata*), Sturno (*Sturnus*

vulgaris), Gazza (*Pica pica*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Saltimpalo (*Saxicola torquata*), Pettiroso (*Erithacus rubecula*), Cinciallegra (*Parus major*), Passera mattugia (*montanus*), Cardellino (*Carduelis carduelis*), Strillozzo (*Emberiza calandra*), anatidi, trampolieri e caradriformi.

Fuori dall'area di progetto.

La tendenza futura ipotizzabile senza la realizzazione dell'impianto. L'habitat continuerebbe a mantenere il suo stato di naturalità. Non è ipotizzabile, senza interventi di compensazione naturalistica una evoluzione futura verso formazioni vegetazionali con maggiore naturalità. L'utilizzo massiccio di prodotti chimici, anche se indirettamente, contribuirebbero ad abbassare la naturalità del territorio, già fortemente compromessa.

La tendenza futura ipotizzabile con la realizzazione dell'impianto. Attraverso gli interventi di compensazione naturalistica, mirati ad azioni di ripristino e riqualificazione ambientale, quali ripristino e rinfoltimento di vegetazione naturale arborea, arbustiva ed erbacea, si potrebbe ridare a questa tipologia di habitat, interessato indirettamente dal progetto, un assetto più naturaliforme. L'inserimento e l'incremento di vegetazione naturale in alcune zone dell'area di studio, come il rinfoltimento ed integrazione della vegetazione presente, ricostituirebbe dei corridoi ecologici utili per gli spostamenti della fauna, oltre ad incrementare la nicchia trofica e quella rifugio per la fauna. Dal punto di vista paesaggistico, l'inserimento nell'habitat Igrofilo/palustre di ulteriori formazioni vegetali naturali, potrebbe compensare l'interferenza che provocano le tipologie di progetto.

L'Habitat Boschivo: interessa principalmente i boschi a prevalenza di Roverella e Cerro presenti nella fascia preappenninica dei Monti Dauni, situata a Sud-Ovest dell'area di impianto, presente all'interno dell'AVI, ed altri piccoli lembi residui di boschi situati lungo alcune scarpate e canali, dove non è possibile coltivare.

L'ambito in questione risulta frequentato da: Volpe (*Vulpes vulpes*), Lepre comune (*Lepus europaeus*), Riccio (*Erinaceus europaeus*), Poiana (*Buteo buteo*), Gheppio (*Falco tinnunculus*), Tortora (*Strptopelia turtur*), Barbagiani (*Tyto alba*), Rondone (*Apus apus*), Upupa (*Upupa epops*), Cappellaccia (*Galerida cristata*), Storno (*Sturnus vulgaris*), Gazza (*Pica pica*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Saltimpalo

(*Saxicola torquata*), Pettiroso (*Erithacus rubecula*), Cinciallegra (*Parus major*), Passera mattugia (*montanus*), Cardellino (*Carduelis carduelis*), Strillozzo (*Emberiza calandra*).

Fuori dall'area di progetto.

La tendenza futura ipotizzabile senza la realizzazione dell'impianto. L'habitat continuerebbe a mantenere il suo stato di naturalità. Non è ipotizzabile, senza interventi di compensazione naturalistica una evoluzione futura verso formazioni vegetazionali con maggiore naturalità. L'utilizzo massiccio di prodotti chimici, anche se indirettamente, contribuirebbero ad abbassare la naturalità del territorio, già fortemente compromessa.

La tendenza futura ipotizzabile con la realizzazione dell'impianto. Attraverso gli interventi di compensazione naturalistica, mirati ad azioni di ripristino e riqualificazione ambientale, quali ripristino e rinfoltimento di vegetazione naturale arborea, arbustiva ed erbacea, si potrebbe ridare a questa tipologia di habitat, interessato indirettamente dal progetto, un assetto più naturaliforme. L'inserimento e l'incremento di vegetazione naturale in alcune zone dell'area di studio, come il rinfoltimento ed integrazione della vegetazione presente, ricostituirebbe dei corridoi ecologici utili per gli spostamenti della fauna, oltre ad incrementare la nicchia trofica e quella rifugio per la fauna. Dal punto di vista paesaggistico, l'inserimento nell'habitat Boschivo di ulteriori formazioni vegetali naturali, potrebbe compensare l'interferenza che provocano le tipologie di progetto.

L'Habitat Edificato urbano-rurale (abitazioni urbane, rurali abitate e disabitate, infrastrutture industriali) si intende per area urbana tutti i centri abitati presenti all'interno dell'Area di Studio, tutte le abitazioni rurali, abitate durante tutto l'arco dell'anno, abitate saltuariamente e quelle disabitate, singole o agglomerate, presenti all'interno dell'Area di Studio, compresa la viabilità. Quest'area è senza dubbio quella con il minor numero di specie faunistiche presenti, in quanto la presenza dell'uomo e delle sue attività limitano molto l'insediamento di popolamenti faunistici, ad eccezione solo di alcune specie, cioè quelle che vivono maggiormente a stretto contatto con l'uomo e con tutte le sue attività, approfittando anche di tutti i rifiuti alimentari che esso produce. Interessano le classi degli uccelli, dei mammiferi e dei rettili. Le specie presenti, da tempo hanno imparato a convivere con l'uomo e le sue attività, sono: Volpe (*Vulpes vulpes*), Faina (*Martes foina*), Civetta (*Athene noctua*), Barbaglianni (*Tyto alba*),

Rondone (*Apus apus*), Tortora (*Strptopelia turtur*), Balestruccio (*Delichon urbica*), Taccola (*Corvus monedula*), Passera europea (*Passer domesticus*).

Fuori dall'area di progetto.

La tendenza futura ipotizzabile senza la realizzazione dell'impianto. L'habitat continuerebbe a mantenere il suo stato antropico. Certamente la sua evoluzione futura potrebbe prevedere soltanto l'aumento di tali superfici. *La tendenza futura ipotizzabile con la realizzazione dell'impianto.* Attraverso gli interventi di compensazione naturalistica, mirati ad azioni di ripristino e riqualificazione ambientale, quali piantumazione di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, si potrebbe ridare a questa tipologia di habitat, interessato indirettamente dal progetto, un assetto più naturaliforme. Dal punto di vista paesaggistico, l'inserimento nell'habitat Antropico di formazioni vegetali naturali, potrebbe compensare l'interferenza che provocano le tipologie di progetto. Gli habitat faunistici individuati nell'area in esame, sono stati definiti in funzione delle loro tipologie e caratteristiche ambientali. Sono state considerate le loro potenzialità riguardanti la nicchia trofica e la nicchia riproduttiva e di rifugio. La presenza e la permanenza di una qualsiasi specie faunistica su un determinato territorio, è subordinata alla presenza delle due nicchie (nicchia trofica e la nicchia riproduttiva e di rifugio), o solamente ad una di esse.

Nessun habitat prioritario Direttiva 92/43/CEE o di pregio è coinvolto direttamente con le opere di progetto. All'interno del buffer di km. 5,00, così come previsto dalle normative vigenti, non rientra nessun Sito Natura 2000.

VEGETAZIONE

La copertura vegetale dell'area di studio è costituita essenzialmente da coltivi di vario genere. Seminativi a cereali, vigneti, oliveti, colture orticole, rappresentano la maggior parte delle specie vegetali presenti all'interno dell'area di studio. Limitata è la presenza di aree con vegetazione spontanea, la vegetazione palustre della vallata del fiume Fortore e di alcuni canali sia a portata stagionale che perenni, i boschi a prevalenza di Roverella dei Monti Dauni, e le aree incolte tra una coltura agricola ed un'altra, costituiscono le aree di maggiore valenza naturalistica presenti all'interno dell'AVI. La

componente vegetazionale dell'area in esame, è stata classificata considerando le diverse tipologie, caratteristiche e specificità ambientali riscontrate in ognuna delle aree, o micro aree, presenti. In seguito ai rilevamenti di campo effettuati presso il sito di intervento si evince che, la vegetazione reale è molto lontana dallo stadio climax originario, a causa della elevata antropizzazione dovuta ad una agricoltura intensiva, alla bonifica delle aree naturali, e drastica riduzione e snaturalizzazione della rete idrografica superficiale, presente sul territorio. La vegetazione dominante è quella dei campi coltivati, costituita da seminativi (grano duro e girasole), orticole (pomodoro) e da aree coltivate a colture arboree (uliveti, frutteti e vigneti), che creano nel complesso un agroecosistema semplificato e monotono. Lungo i margini dei campi e in ambienti rurali si sviluppa una vegetazione sinantropica a terofite cosiddetta "infestante". Le specie maggiormente rappresentate sono: *Stellaria media*, *Chenopodium album*, *Lamium amplexicaule*, *Senecio vulgaris*, *Solanum nigrum*, *Poa annua*, *Polygonum aviculare*, *Spergularia rubra*, *Eryngium campestre*, *Marrubium vulgare*, *Verbascum thapsus*, *Centaurea calcitrapa*, *Dipsacus fullonum*, *Cardus nutans*, *Onopordon acanthium*, *Cirsium vulgare*, *Cardus pycnocephalus*. *Glycerio-Nasturtietea*, *Phragmiti Magnocaricetea*, *Juncetalia maritimi* e *Stellarietea mediae*. La tendenza futura ipotizzabile senza la realizzazione dell'impianto. La vegetazione naturale senza nessun altro intervento antropico continuerebbe a mantenere il suo stato di naturalità. Non è ipotizzabile, senza interventi di compensazione naturalistica una evoluzione futura verso formazioni vegetazionali con maggiore naturalità. L'utilizzo massiccio di prodotti chimici, anche se indirettamente, contribuirebbero ad abbassare ancora la naturalità della vegetazione naturale, già fortemente compromessa.

La tendenza futura ipotizzabile con la realizzazione dell'impianto. Attraverso gli interventi di compensazione naturalistica, mirati ad azioni di ripristino e riqualificazione ambientale, quali piantumazione di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, si potrebbe ridare alla vegetazione naturale, interessata indirettamente dal progetto, un assetto più naturaliforme. L'inserimento e l'incremento di vegetazione naturale in alcune zone dell'area di studio, come il rinfoltimento ed integrazione della vegetazione presente, ricostituirebbe dei corridoi ecologici utili per gli spostamenti della fauna, oltre ad incrementare la nicchia trofica e quella rifugio per la fauna. Dal punto di vista paesaggistico, l'incremento e rinfoltimento nella vegetazione di ulteriori formazioni

vegetali naturali, potrebbe compensare l'interferenza che provocano le tipologie di progetto.

FLORA

La quasi totalità dell'Area di Studio è caratterizzata da un ambiente totalmente antropizzato a causa dell'intensa attività agricola. Le uniche formazioni vegetali naturali presenti all'interno dell'area di studio, sono costituite da aree boscate situate al limite Sud-Ovest dell'area di studio, e da lembi relitti di formazioni vegetazionali naturali rilevabili soprattutto lungo le sponde del fiume Fortore ed il corso dei torrenti e dei canali (piccole formazioni di fragmiteti e vegetazione erbacea igrofila) che attraversano l'intero territorio, e lungo i bordi delle strade. L'utilizzo intensivo dei suoli, ha portato all'eliminazione di gran parte degli ambienti naturali e seminaturali dell'intera area di studio. All'interno dell'Area di Studio, le fasce arboree arbustive ripariali, intervallate da più estesi fragmiteti e praterie umide, situate lungo le sponde dei canali, e le aree lasciate ad incolto permanente o provvisorio, anche se di scarso interesse naturalistico, risultano, quelle di maggiore interesse ambientale.

Specie floristiche maggiormente rappresentative degli ecosistemi presenti sul territorio.

La vegetazione dei campi coltivati è costituita soprattutto da seminativi asciutti (grano duro e girasole) e in parte da colture arboree (uliveti, frutteti e vigneti). Lungo i margini dei campi cerealicoli e in ambienti rurali si sviluppa una vegetazione sinantropica a terofite cosiddetta "infestante", che nel periodo invernale-primaverile è costituita da un corteggio floristico riferibile alle specie caratteristiche *Stellaria media*, *Chenopodium album*, *Lamium amplexicaule*, *Senecio vulgaris* e *Solanum nigrum*.

Sugli incolti sottoposti a rotazione e avvolte utilizzati per il pascolo si instaura, invece, una vegetazione emicriptofitica di macrofite xerofile, spesso spinose, con *Eryngium campestre*, *Marrubium vulgare*, *Verbascum thapsus*, *Centaurea calcitrapa*, *Dipsacus fullonum*, *Cardus nutans*, *Onopordon acanthium*, *Cirsium vulgare*, *Cardus pycnocephalus*.

In ambiti agricoli meno sfruttati, lungo i margini dei campi e delle strade si rilevano *filari* e *fasce arboree-arbustive* composti da specie autoctone. Lo strato arboreo è caratterizzato dalle specie *Quercus pubescens*, *Ulmus minor*, *Acer campestre* e *Junglas regia*, mentre quello arbustivo da *Prunus spinosa*, *Rosa canina*, *Crataegus monogyna*, *Rubus fruticosus*, *Cornus mas* e *C. sanguinea*, *Paliurus spina-cristi*, *Phyllirea longifolia*, *Spartium junceum*, *Asparagus acutifolius*, *Pyrus pyraeaster*, *Pistacia lentiscus* (quest'ultimi due soprattutto sui versanti esposti a sud accompagnati dalle specie di rosaceae).

Nelle aree a vegetazione naturalifome, a causa di ceduzioni e pascolo, si rinvencono formazioni regressive caratterizzate da specie arbustive di sostituzione della roverella date da rovo (*Rubus ulmifolius*), rose (*Rosa canina*, *R. arvensis*, *R. agrestis*), prugnolo (*Prunus spinosa*), biancospino (*Crataegus monogyna*, *C. oxyacantha*) e da specie eliofile quali l'asparago (*Asparagus acutifolius*) e da specie prative indicatrici di particolare degrado come *Bellis perennis*, *Rumex acetosella*, *Festuca heterophylla*, la falasca (*Brachypodium rupestre*).

Lungo le sponde di alcuni torrenti e soprattutto lungo le sponde del lago di Lesina si rinviene una vegetazione riparia costituita da filari, fasce vegetazionali di cenosi arboree, arbustive tra cui abbondano i salici (*Salix purpurea*, *S. eleagnos*, *S. alba*, *S. triandra*), i pioppi (*Populus alba*, *P. canescens*, *P. nigra*), l'olmo campestre (*Ulmus minor*), la sanguinella (*Cornus sanguinea*) ed il luppolo (*Humulus lupulus*), riferibili al Populetaia albae. In seguito ai rilevamenti sul campo effettuati in Area di Studio si evince che la vegetazione reale è molto lontana dallo stadio climax originario a causa della elevata antropizzazione dovuta ad una agricoltura intensiva, alla bonifica delle aree naturali, e drastica riduzione e snaturalizzazione della rete idrografica superficiale presente sul territorio. La vegetazione dominante è quella dei campi coltivati, costituita da seminativi (grano duro e girasole), orticole (pomodoro) e da aree coltivate a colture arboree (uliveti, frutteti e vigneti), che creano nel complesso un agroecosistema semplificato e monotono.

Si riportano di seguito le specie floristiche individuate all'interno dell'area di studio, durante i vari sopralluoghi effettuati sul campo, e delle specie presenti/potenziati.

Parco Eolico Fenice	
Lista specie floristiche presenti/potenziati	
Nome comune	Nome scientifico
Acero Campestre	<i>Acer campestre</i> L.
Acero Minore	<i>Acer monspessulanum</i> L.
Aglione Delle Bisce	<i>Allium sphaerocephalon</i> L.
Aglione Italiano	<i>Allium pendulinum</i> Ten.
Aglione Maggiore	<i>Allium nigrum</i> L.
Aglione Pelosetto	<i>Allium subhirsutum</i> L.
Ailanto	<i>Ailanto altissima</i> Mill.
Alaterno	<i>Ramnus alaternus</i> L.
Amaranto Bianco	<i>Amaranthus albus</i> L.
Amaranto Comune	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.
Ambretta Annuale	<i>Knautia integrifolia</i> (L.) Bertol.
Ambretta Comune	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coulter
Anemone Fior-Stella	<i>Anemone hortensis</i> L.
Arabetta Irsuta	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.
Arisaro Comune	<i>Arisarum vulgare</i> Targ. - Tozz.
Aristolochia Rotonda	<i>Aristolochia rotunda</i> L.
Arrestabue	<i>Ononis spinosa</i> L.
Asfodelo Fistoloso	<i>Asphodelus fistulosus</i> L.
Asfodelo Mediterraneo	<i>Asphodelus microcarpus</i> Salzm.
Asparago	<i>Asparagus acutifolius</i> L.
Asplenio	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.
Aspraggine	<i>Picris echioides</i> L.
Assenzio Selvatico	<i>Artemisia vulgaris</i> L.
Asterisco	<i>Pallenia spinosa</i> (L.) Cass.)
Astralago Rosato	<i>Astragalus monspessulanus</i> L.
Astro Autunnale	<i>Aster squamatus</i> L.
Attaccamani	<i>Galium aparine</i> L.
Avena Altissima	<i>Arrhenatherum elatius</i> L.
Avena Barbata	<i>Avena barbata</i> L.
Avena Maggiore	<i>Avena sterilis</i> L., 1762
Avena Selvatica	<i>Avena fatua</i> L.
Bambagione Pubescente	<i>Holcus lanatus</i> L.
Berretta Del Prete	<i>Euonymus europaeus</i> L.
Biancospino Comune	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.
Bietola D'acqua	<i>Potamogeton natans</i> L.
Bocca Di Lupo	<i>Hermodactylus tuberosus</i> (L.)
Boccione Maggiore	<i>Urospermum dalechampii</i> L.
Borragine Comune	<i>Borago officinalis</i> L.
Borsa Pastore Comune	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.)
Brunella	<i>Prunella vulgaris</i> L.
Bucaneve	<i>Galanthus nivalis</i> L., 1753
Buglossa Azzurra	<i>Anchusa italica</i> Retz

Nome comune	Nome scientifico
Buglossa Comune	<i>Anchusa officinalis</i> L.
Bugola	<i>Ajuga reptans</i> L.
Caglio Lucido	<i>Galium lucidum</i> All.
Caglio Zolfino	<i>Galium verum</i> L.
Calcatreppola	<i>Eryngium campestre</i> L.
Calcatreppola Ametistina	<i>Eryngium amethystinum</i> L.
Calendula Dei Campi	<i>Calendula arvensis</i> L.
Camedrio Comune	<i>Teucrium camaedrys</i> L.
Camepizio	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreber
Camomilla Bastarda	<i>Anthemis arvensis</i> L.
Camomilla Comune	<i>Matricaria camomilla</i> L.
Camomilla Dei Tintori	<i>Anthemis tinctoria</i> L.
Camomilla Mezzana	<i>Anthemis cotula</i> L.
Canna Comune	<i>Arundo donax</i> L.
Canna Di Palude	<i>Phragmites communis</i> (Cav.) Trin. ex Steud
Cannuccia Di Palude	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin.
Cappellini Comuni	<i>Agrostis stolonifera</i> L.
Caprifoglio	<i>Lonicera implexa</i> Aiton
Caprifoglio Comune	<i>Lonicera caprifolium</i> L.
Carciofo Selvatico	<i>Cynara cardunculus</i> L.
Cardo Asinino	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.
Cardo Campestre	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.
Cardo Mariano	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn
Cardo Rosso	<i>Carduus nutans</i> L.
Cardo Saettone	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.
Carice Villosa	<i>Carex hirta</i> L.
Carlina Raggio D'oro	<i>Carlina corymbosa</i> L.
Carota	<i>Daucus carota</i> L.
Cascellore Comune	<i>Bunias erucago</i> L.
Centauro Minore	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn
Centauro Giallo	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.
Centocchio Comune	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.
Centonchio azzurro	<i>Anagallis foemina</i> Miller
Cerfoglio Inebriante	<i>Chaerophyllum temulum</i> L.
Cerro	<i>Quercus cerris</i> L.
Cicerchia Bastarda	<i>Lathyrus aphaca</i> L.
Cicerchia Dei Prati	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753
Cicerchia Selvatica	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.
Cicerchiella	<i>Lathyrus cicera</i> L., 1753
Ciclamino	<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton
Cicoria Comune	<i>Cichorium intybus</i> L.
Cicuta Maggiore	<i>Conium maculatum</i> L.
Cicutaria	<i>Erodium cicutarium</i> (L.)
Ciliegio	<i>Prunus avium</i> L.
Cinquefoglia Comune	<i>Potentilla reptans</i> L.
Cinquefoglia Primaticcia	<i>Potentilla tabernaemontani</i> Asch.
Cipresso Sempreverde	<i>Cupressus sempervirens</i> L.
Cisto Di Creta	<i>Cistus creticus</i> L.

Nome comune	Nome scientifico
Cisto Rosso	<i>Cistus incanus</i> L.
Clematide Vitalba	<i>Clematis vitalba</i> L.
Clematide Fiammella	<i>Clematis flammula</i> L.
Cocomero Asinino	<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Rich.
Coda Di Cane	<i>Cynosurus echinatus</i> L.
Coda Di Topo Comune	<i>Alopecurus pratensis</i> L.
Codolina Meridionale	<i>Phleum ambiguum</i> Ten.
Corniolo	<i>Cornus mas</i> L.
Crescione D'acqua	<i>Nasturtium officinale</i> (L.) Bess
Crisantemo Campestre	<i>Chrysanthemum segetum</i> L.
Crisantemo Giallo	<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.
Damigella Scapigliata	<i>Nigella damascena</i> L.
Dente Di Leone	<i>Leontodon crispus</i> Vill
Edera	<i>Hedera helix</i> L.
Eliotropio	<i>Heliotropium europaeum</i> L.
Elleboro Puzzolente	<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753
Equiseto	<i>Equisetum fluviatile</i> L.
Erba Di San Guglielmo	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.
Erba Falsa	<i>Crupina crupinastrum</i> Moris
Erba Marzolina Comune	<i>Dactylis glomerata</i> L.
Erba Medica	<i>Medicago sativa</i> L.
Erba Medica Lupulina	<i>Medicago lupulina</i> L.
Erba Perla Minore	<i>Lithospermum arvense</i> L.
Erba Ruchetta	<i>Reseda alba</i> L.
Erba Storna Perfogliata	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.
Erba Vajola	<i>Cerinth major</i> L.
Eucalipto	<i>Eucalyptus</i> spp.
Euforbia Calenzuola	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.
Euforbia Falcata	<i>Euphorbia falcata</i> L.
Falsa Ortica	<i>Lamium amplexicaule</i> L.
Farinello Comune	<i>Chenopodium album</i> L.
Festuca Mediterranea	<i>Festuca circummediterranea</i> Patzke
Fico D'india	<i>Opuntia ficus-indica</i> , Miller 1768
Fienarola	<i>Poa pratensis</i> L.
Fienarola Annuale	<i>Poa annua</i> L.
Finocchiaccio	<i>Ferula communis</i> L.
Finocchio Selvatico	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.
Fior Di Vespa	<i>Ophrys tenthredinifera</i> Willd
Fiorrancio	<i>Calendula officinalis</i> L.
Forasacco Eretto	<i>Bromus erectus</i> Hudson
Forasacco Peloso	<i>Bromus molliformis</i> Lloyd
Forasacco Pendolino	<i>Bromus squarrosus</i> L.
Frassino	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.
Fumaria Comune	<i>Fumaria officinalis</i> L.
Gallinella Comune	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich
Geranio Malvaccino	<i>Geranium rotundifolium</i>
Geranio Volgare	<i>Geranium molle</i> L.
Giacinto Romano	<i>Bellevalia romana</i> (L.) Sweet

Nome comune	Nome scientifico
Gigaro Chiaro	<i>Arum italicum</i> Miller
Ginepro	<i>Juniperus communis</i>
Ginestra Dei Carbonai	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822)
Ginestra Odorosa	<i>Spartium junceum</i> L.
Ginestrella Comune	<i>Osyris alba</i> L.
Ginestrino	<i>Lotus corniculata</i> L.
Girasole Comune	<i>Heliantus annuus</i> L.
Giunco Nodoso	<i>Juncus articulatus</i> L.
Giunco Tenace	<i>Juncus inflexus</i> L.
Gladiolo Dei Campi	<i>Gladiolus italicus</i> Miller
Gramigna	<i>Agropyron repens</i> (L.) Beauv.
Grano Duro	<i>Triticum durum</i> Desf.
Grano Villosa	<i>Dasypyrum villosum</i> (L.) Borbas
Grespino Comune	<i>Sonchus oleraceus</i> L.
Grespino Spinoso	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill.
Ilatro Comune	<i>Phyllirea latifolia</i> L.
Incensaria Comune	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh
Inula Viscosa	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Aiton)
Iperico	<i>Hypericum perforatum</i> L.
Lampascione	<i>Muscari comosum</i> L.
Lassana Comune	<i>Lapsana communis</i> L.
Latte Di Gallina	<i>Ornithogalum exscapum</i> Ten.
Leccio	<i>Quercus ilex</i> L.
Lentisco	<i>Pistacia lentiscus</i> L.
Ligustro Comune	<i>Ligustrum vulgare</i> L.
Lino Delle Fate	<i>Stipa austroitalica</i> Martinovsky
Lino Spinato	<i>Linum trigynum</i> L.
Lisca Maggiore	<i>Typha latifolia</i> L.
Lupinella Comune	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.
Malva	<i>Malva silvestris</i> L.
Malvone Punteggiato	<i>Lavatera punctata</i> All.
Marrubio Comune	<i>Marrubium vulgare</i> L.
Marruca	<i>Paliurus spina-christi</i> Milker
Masticogna Latticifera	<i>Atractylis gummifera</i> L.
Meliloto Bianco	<i>Melilotus alba</i> Med.
Meliloto Comune	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Coulot & Rabaute
Menta Campestre	<i>Mentha arvensis</i> L.
Mercorella Comune	<i>Mercurialis annua</i> L.
Miglio Multifloro	<i>Oryzopsis miliacea</i> L.
Mordigallina	<i>Anagallis arvensis</i> L.
Morella Comune	<i>Salanum nigrum</i> L.
Muscari Atlantico	<i>Muscari atlanticum</i> Boiss. et Reuter
Nappola Spinosa	<i>Xanthium spinosum</i> L.
Narciso Italiano	<i>Narcissus tazetta</i> L.
Nontiscordardimè Minore	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill
Ofride Verde Bruna	<i>Ophrys sphecodes</i> Miller
Olivo	<i>Olea europaea</i> L. var. <i>sylvestris</i> Brot.
Olmo Campestre	<i>Ulmus minor</i> Miller

Nome comune	Nome scientifico
Ombrellini Maggiori	<i>Tordylium maximum</i> L.
Ombrellini Pugliese	<i>Tordylium apulum</i> L.
Orchide Italica	<i>Orchis italica</i> Poiret
Orchide Purpurea	<i>Orchis purpurea</i> Hudson
Orchidea Piramidale	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.)
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i> L.
Ortica	<i>Urtica dioica</i> L.
Orzo Bulboso	<i>Hordeum bulbosum</i> L.
Orzo Selvatico	<i>Hordeum murinum</i> L.
Pabbio Verticillato	<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv.
Paleo Comune	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv
Paleo Dei Montoni	<i>Festuca ovina</i> L.
Paleo Delle Garighe	<i>Brachypodium ramosum</i> (L)
Paleo Odoroso	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.
Paleo Rupestre	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host)
Paleo Splendente	<i>Koeleria splendens</i> Presl
Papavero Comune	<i>Papaver rhoeas</i> L.
Pastinaca	<i>Pastinaca sativa</i> L.
Perastro	<i>Pyrus pyraister</i> Burgsd.
Perlina Gialla	<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv., 1811)
Perlina Maggiore	<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel
Perlina Minore	<i>Bellardia trixago</i> L. (All.)
Perpetuini d'Italia	<i>Helichysum italicum</i> Roth
Peverina Dei Campi	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.
Piantaggine	<i>Plantago major</i> L.
Pimpinella	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.
Pino D'aleppo	<i>Pinus halepensis</i> Miller
Pino Domestico	<i>Pinus pinea</i> L.
Pino Silvestre	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753
Pioppo Bianco	<i>Populus alba</i> L.
Pioppo Tremulo	<i>Populus tremula</i> L.
Pisello Selvatico	<i>Lathyrus hirsutus</i> L.
Piumino Nano	<i>Lagurus ovatus</i> L. Pium.
Poligala	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr
Poligono Nodoso	<i>Polygonum lapathifolium</i> L.
Polmonaria	<i>Polmonaria officinalis</i> L.
Portulaca	<i>Portulaca oleracea</i> L.
Pratolina Comune	<i>Bellis perennis</i> L.
Prezzemolo Bastardo	<i>Ammoides pusilla</i> (Brot.) Breistr
Primula	<i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762
Prugnolo Selvatico	<i>Prunus spinosa</i> L.
Pungitopo	<i>Ruscus aculeatus</i> L.
Radicchiella Capillare	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr
Radichella	<i>Crepis vesicaria</i> L.
Radichella Minore	<i>Crepis neglecta</i> L.
Ranuncolo	<i>Ranunculus repens</i> L.
Ranuncolo Millefoglio	<i>Ranunculus millefoliatus</i> Vahl.
Raperonzolo Selvatico	<i>Tragopogon porrifolium</i> L.

Nome comune	Nome scientifico
Ravanello Selvatico	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.
Reseda Comune	<i>Reseda lutea</i> L.
Robinia Pseudoacacia	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.
Romice Crespa	<i>Rumex crispus</i> L.
Rosa Canina	<i>Rosa canina</i> L. sensu Bouleng.
Rosmarino	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.
Roverella	<i>Quercus pubescens</i> Willd. s.l.
Rovo Bluastro	<i>Rubus caesius</i> L.
Rovo Comune	<i>Rubus fruticosus</i> L.
Rovo Selvatico	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott
Ruchetta	<i>Diplotaxis eruroides</i> (L.) DC
Rucola	<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC
Rucola Selvatica	<i>Echium italicum</i> L.
Saepola Di Buenos Aires	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.
Salice Comune	<i>Salix alba</i> L.
Salice Rosso	<i>Salix purpurea</i> L.
Salicone	<i>Salix caprea</i> L.
Salsapariglia	<i>Smilax aspera</i> L.
Salvia Comune	<i>Salvia officinalis</i> L.
Salvia Dei Prati.	<i>Salvia pratensis</i> L.
Sambuco Comune	<i>Sambucus nigra</i> L.
Sanguinella	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.
Scardaccione	<i>Dipsacus fullonum</i> L.
Scorzonera Villosa	<i>Scorzonera villosa</i> Scop.
Sedanina D'acqua	<i>Apium nodiflorum</i> L.
Senape Bianca	<i>Sinapis alba</i> L.
Senape Nera	<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch
Senecio Comune	<i>Senecio vulgaris</i> L.
Serapide Lingua	<i>Serapias lingua</i> L.
Silene Bianca	<i>Silene alba</i> L.
Sonaglini Minore	<i>Briza minor</i> L.
Sorbo Domestico	<i>Sorbus domestica</i> L.
Sorgo Selvatico	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.
Spergularia Comune	<i>Spergularia rubra</i> (L.) Presl
Speronella Comune	<i>Delphinium halteratum</i> S. et S.
Speronella Consolida	<i>Consolida regalis</i> S. F. Gray
Stellina Dei Campi	<i>Asperula arvensis</i> L.
Succiamele Delle Fave	<i>Orobanche crenata</i> Forssk., 1775)
Succiamele Ramoso	<i>Orobanche ramosa</i> L.
Sulla Comune	<i>Hedysarum coronarium</i> L.
Tamaro	<i>Tamus communis</i> L.
Tamerice	<i>Tamarix gallica</i> L.
Tarassaco comune	<i>Taraxacum officinale</i> Weber
Terebinto	<i>Pistacia terebinthus</i> L.
Tifa Minima	<i>Typha minima</i> L.
Trifoglio Irsuto	<i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser.
Trifoglio Bianco	<i>Trifolium repens</i> L.
Trifoglio Campestre	<i>Trifolium campestre</i> Schreber

Nome comune	Nome scientifico
Trifoglio Dei Prati	<i>Trifolium pratense</i> L.
Trifoglio Vulnerario	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.
Veccia Comune	<i>Vicia sativa</i> L.
Veccia Montanina	<i>Vicia cracca</i> L.
Veccia Tentennina	<i>Vicia hirsuta</i> L.
Veccia Viola Del Latte	<i>Astragalus danicus</i> Retz.
Verbascio Coda Grossa	<i>Verbascum macrurum</i> Ten. 1826
Verbena	<i>Verbena officinalis</i> L.
Vilucchio Bianco	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.
Vilucchio Bicchierino	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.
Vilucchio Comune	<i>Convolvulus arvensis</i> L.
Vilucchio Elegantissimo	<i>Convolvulus elegantissimus</i> Miller
Viola Bianca	<i>Viola alba</i> Besser
Viola Dei Campi	<i>Viola arvensis</i> Murray
Viola Mammola	<i>Viola odorata</i> L.
Viperina Azzurra	<i>Echium vulgare</i> L.
Vite Comune	<i>Vitis vinifera</i> L.
Zafferano Selvatico	<i>Crocus biflorus</i> Miller
Zafferanone Selvatico	<i>Carthamus lanatus</i> L.
Zizzania	<i>Lolium temulentum</i> L.
Specie n. 303	

Fenotipizzazione della flora presente (censita e potenziale) in area di studio del Parco Eolico Fenice con habitat di predilezione

Parco Eolico Fenice Specie Floristiche			
Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Habitat
Sapindaceae	<i>Acer campestre</i>	Acero Campestre	boschi meso-termofili ma non eccessivamente xerici, soprattutto nei querceti a foglia caduca,
Sapindaceae	<i>Acer monspessulanum</i>	Acero Minore	specie tipicamente mediterranea, resistente alla siccità. vegeta nei boschi termomesofili di latifoglie.
Rosacee	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Erba Di San Guglielmo	marginì di boschi e pascoli, sia in zone con clima mediterraneo, in particolare in zone aperte, secche e soleggiate
Poaceae	<i>Agropyron repens</i>	Gramigna	incolti, i bordi delle vie, i campi e i prati aridi. infestante le colture
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i>	Cappellini Comuni	boschi, praterie, in zone umide e zone ripariali.
Simarubacee	<i>Ailanto altissima</i>	Ailanto	è presente in tutta Italia, con una distribuzione quasi ubiquitaria
Lamiaceae	<i>Ajuga chamaepitys</i>	Camepizio	prati aridi, pascoli incolti
Lamiaceae	<i>Ajuga reptans</i>	Bugola	lungo le siepi e margini dei sentieri, ma anche nei boschi di latifoglie
Maryllidaceae	<i>Allium nigrum</i>	Aglio Maggiore	cresce in siti caldi, soprattutto in campi e vigneti;
Amaryllidaceae	<i>Allium pendulinum</i>	Aglio Italiano	zone aride dell'area montano collinare, sui pendii sassosi o rocciosi.
Alliaceae	<i>Allium sphaerocephalon</i>	Aglio Delle Bisce	zone aride dell'area montano collinare, sui pendii sassosi o rocciosi.
Liliaceae	<i>Allium subhirsutum</i>	Aglio Pelosetto	pascoli aridi, negli incolti, nelle garighe e in boschi aperti, dal livello del mare a 600 macchie e cespuglieti
Graminaceae	<i>Alopecurus pratensis</i>	Coda Di Topo Comune	ambienti semi aridi boscaglie
Amaranthaceae	<i>Amaranthus albus</i>	Amaranto Bianco	vegetazioni ruderali aperte
Amaranthaceae	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Amaranto Comune	incolti
Apiaceae	<i>Ammoides pusilla</i>	Prezzemolo Bastardo	zone mediterranee climi secchi
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchidea Piramidale	luoghi erbosi, boscaglie, garighe
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Mordigallina	luoghi erbosi, pratelli, gariga, incolti, al margine dei coltivi, nelle aiuole, lungo le strade
Primulacee	<i>Anagallis foemina</i>	Centonchio azzurro	infestante di colture a erbacee ambienti antropizzati, cioè dai bordi di strada e dagli ambienti disturbati limitrofi ai campi

Boraginaceae	<i>Anchus italica</i>	Buglossa Azzurra	incolti, luoghi sassosi, coltivati, vigne e in generale aree antropizzate
Boraginaceae	<i>Anchusa officinalis</i>	Buglossa Comune	incolti, luoghi sassosi, coltivati, vigne e in generale aree antropizzate
Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Habitat
Ranunculaceae	<i>Anemone hortensis</i>	Anemone Fior-Stella	prati aridi e bordi delle strade
Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i>	Camomilla Bastarda	luoghi incolti o i campi coltivati
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Camomilla Mezzana	aree incolte, le zone ruderali e i campi di cereali; ma anche le scarpate, le strade rurali macereti, incolti, ruderi, campi di cereal
Asteraceae	<i>Anthemis tinctoria</i>	Camomilla Dei Tintori	terreni incolti ruderali perenni pionieri, mesoxerofili
Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Paleo Odoroso	pascoli, boschi radi di latifoglie
Fabacee	<i>Anthyllis vulneraria</i>	Trifoglio Vulnerario	gariga praterie aride e degli ambienti rupestri
Apiaceae	<i>Apium nodiflorum</i>	Sedanina D'acqua	terreni asciutti, poveri, nei prati aridi, negli ambienti rupestri e sui vecchi muri
Brassicaceae	<i>Arabis hirsuta</i>	Arabetta Irsuta	prati, bordi stradali, sentieri e luoghi semi-rocciosi,
Araceae	<i>Arisarum vulgare</i>	Arisaro Comune	muri, incolti, suoli ricchi di humus e ombreggiati
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia rotunda</i>	Aristolochia Rotonda	siepi, lungo i fossati, ai bordi di campi e vigneti,
Poaceae	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Avena Altissima	prati stabili siepi e cespugli
Asteraceae	<i>Artemisia vulgaris</i>	Assenzio Selvatico	marginie dei boschi, cespuglieti, muri
Araceae	<i>Arum italicum</i>	Gigaro Chiaro	fossi boschi vigneti oliveti e siepi
Poaceae	<i>Arundo donax</i>	Canna Comune	sponde di canali luoghi freschi e tendenzialmente umidi: coltivati
Liliaceae	<i>Asparagus acutifolius</i>	Asparago	macchie
Rubiaceae	<i>Asperula arvensis</i>	Stellina Dei Campi	boschi decidui e nella macchia, ma si trova anche in cunei ombreggiati, praterie e praterie e giardini rurali
Liliaceae	<i>Asphodelus fistulosus</i>	Asfodelo Fistoloso	prati aridi e pascoli
Liliaceae	<i>Asphodelus microcarpus</i>	Asfodelo Mediterraneo	incolti e pascoli
Aspleniaceae	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Asplenio	rupi calcaree
Asteraceae	<i>Aster squamatus</i>	Astro Autunnale	fessure dei lastricati e lungo i marciapiedi incolti umidi
Fabaceae	<i>Astragalus danicus</i>	Veccia Viola Del Latte	pascoli ed incolti aridi
Faseolaceae	<i>Astragalus monspessulanus</i>	Astralago Rosato	rupi, prati aridi, pascoli
Asteraceae	<i>Atractylis gummifera</i>	Masticogna Latticifera	garighe, luoghi aridi e rocciosi, bordi stradali

Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Avena Barbata	incolti
Poaceae	<i>Avena fatua</i>	Avena Selvatica	prati campi di cereali e siepi
Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Habitat
Poaceae	<i>Avena sterilis</i>	Avena Maggiore	luoghi aridi sterili, ruderalizzati, lungo le vie, su scarpate, in orti e coltivi, ai margini degli abitati, anche nei campi di cereali
Orobanchaceae	<i>Bellardia trixago</i>	Perlina Minore	incolti, garighe
Asparagaceae	<i>Bellevalia romana</i>	Giacinto Romano	campi, luoghi erbosi, prati e vigneti
Asteraceae	<i>Bellis perennis</i>	Pratolina Comune	incolti, i prati, i giardini e parchi
Gentianaceae	<i>Blackstonia perfoliata</i>	Centauro Giallo	bordi delle aree boschive, sui cigli delle strade, nei terreni poveri e sabbiosi
Boraginaceae	<i>Borago officinalis</i>	Borragine Comune	campi incolti siepi muri e margini di strada
Poaceae	<i>Brachypodium pinnatum</i>	Paleo Comune	prati aridi boscaglie e scarpate
Apiaceae	<i>Brachypodium ramosum</i>	Paleo Delle Garighe	prati aridi, le boscaglie
Alismataceae	<i>Brachypodium rupestre</i>	Paleo Rupestre	prati aridi, le boscaglie
Brassicaceae	<i>Brassica nigra</i>	Senape Nera	campi, sentieri, al margine dei corsi d'acqua e negli ambienti ruderali
Poaceae	<i>Briza minor</i>	Sonaglini Minore	macchie, radure, incolti aridi
Graminaceae	<i>Bromus erectus</i>	Forasacco Eretto	prati aridi muri ripari sotto roccia e praterie rase
Graminaceae	<i>Bromus molliformis</i>	Forasacco Peloso	incolti aridi
Poaceae	<i>Bromus squarrosus</i>	Forasacco Pendolino	incolti, i prati aridi e le siepi
Brassicaceae	<i>Bunias erucago</i>	Cascellore Comune	ruderi, incolti erbosi, colture sarchiate
Asteraceae	<i>Calendula arvensis</i>	Calendula Dei Campi	terreni incolti, margine sentieri e strade, vigneti
Asteraceae	<i>Calendula officinalis</i>	Fiorrancio	prati incolti oliveti vigneti e bordi stradali
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i>	Vilucchio Bianco	colture erbacee, dei cereali, dei vigneti e degli incolti, sulle siepi, nelle radure dei boschi
Cruciferae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Borsa Pastore Comune	incolti
Asteraceae	<i>Carduus nutans</i>	Cardo Rosso	zone ruderali, le scarpate, i sentieri e strade rurali
Compositae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo Saettone	incolti aridi, ambienti ruderali e scarpate
Cyperaceae	<i>Carex hirta</i>	Carice Villosa	boschi, praterie, siepi
Asteraceae	<i>Carlina corymbosa</i>	Carlina Raggio D'oro	incolti aridi, gli oliveti e le vigne ambienti ruderali, scarpate, garighe e macchie basse

Asteraceae	<i>Carthamus lanatus</i>	Zafferanone Selvatico	incolti aridi, gli oliveti e le vigne ambienti ruderali, scarpate, garighe e macchie basse
Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Habitat
Gentianaceae	<i>Centaurea erythraea</i>	Centaurea Minore	macchie margini di strade e viottoli, campi da gioco, ambienti ruderali
Caryophyllaceae	<i>Cerastium glomeratum</i>	Peverina Dei Campi	prati incolti, pascoli aridi, cedui, anche ruderali ed infestante
Boraginaceae	<i>Cerinthe major</i>	Erba Vajola	cespuglieti, fossati ombrosi
Apiaceae	<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfoglio Inebriante	incolti, siepi, macerie, bordi stradali boschivi semi ombreggiati
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Farinello Comune	zone incolte e ruderali
Compositae	<i>Chrysanthemum segetum</i>	Crisantemo Campestre	coltivi, incolti e bordo strade
Asteraceae	<i>Chrysanthemum coronarium</i>	Crisantemo Giallo	campi coltivati, negli incolti, lungo i bordi stradali, nei ruderi, in zone soleggiate
Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Cicoria Comune	margini di sentieri campi coltivati terreni incolti zone a macerie ambienti ruderali praterie e aree antropizzate
Compositae	<i>Cirsium arvense</i>	Cardo Campestre	incolti
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo Asinino	depressioni e incolti
Cistaceae	<i>Cistus creticus</i>	Cisto Di Creta	macchia mediterranea, nelle garighe, sempre al limite dei boschi
Cistaceae	<i>Cistus incanus</i>	Cisto Rosso	macchie
Ranunculaceae	<i>Clematis flammula</i>	Clematide Fiammella	macchie, leccete, garighe, cespugli, siepi, bordi di strade
Ranunculaceae	<i>Clematis vitalba</i>	Clematide Vitalba	siepi
Umbelliferae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta Maggiore	vicino a rigagnoli o siepi
Ranunculaceae	<i>Consolida regalis</i>	Speronella Consolida	campi di cereali, orti, coltivati
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Vilucchio Comune	luoghi coltivati ed incolti
Ranunculaceae	<i>Convolvulus cantabrica</i>	Vilucchio Bicchierino	erba infestante nelle colture di cereali
Convolvulaceae	<i>Convolvulus elegantissimus</i>	Vilucchio Elegantissimo	bordi di strade, incolti, siepi.
Asteraceae	<i>Conyza bonariensis</i>	Saepola Di Buenos Aires	bordo strade di campagna, suoli alterati, sabbie umide, incolti aridi ma anche in campi coltivati da 0 a 600 m
Cornaceae	<i>Cornus mas</i>	Corniolo	lungo sponde di torrenti boschi di latifoglie arbusteti e siepi
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino Comune	bosco e boscaglia
Asteraceae	<i>Crepis capillaris</i>	Radicchiella Capillare	cresce negli incolti, nei campi, in ambienti ruderali, lungo massicciate ferroviarie o lungo le vie, dal livello del mare

Asteraceae	<i>Crepis neglecta</i>	Radichella Minore	incolti, bordi stradali, ruderi
Asteraceae	<i>Crepis vesicaria</i>	Radichella	incolti, nei coltivi, lungo i vigneti, sulle rive dei canali e dei fiumi
Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Habitat
Iridaceae	<i>Crocus biflorus</i>	Zafferano Selvatico	prati e pascoli aridi, praterie rase del piano collinare e in parte dell'area subalpina; querceti sub-mediterranei, vigne ed oliveti preferibilmente su fondo calcareo da 0 a 1200 metri.
Asteraceae	<i>Crupina crupinastrum</i>	Erba Falsa	garighe, incolti, prati aridi, bordi delle strade.
Cupressaceae	<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso Sempreverde	zone calde e temperate
Primulaceae	<i>Cyclamen hederifolium</i>	Ciclamino	boschi ombrosi
Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i>	Carciofo Selvatico	pascoli aridi incolti margini delle strade
Poaceae	<i>Cynosurus echinatus</i>	Coda Di Cane	macchie, radure, pascoli aridi
Fabaceae	<i>Cytisus scoparius</i>	Ginestra Dei Carbonai	piano mediterraneo - montano
Graminaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Erba Marzolina Comune	luoghi erbosi e boscaglie aride
Poaceae	<i>Dasypyrum villosum</i>	Grano Villosa	incolti, pascoli aridi, macerie, bordi stradali, luoghi arenosi
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Carota	incolti, prati aridi, margini stradali e di fossi, ambienti ruderali, zone aperte e soleggiate
Ranunculaceae	<i>Delphinium halteratum</i>	Speronella Comune	prati, incolti
Poaceae	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Sanguinella	vigne, orti, incolti, bordi di vie macchie e cespuglieti
Brassicaceae	<i>Diplotaxis eruroides</i>	Ruchetta	campi, orti, incolti
Brassicaceae	<i>Diplotaxis muralis</i>	Rucola	prati, campi coltivati, vigne, bordo sentieri
Dipsacaceae	<i>Dipsacus fullonum</i>	Scardaccione	lungo le strade discariche e coltivi abbandonati
Asteraceae	<i>Dittrichia viscosa</i>	Inula Viscosa	incolti, campi abbandonati, bordi sentieri, scarpate
Fabaceae	<i>Dorycnium hirsutum</i>	Trifoglio Irsuto	prati aridi, incolti, scarpate, dune, terreni sabbiosi
Cucurbitaceae	<i>Ecballium elaterium</i>	Cocomero Asinino	ruderi incolti, pascoli aridi e soleggiati
Brassicaceae	<i>Echium italicum</i>	Rucola Selvatica	vive spontaneamente negli incolti e nei luoghi ruderali dal piano ai 1000 metri, prediligendo i terreni calcarei e sassosi
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Viperina Azzurra	luoghi sassosi, incolti, pascoli
Equisetaceae	<i>Equisetum fluviatile</i>	Equiseto	sabbie umide incolti umidi e sabbiosi, sponde di corsi d'acqua, fossi, bordi stradali
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Cicutaria	incolti, bordi di strade, prati asciutti, vigne, suoli sabbiosi

Apiaceae	<i>Eryngium amethystinum</i>	Calcatreppola Ametistina	prati aridi, in luoghi sassosi e assolati,
Apiaceae	<i>Eryngium campestre</i>	Calcatreppola	area mediterranea e submontana, in luoghi aridi, lungo strade, prati, zone rocciose
Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Habitat
Myrtaceae	<i>Eucalyptus spp.</i>	Eucalipto	terreni sciolti e profondi ad altitudini non superiori a 500-600 m.
Celastracee	<i>Euonymus europaeus</i>	Berretta Del Prete	margini delle foreste, siepi e dolci pendii,
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia falcata</i>	Euforbia Falcata	campi coltivati
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euforbia Calenzuola	incolti, pascoli aridi
Apiaceae	<i>Ferula communis</i>	Finocchiaccio	terreni aridi e calcarei delle zone collinari
Poaceae	<i>Festuca circummediterranea</i>	Festuca Mediterranea	luoghi erbosi dei piani collinare
Poaceae	<i>Festuca ovina</i>	Paleo Dei Montoni	terreni magri e con climi freddi e aridi
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Finocchio Selvatico	cespuglieti
Oleaceae	<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello	boschi
Oleaceae	<i>Fraxinus oxycarpa</i>	Frassino	boschi umidi, lungo le rive dei fiumi.
Papaveraceae	<i>Fumaria officinalis</i>	Fumaria Comune	campi, prati, lungo le strade, sia in pianura che in collina
Amarylloidaceae	<i>Galanthus nivalis</i>	Bucaneve	boschi umidi
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Attaccamani	bordi stradali, campi incolti, siepi, boscaglie, luoghi umidi ed erbosi
Rubiaceae	<i>Galium lucidum</i>	Caglio Lucido	prati aridi, su rupi e ghiaioni, su substrati calcarei ma anche marnoso arenacei
Rubiaceae	<i>Galium verum</i>	Caglio Zolfino	prati e margini di boschi
Geraniaceae	<i>Geranium molle</i>	Geranio Volgare	prati e luoghi erbosi, pascoli aridi, vigne
Geraniaceae	<i>Geranium rotundifolium</i>	Geranio Malvaccino	coltivi, giardini, orti e soprattutto vigneti, su suoli argillosi
Iridaceae	<i>Gladiolus italicus</i>	Gladiolo Dei Campi	campi coltivati a cereali
Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Edera	boscaglie
Fabaceae	<i>Hedysarum coronarium</i>	Sulla Comune	terreni incolti, bordi delle strade
Compositae	<i>Helianthus annuus</i>	Girasole Comune	campi coltivati zone abbandonate ambienti ruderali strade rurali e scarpate
Asteraceae	<i>Helichysum italicum</i>	Perpetuini d'Italia	garighe
Boraginaceae	<i>Heliotropium europaeum</i>	Eliotropio	luoghi erbosi, campi, orti, incolti ruderi, ambienti urbani

Ranunculaceae	<i>Helleborus foetidus</i>	Elleboro Puzzolente	marginie dei boschi cedui, luoghi sassosi e cespugliosi, in mezz'ombra,
Iridaceae	<i>Hermodactylus tuberosus</i>	Bocca Di Lupo	prati erbosi
Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Habitat
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Bambagione Pubescente	prati stabili, anche umidi e palustri
Poaceae	<i>Hordeum bulbosum</i>	Orzo Bulboso	prati aridi, negli incolti, lungo le strade, dal livello del mare alla fascia montana inferiore
Graminaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Orzo Selvatico	bordi di carraie
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Iperico	campi abbandonati ed ambienti ruderali.
Juncaceae	<i>Juncus articulatus</i>	Giunco Nodoso	ai margini di stagni, abbeveratoi
Juncaceae	<i>Juncus inflexus</i>	Giunco Tenace	campi, praterie, stagni
Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i>	Ginepro	pascoli e boschi aridi
Dipsacaceae	<i>Knautia arvensis</i>	Ambretta Comune	prati e pendii piuttosto magri
Dipsacaceae	<i>Knautia integrifolia</i>	Ambretta Annuale	incolti aridi, prati, radure e campi a riposo
Poaceae	<i>Koeleria splendens</i>	Paleo Splendente	lande rupestri ed in boscaglie aperte e luminose
Poaceae	<i>Lagurus ovatus</i>	Piumino Nano	luoghi aridi, sabbiosi, incolti, dune marittime, al margine dei sentieri.
Labiatae	<i>Lamium amplexicaule</i>	Falsa Ortica	incolti erbosi e prati
Asteraceae	<i>Lapsana communis</i>	Lassana Comune	boschi di latifoglie cedui orti campi coltivati zone ruderali e arbusteti
Fabaceae	<i>Lathyrus aphaca</i>	Cicerchia Bastarda	campi
Fabaceae	<i>Lathyrus cicera</i>	Cicerchiella	incolti aridi, campi
Leguminosae	<i>Lathyrus hirsutus</i>	Pisello Selvatico	incolti e terreni di risulta nei pressi delle pietraie
Leguminosae	<i>Lathyrus pratensis</i>	Cicerchia Dei Prati	prati fertili margini dei boschi e praterie rase rocciose
Leguminosae	<i>Lathyrus sylvestris</i>	Cicerchia Selvatica	prati aridi siepi e margini dei boschi
Malvaceae	<i>Lavatera punctata</i>	Malvone Punteggiato	capi siepi e incolti
Asteraceae	<i>Leontodon crispus</i>	Dente Di Leone	prati luoghi erbosi margini di strade e boschi
Oleaceae	<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro Comune	bosco e boscaglia
Linaceae	<i>Linum trigynum</i>	Lino Spinato	pascoli aridi macchie e garighe
Boraginaceae	<i>Lithospermum arvense</i>	Erba Perla Minore	coltivi, orti, bordi dei campi incolti, pascoli aridi, garighe, dal piano fino ai 1800m.

Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Loglio Comune	praterie
Graminaceae	<i>Lolium temulentum</i>	Zizzania	bordi dei campi
Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Habitat
Caprifoliaceae	<i>Lonicera caprifolium</i>	Caprifoglio Comune	sottobosco ombroso macchie e margini di boschi caducifogli
Caprifoliaceae	<i>Lonicera implexa</i> Aiton	Caprifoglio	macchia mediterranea, nelle selve (leccete, boscaglie, misti cedui)
Fabaceae	<i>Lotus corniculata</i>	Ginestrino	prati, pascoli aridi
Malvaceae	<i>Malva silvestris</i>	Malva	terreni coltivati, ma anche luoghi incolti e abbandonati, presso ruderi e ai margini delle strade
Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrubio Comune	pianure secche, le stazioni aride e incolte
Asteraceae	<i>Matricaria camomilla</i>	Camomilla Comune	campi di cereali incolti e bordi di strada colture di cereali
Leguminosae	<i>Medicago lupulina</i>	Erba Medica Lupulina	prati
Fabaceae	<i>Medicago sativa</i>	Erba Medica	incolti, campi, campi aridi
Fabaceae	<i>Melilotus alba</i>	Meliloto Bianco	luoghi erbosi, degli incolti, degli ambienti ruderali
Fabaceae	<i>Melilotus officinalis</i>	Meliloto Comune	incolti campi prati e lungo le rive di corsi d'acqua
Labiatae	<i>Mentha arvensis</i>	Menta Campestre	prati paludosi campi umidi argini e fossati
Euphorbiaceae	<i>Mercurialis annua</i>	Mercorella Comune	suoli abbandonati, orti, uliveti, muri, macerie
Liliaceae	<i>Muscari atlanticum</i>	Muscari Atlantico	prati, pascoli, orti, vigne
Liliaceae	<i>Muscari comosum</i>	Lampascione	campi incolti prati
Boraginaceae	<i>Myosotis arvensis</i>	Nontiscordardimè Minore	coltivi, aiuole, scarpate, bordi di strade e sentieri, su suoli argillosi
Amaryllidaceae	<i>Narcissus tazetta</i>	Narciso Italiano	coltivi, prati, garighe
Cruciferae	<i>Nasturtium officinale</i>	Crescione D'acqua	corsi d'acqua
Ranunculaceae	<i>Nigella damascena</i>	Damigella Scapigliata	incolti asciutti, vigneti, campi e prati aridi, bordo sentieri,
Orobanchaceae	<i>Odontites luteus</i>	Perlina Gialla	luoghi aridi, pendii rocciosi, terreni calcarei
Oleaceae	<i>Olea europaea</i> L.	Olivo	macchie
Fabaceae	<i>Onobrychis viciifolia</i>	Lupinella Comune	prati e pascoli asciutti e basici (calcarei), incolti, bordi stradali
Fabaceae	<i>Ononis spinosa</i>	Arrestabue	prati e pascoli aridi, lungo i bordi delle strade e dei campi,
Orchidaceae	<i>Ophrys sphecodes</i>	Ofride Verde Bruna	prati aridi ma anche umidi

Orchidaceae	<i>Ophrys tenthredinifera</i>	Fior Di Vespa	terreno calcareo
Cactaceae	<i>Opuntia ficus-indica</i> ,	Fico D'india	habitat aridi e semi-aridi
Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Habitat
Orchidaceae	<i>Orchis italica</i>	Orchide Italica	pascoli garighe macchie e boschi radi
Orchidaceae	<i>Orchis purpurea</i>	Orchide Purpurea	pascoli garighe macchie e boschi radi
Asparagaceae	<i>Ornithogalum exscapum</i>	Latte Di Gallina	pascoli e prati aridi, anche in ambienti antropici come bordi di campi coltivati, vigne, oliveti e perfino su muri a secco inerbiti
Orobanchaceae	<i>Orobanche crenata</i>	Succiamele Delle Fave	colture; ma anche gli incolti, ...
Orobanchaceae	<i>Orobanche ramosa</i>	Succiamele Ramoso	su piante coltivate e spontanee
Poaceae	<i>Oryzopsis miliacea</i>	Miglio Multifloro	incolti, siepi, garighe
Santalaceae	<i>Osyris alba</i>	Ginestrella Comune	macchie
Rhamnaceae	<i>Paliurus spina-christi</i>	Marruca	pendii soleggiati, ma su terreni freschi anche argillosi
Asteraceae	<i>Pallenis spinosa</i>	Asterisco	incolti, pascoli aridi, margini di vie e ruderi
Papaveraceae	<i>Papaver rhoeas</i>	Papavero Comune	terreni rimossi
Scrophulariaceae	<i>Parentucellia viscosa</i>	Perlina Maggiore	luoghi erbosi aridi, pascoli sassosi ed incolti dal mare alla regione submontana
Apiaceae	<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinaca	prati, bordo strada, coltivi, scarpate ferroviarie
Poaceae	<i>Phleum ambiguum</i>	Codolina Meridionale	prati e pascoli aridi e in vegetazioni erbacee aperte
Poaceae	<i>Phragmites australis</i>	Cannuccia Di Palude	bordi di campi, depressioni ambienti acquatici
Poaceae	<i>Phragmites communis</i>	Canna Di Palude	ambienti umidi, stagni, fiumi e canali.
Oleaceae	<i>Phyllirea latifolia</i>	Ilatro Comune	macchie e leccete lungo le colline aride e le vallate rocciose in ambiente di macchia mediterranea
Asteraceae	<i>Picris echioides</i>	Aspraggine	di campi, zone antropizzate e incolti erbosi del piano collinare
Pinaceae	<i>Pinus halepensis</i>	Pino D'aleppo	macchia litoranea ed impianti artificiali
Pinaceae	<i>Pinus pinea</i>	Pino Domestico	impianti artificiali e boscaglia
Pinaceae	<i>Pinus sylvestris</i>	Pino Silvestre	terreni morbidi e areacei
Anacardiaceae	<i>Pistacia lentiscus</i>	Lentisco	macchie
Anacardiaceae	<i>Pistacia terebinthus</i>	Terebinto	boschi termofili pendii di rocce calcaree e aride
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i>	Piantaggine	incolti, le aree lungo le vie, i campi, le vigne, gli ambienti ruderali e altre zone sinantropiche prati erbosi

Graminaceae	<i>Poa annua</i>	Fienarola Annuale	prati
Poaceae	<i>Poa pratensis</i>	Fienarola	pendii erbosi e i prati
Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Habitat
Boraginaceae	<i>Polmonaria officinalis</i>	Polmonaria	crece prevalentemente in boschi di latifoglie eliofile, nelle pianure, nelle siepi e nei cespugli;
Polygalaceae	<i>Polygala comosa</i>	Poligala	prati magri e nelle lande in siti caldi e assolati
Polygonaceae	<i>Polygonum lapathifolium</i>	Poligono Nodoso	ambienti ruderali e coltivi
Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Pioppo Bianco	boscaglie depresse
Salicaceae	<i>Populus tremula</i>	Pioppo Tremulo	boschi collinari e montani, umidi
Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i>	Portulaca	incolti
Potamogetonaceae	<i>Potamogeton natans</i>	Bietola D'acqua	laghi, paludi, corsi d'acqua
Rosaceae	<i>Potentilla reptans</i>	Cinquefoglia Comune	prati argillosi umidi
Rosaceae	<i>Potentilla tabernaemontani</i>	Cinquefoglia Primaticcia	prati aridi e sui pendii assolati calcarei
Primulaceae	<i>Primula vulgaris</i>	Primula	torrenti muri a secco prati e boschi
Labiatae	<i>Prunella vulgaris</i>	Brunella	luoghi erbosi e boscaglie
Rasaceae	<i>Prunus avium</i>	Ciliegio	aree agricole collinari
Rosaceae	<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo Selvatico	cespuglieti macchie basse , rupi litoranee
Asteraceae	<i>Pulicaria dysenterica</i>	Incensaria Comune	prati umidi, le paludi e i fossi macchie, margini boschivi, sugherete, prati incolti
Rosaceae	<i>Pyrus pyraeaster</i>	Perastro	macchia e garighe
Fagaceae	<i>Quercus cerris</i>	Cerro	pianura e collina
Fagaceae	<i>Quercus ilex</i>	Leccio	boschi misti di caducifoglie della fascia collinare
Fagaceae	<i>Quercus pubescens</i>	Roverella	boschi e boscaglie
Rhamnaceae	<i>Ramnus alaternus</i>	Alaterno	macchia mediterranea e delle garighe delle regioni a clima mediterraneo
Ranunculaceae	<i>Ranunculus millefoliatus</i>	Ranuncolo Millefoglio	pascoli sassosi aridi,
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Ranuncolo	prati e pascoli igrofili), sponde dei fossati e stagni
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Ravanello Selvatico	campi e bordi strade vigne, gli oliveti, ambienti ruderali, scarpate
Resedaceae	<i>Reseda alba</i>	Erba Ruchetta	incolti, vecchi muri, ghiaie, margine della strada muri, ghiaie, rocce, predilige i luoghi sabbiosi e il clima secco

Resedaceae	<i>Reseda lutea</i>	Reseda Comune	incolti, ruderi, greti, margini delle strade
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia Pseudoacacia	sorgenti, ruscelli
Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Habitat
Rosaceae	<i>Rosa canina</i>	Rosa Canina	boscaglie arbusteti e siepi
Lamiaceae	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Rosmarino	macchia, luoghi aridi e soleggiati
Rosaceae	<i>Rubus caesius</i>	Rovo Bluastro	boschi ripariali, forre, suoli boschivi umidificati
Rosaceae	<i>Rubus fruticosus</i>	Rovo Comune	boschi macchia mediterranea incolti
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Rovo Selvatico	depressioni tra le boscaglie
Poligonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Romice Crespa	terreni umidi e argillosi, nei prati e ai margini delle strade, ruderi, specie sinantropa frequente nei coltivi, frutteti, vigneti, prati concimati, incolti e ruderi
Liliaceae	<i>Ruscus aculeatus</i>	Pungitopo	zone boschive
Solanaceae	<i>Salanum nigrum</i>	Morella Comune	incolti e ruderi; ma anche bordi dei sentieri e strade. si trova facilmente negli orti, nelle vigne o campi di granoturco
Salicaceae	<i>Salix alba</i>	Salice Comune	aree di bosco umido e dal greto di fiumi torrenti e ruscelli
Salicaceae	<i>Salix caprea</i>	Salicone	radure e bordi di boschi
Salicaceae	<i>Salix purpurea</i>	Salice Rosso	aree di bosco umido e dal greto di fiumi torrenti e ruscelli
Labiatae	<i>Salvia officinalis</i>	Salvia Comune	terreni calcarei sassosi e drenanti
Labiatae	<i>Salvia pratensis</i>	Salvia Dei Prati.	pascoli magri, nei prati, nei luoghi sassosi, nelle radure, frequente nei luoghi asciutti e soleggiati,
Adoxaceae	<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco Comune	boschi umidi
Rosaceae	<i>Sanguisorba minor</i>	Pimpinella	prati margini boscaglie e siepi
Asteraceae	<i>Scorzonera villosa</i>	Scorzonera Villosa	pascoli e prati aridi-steppici, pref. su terreni calcarei
Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio Comune	prati
Orchidaceae	<i>Serapias lingua</i>	Serapide Lingua	praterie, negli incolti, nella garighe e margini di macchia mediterranea
Poaceae	<i>Setaria verticillata</i>	Pabbio Verticillato	incolti erbosi e coltivi del piano collinare
Caryophyllaceae	<i>Silene alba</i>	Silene Bianca	luoghi incolti e le zone ruderali
Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo Mariano	ruderi, lungo le strade, le siepi e negli incolti.
Brassicaceae	<i>Sinapis alba</i>	Senape Bianca	campi coltivati, negli incolti, lungo i bordi stradali, nei ruderi

Smilacaceae	<i>Smilax aspera</i>	Salsapariglia	per rivestire recinzioni, muri o cancelli
Asteraceae	<i>Sonchus asper</i>	Grespino Spinoso	ambienti ruderali incolti
Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Habitat
Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i>	Grespino Comune	ambienti ruderali, ai margini delle strade, nelle discariche e in cantieri edili, sui muri
Rosaceae	<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo Domestico	boschi submediterranei
Graminaceae	<i>Sorghum halepense</i>	Sorgo Selvatico	habitat ruderali suoli sabbiosi e aridi
Fabacee	<i>Spartium junceum</i>	Ginestra Odorosa	incolti gariga macchia mediterranea
Caryophyllaceae	<i>Spergularia rubra</i>	Spergularia Comune	incolti, lungo sentieri battuti, su suoli sabbiosi e aridi
Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i>	Centocchio Comune	luoghi incolti e ruderali
Poaceae	<i>Stipa austroitalica</i>	Lino Delle Fate	prati pascoli collinari e montani sassosi e aridi
Tamaricaceae	<i>Tamarix gallica</i>	Tamerice	ambienti litoranei e sabbiosi
Dioscoreaceae	<i>Tamus communis</i>	Tamaro	siepi e boscaglie
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> Weber	Tarassaco comune	chiarite dei boschi caducifogli, nei prati concimati e negli ambienti ruderali, generalmente sinantropa
Lamiaceae	<i>Teucrium camaedrys</i>	Camedrio Comune	boschi molto aperti, in prati aridi
Brassicaceae	<i>Thlaspi perfoliatum</i>	Erba Storna Perfogliata	campi di cereali, gli orti e zone ruderali
Apiaceae	<i>Tordylium apulum</i>	Ombrellini Pugliese	terreni incolti e lungo le strade
Apiaceae	<i>Tordylium maximum</i>	Ombrellini Maggiori	incolti, ruderi, bordi di strade
Asteraceae	<i>Tragopogon porrifolium</i>	Raperonzolo Selvatico	prati aridi, terreni incolti, bordi di strade di campagna
Fabaceae	<i>Trifolium campestre</i>	Trifoglio Campestre	pascoli aridi prati sabbiosi
Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i>	Trifoglio Dei Prati	prati argillosi
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trifoglio Bianco	su prati erbosi, campi coltivati e in un gran numero di altri habitat
Graminaceae	<i>Triticum durum</i>	Grano Duro	campi coltivati
Thyfaceae	<i>Typha latifolia</i>	Lisca Maggiore	aree umide
Thyphaceae	<i>Typha minima</i>	Tifa Minima	acque stagnanti sponde di fiumi paludi e fossati
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i>	Olmo Campestre	boscaglie di depressioni, alberature su bordi stradali
Asteraceae	<i>Urospermum dalechampii</i>	Boccione Maggiore	lungo i bordi delle strade urbane, i sentieri di campagna, nei terreni aridi e incolti

Urticaceae	<i>Urtica dioica</i>	Ortica	siepi, luoghi ruderali ed incolti
Valerianaceae	<i>Valerianella dentata</i>	Gallinella Comune	incolti, orti e campi di cereali
Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Habitat
Scrophulariaceae	<i>Verbascum macrurum</i>	Verbascio Coda Grossa	incolti, bordi stradali, campi, zone ruderali
Verbenaceae	<i>Verbena officinalis</i>	Verbena	prati, luoghi incolti, macerie
Fabaceae	<i>Vicia cracca</i>	Veccia Montanina	prati, ruderi, siepi
Fabaceae	<i>Vicia hirsuta</i>	Veccia Tentennina	incolti, prati aridi, anche nelle coltivazioni di cereali
Leguminosae	<i>Vicia sativa</i>	Veccia Comune	incolti e prati
Violaceae	<i>Viola alba</i>	Viola Bianca	boschi, radure, siepi, luoghi erbosi
Violaceae	<i>Viola arvensis</i>	Viola Dei Campi	prati cespugli e incolti
Violaceae	<i>Viola odorata</i>	Viola Mammola	luoghi erbosi ed incolti, margini boschivi, siepi, prati
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Vite Comune	predilige le basse latitudini, dove predomina un clima soleggiato, ma può adattarsi anche ad alte latitudini
Asteraceae	<i>Xanthium spinosum</i>	Nappola Spinosa	incolti aridi e le aree ruderali.
Specie n. 303			

Tabelle e grafici Famiglie Flora individuata all'interno dell'area di studio

Parco Eolico Fenice Famiglie Floristiche		
<i>Famiglia</i>	<i>Numero</i>	<i>Percentuale</i>
Adoxaceae	1	0%
Alismataceae	1	0%
Alliaceae	1	0%
Amaranthaceae	2	1%
Amaryllidaceae	3	1%
Anacardiaceae	2	1%
Apiaceae	12	4%
Araceae	2	1%
Araliaceae	1	0%
Aristolochiaceae	1	0%
Aspleniaceae	3	1%
Asteraceae	40	13%
Boraginaceae	9	3%
Brassicaceae	9	3%
Cactaceae	1	0%
Caprifoliaceae	2	1%
Caryophyllaceae	4	1%
Celastraceae	1	0%
Chenopodiaceae	1	0%
Cistaceae	2	1%
Composite	5	2%
Convolvulaceae	3	1%
Cornaceae	2	1%
Cruciferae	2	1%
Cucurbitaceae	1	0%
Cupressaceae	2	1%
Cyperaceae	1	1%
Dioscoreaceae	1	0%
Dipsacaceae	3	1%
Equisetaceae	1	0%
Euphorbiaceae	3	1%
Fabaceae	20	7%
Fagaceae	3	1%
Faseolaceae	1	0%

<i>Famiglia</i>	<i>Numero</i>	<i>Percentuale</i>
Gentianaceae	2	1%
Graminaceae	12	4%
Hypericaceae	1	0%
Iridaceae	3	1%
Juncaceae	2	1%
Labiatae	5	2%
Lamiaceae	5	2%
Leguminosae	5	2%
Liliaceae	8	2%
Linaceae	1	0%
Malvaceae	2	1%
Maryllidaceae	1	0%
Myrtaceae	1	0%
Oleaceae	5	2%
Orchidaceae	6	2%
Orobanchaceae	4	1%
Papaveraceae	2	1%
Pinaceae	3	1%
Plantaginaceae	2	1%
Poaceae	30	9%
Poligonaceae	1	0%
Polygonaceae	2	1%
Portulacaceae	1	0%
Potamogetonaceae	1	0%
Primulaceae	4	1%
Ranunculaceae	10	3%
Rasaceae	1	0%
Resedaceae	2	1%
Rhamnaceae	2	1%
Rosaceae	12	4%
Rubiaceae	4	1%
Salicaceae	5	2%
Santalaceae	1	0%
Sapindaceae	2	1%
Scrophulariaceae	2	1%
Simarubaceae	1	0%
Smilacaceae	1	0%

<i>Famiglia</i>	<i>Numero</i>	<i>Percentuale</i>
Solonaceae	2	1%
Tamaricaceae	1	0%
Thyphaceae	1	1%
Ulmaceae	1	0%
Umbelliferae	1	0%
Urticaceae	1	0%
Valerianaceae	1	0%
Verbenaceae	1	0%
Violaceae	3	1%
Vitaceae	1	0%

Normative di inserimento della Flora presente nell'Area di Studio

Normative Internazionali e Nazionali per la protezione della Vegetazione e Flora																																						
Berna	Allegato I (1999)																																					
Cites A	Allegato A del Regolamento (CE) n. 2307/97																																					
Cites B	Allegato B del Regolamento (CE) n. 2307/97																																					
Cites D	Allegato D del Regolamento (CE) n. 2307/97																																					
Habitat all.2	Allegato 2 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato <i>Specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.)</i> . Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997. Il simbolo P indica che la specie è prioritaria.																																					
Habitat all.4	Allegato 4 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato <i>Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa</i> . Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997.																																					
Habitat all. 5	Allegato 5 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato <i>Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione</i> . Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997.																																					
Barcellona all. 2	Allegato 2 alla Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento adottata il 16 Febbraio 1976, e approvata con Decisione del Consiglio Europeo 25 luglio 1977, n. 77/585/CEE(G.U.C.E. 19 settembre 1977, n.L 240).																																					
Endemica.	specie il cui areale di distribuzione è rispettivamente limitato all’Italia o si estende anche ai territori vicini																																					
IUCN	Categoria IUCN, di cui segue la decodifica dei suffissi principali, attribuita a livello nazionale secondo la pubblicazione Conti et al., 1997. Nel caso la specie sia minacciata solo a livello di alcune Regioni è stato messo il simbolo x. Per i Licheni e le Briofite il testo di riferimento è Conti et al. 1992. Legende delle categorie IUCN: <table><tr><th>Categoria in italiano</th><th>Categoria in inglese</th><th>Sigla</th></tr><tr><td>Estinto</td><td>Extinct</td><td>EX</td></tr><tr><td>Estinto in natura</td><td>Extinct in the wild</td><td>EW</td></tr><tr><td>Gravemente minacciato</td><td>Critically endangered</td><td>CR</td></tr><tr><td>Minacciato</td><td>Endangered</td><td>EN</td></tr><tr><td>Vulnerabile</td><td>Vulnerable</td><td>VU</td></tr><tr><td>A minor rischio</td><td>Lower Risk</td><td>LR</td></tr><tr><td>Dipendenti dalla protezione</td><td>Conservation Dependent</td><td>cd</td></tr><tr><td>Quasi a rischio</td><td>Near Threatened</td><td>nt</td></tr><tr><td>A rischio relativo</td><td>Least Concern</td><td>lc</td></tr><tr><td>Dati insufficienti</td><td>Data Deficient</td><td>DD</td></tr><tr><td>Non valutato</td><td>Not Evaluated</td><td>NE</td></tr></table>		Categoria in italiano	Categoria in inglese	Sigla	Estinto	Extinct	EX	Estinto in natura	Extinct in the wild	EW	Gravemente minacciato	Critically endangered	CR	Minacciato	Endangered	EN	Vulnerabile	Vulnerable	VU	A minor rischio	Lower Risk	LR	Dipendenti dalla protezione	Conservation Dependent	cd	Quasi a rischio	Near Threatened	nt	A rischio relativo	Least Concern	lc	Dati insufficienti	Data Deficient	DD	Non valutato	Not Evaluated	NE
Categoria in italiano	Categoria in inglese	Sigla																																				
Estinto	Extinct	EX																																				
Estinto in natura	Extinct in the wild	EW																																				
Gravemente minacciato	Critically endangered	CR																																				
Minacciato	Endangered	EN																																				
Vulnerabile	Vulnerable	VU																																				
A minor rischio	Lower Risk	LR																																				
Dipendenti dalla protezione	Conservation Dependent	cd																																				
Quasi a rischio	Near Threatened	nt																																				
A rischio relativo	Least Concern	lc																																				
Dati insufficienti	Data Deficient	DD																																				
Non valutato	Not Evaluated	NE																																				

Status legale specie floristiche Fenice

Parco Eolico Fenice Status Legale Flora													
Nome italiano	Nome latino	Normative											
		Berna	Cites A	Cites B	Cites D	Habitat all. 2	Habitat all. 4	Habitat all. 5	Barcexxon a all. 2	Endemica	IUCN	Lista Rossa Regionale	
Acero Campestre	<i>Acer campestre</i> L.												
Acero Minore	<i>Acer monspessulanum</i> L.												
Aglione Delle Bisce	<i>Allium sphaerocephalon</i> L.												
Aglione Italiano	<i>Allium pendulinum</i> Ten.												
Aglione Maggiore	<i>Allium nigrum</i> L.												
Aglione Pelosetto	<i>Allium subhirsutum</i> L.												
Ailanto	<i>Ailanto altissima</i> Mill.												
Alaterno	<i>Ramnus alaternus</i> L.												
Amaranto Bianco	<i>Amaranthus albus</i> L.												
Amaranto Comune	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.												
Ambretta Annuale	<i>Knautia integrifolia</i> (L.) Bertol.												
Ambretta Comune	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coulter												
Anemone Fior-Stella	<i>Anemone hortensis</i> L.												
Arabetta Irsuta	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.												
Arisaro Comune	<i>Arisarum vulgare</i> Targ. - Tozz.												
Aristolochia Rotonda	<i>Aristolochia rotunda</i> L.												
Arrestabue	<i>Ononis spinosa</i> L.												
Asfodelo Fistoloso	<i>Asphodelus fistulosus</i> L.												
Asfodelo Mediterraneo	<i>Asphodelus microcarpus</i> Salzm.												

Asparago	<i>Asparagus acutifolius L.</i>												
Asplenio	<i>Asplenim ruta-muraria L.</i>												
Aspraggine	<i>Picris echioides L.</i>												
Assenzio Selvatico	<i>Artemisia vulgaris L.</i>												
Asterisco	<i>Pallenis spinosa (L.) Cass.)</i>												
Astralago Rosato	<i>Astragalus monspessulanus L.</i>												
Astro Autunnale	<i>Aster squamatus L.</i>												
Attaccamani	<i>Galium aparine L.</i>												
Avena Altissima	<i>Arhenatherum elatius L.</i>												
Avena Barbata	<i>Avena barbata L.</i>												
Avena Maggiore	<i>Avena sterilis L., 1762</i>												
Avena Selvatica	<i>Avena fatua L.</i>												
Bambagione Pubescente	<i>Holcus lanatus L.</i>												
Berretta Del Prete	<i>Euonymus europaeus L.</i>												
Biancospino Comune	<i>Crataegus monogyna Jacq.</i>												
Bietola D'acqua	<i>Potamogeton natans L.</i>												
Bocca Di Lupo	<i>Hermodactylus tuberosus (L.)</i>												
Boccione Maggiore	<i>Urospermum dalechampii L.</i>												
Borragine Comune	<i>Borago officinalis L.</i>												
Borsa Pastore Comune	<i>Capsella bursa-pastoris (L.)</i>												
Brunella	<i>Prunella vulgaris L.</i>												
Bucaneve	<i>Galanthus nivalis L., 1753</i>			x				x					
Buglossa Azzurra	<i>Anchus italica Retz</i>												
Buglossa Comune	<i>Anchusa officinalis L.</i>												
Bugola	<i>Ajuga reptans L.</i>												
Caglio Lucido	<i>Galium lucidum All.</i>												

Caglio Zolfino	<i>Galium verum L.</i>												
Calcatreppola	<i>Eryngium campestre L.</i>												
Calcatreppola Ametistina	<i>Eryngium amethystinum L.</i>												
Calendula Dei Campi	<i>Calendula arvensis L.</i>												
Camedrio Comune	<i>Teucrium camaedrys L.</i>												
Camepizio	<i>Ajuga chamaepitys (L.) Schreber</i>												
Camomilla Bastarda	<i>Anthemis arvensis L.</i>												
Camomilla Comune	<i>Matricaria camomilla L.</i>												
Camomilla Dei Tintori	<i>Anthemis tinctoria L.</i>												
Camomilla Mezzana	<i>Anthemis cotula L.</i>												
Canna Comune	<i>Arundo donax L.</i>												
Canna Di Palude	<i>Phragmites communis (Cav.) Trin. ex Steud</i>												
Cannuccia Di Palude	<i>Phragmites australis (Cav.) Trin.</i>												
Cappellini Comuni	<i>Agrostis stolonifera L.</i>												
Caprifoglio	<i>Lonicera implexa Aiton</i>												
Caprifoglio Comune	<i>Lonicera caprifolium L.</i>												
Carciofo Selvatico	<i>Cynara cardunculus L.</i>												
Cardo Asinino	<i>Cirsium vulgare (Savi) Ten.</i>												
Cardo Campestre	<i>Cirsium arvense (L.) Scop.</i>												
Cardo Mariano	<i>Silybum marianum (L.) Gaertn</i>												
Cardo Rosso	<i>Carduus nutans L.</i>												
Cardo Saettone	<i>Carduus pycnocephalus L.</i>												
Carice Villosa	<i>Carex hirta L.</i>												
Carlina Raggio D'oro	<i>Carlina corymbosa L.</i>												
Carota	<i>Daucus carota L.</i>												
Cascellore Comune	<i>Bunias erucago L.</i>												

Centaurea Minore	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn												
Centauro Giallo	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.												
Centocchio Comune	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.												
Centonchio azzurro	<i>Anagallis foemina</i> Miller												
Cerfoglio Inebriante	<i>Chaerophyllum temulum</i> L.												
Cerro	<i>Quercus cerris</i> L.												
Cicerchia Bastarda	<i>Lathyrus aphaca</i> L.												
Cicerchia Dei Prati	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753												
Cicerchia Selvatica	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.												
Cicerchiella	<i>Lathyrus cicera</i> L., 1753												
Ciclamino	<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton			x								x	
Cicoria Comune	<i>Cichorium intybus</i> L.												
Cicuta Maggiore	<i>Conium maculatum</i> L.												
Cicutaria	<i>Erodium cicutarium</i> (L.)												
Ciliegio	<i>Prunus avium</i> L.												
Cinquefoglia Comune	<i>Potentilla reptans</i> L.												
Cinquefoglia Primaticcia	<i>Potentilla tabernaemontani</i> Asch.												
Cipresso Sempreverde	<i>Cupressus sempervirens</i> L.												
Cisto Di Creta	<i>Cistus creticus</i> L.												
Cisto Rosso	<i>Cistus incanus</i> L.												
Clematide Vitalba	<i>Clematis vitalba</i> L.												
Clematide Fiammella	<i>Clematis flammula</i> L.												
Cocomero Asinino	<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Rich.												
Coda Di Cane	<i>Cynosurus echinatus</i> L.												
Coda Di Topo Comune	<i>Alopecurus pratensis</i> L.												
Codolina Meridionale	<i>Phleum ambiguum</i> Ten.												

Corniolo	<i>Cornus mas L.</i>												
Crescione D'acqua	<i>Nasturtium officinale (L.) Bess</i>												
Crisantemo Campestre	<i>Chrysanthemum segetum L.</i>												
Crisantemo Giallo	<i>Chysanthemum coronarium L.</i>												
Damigella Scapigliata	<i>Nigella damascena L.</i>												
Dente Di Leone	<i>Leontodon crispus Vill</i>												
Edera	<i>Hedera helix L.</i>												
Eliotropio	<i>Heliotropium europaeum L.</i>												
Elleboro Puzzolente	<i>Helleborus foetidus L., 1753</i>												
Equiseto	<i>Equisetum fluviatile L.</i>												
Erba Di San Guglielmo	<i>Agrimonia eupatoria L.</i>												
Erba Falsa	<i>Crupina crupinastrum Moris</i>												
Erba Marzolina Comune	<i>Dactylis glomerata L.</i>												
Erba Medica	<i>Medicago sativa L.</i>												
Erba Medica Lupulina	<i>Medicago lupulina L.</i>												
Erba Perla Minore	<i>Lithospermum arvense L.</i>												
Erba Ruchetta	<i>Reseda alba L.</i>												
Erba Storna Perfogliata	<i>Thlaspi perfoliatum L.</i>												
Erba Vajola	<i>Cerinthe major L.</i>												
Eucalipto	<i>Eucalyptus spp.</i>												
Euforbia Calenzuola	<i>Euphorbia helioscopia L.</i>												
Euforbia Falcata	<i>Euphorbia falcata L.</i>												
Falsa Ortica	<i>Lamium amplexicaule L.</i>												
Farinello Comune	<i>Chenopodium album L.</i>												
Festuca Mediterranea	<i>Festuca circummediterranea Patzke</i>												
Fico D'india	<i>Opuntia ficus-indica, Miller 1768</i>												

Fienarola	<i>Poa pratensis L.</i>												
Fienarola Annuale	<i>Poa annua L.</i>												
Finocchiaccio	<i>Ferula communis L.</i>												
Finocchio Selvatico	<i>Foeniculum vulgare Mill.</i>												
Fior Di Vespa	<i>Ophrys tenthredinifera Willd</i>												
Fiorrancio	<i>Calendula officinalis L.</i>												
Forasacco Eretto	<i>Bromus erectus Hudson</i>												
Forasacco Peloso	<i>Bromus molliformis Lloyd</i>												
Forasacco Pendolino	<i>Bromus squarrosus L.</i>												
Frassino	<i>Fraxinus oxycarpa Bieb.</i>												
Fumaria Comune	<i>Fumaria officinalis L.</i>												
Gallinella Comune	<i>Valerianella dentata (L.) Pollich</i>												
Geranio Malvaccino	<i>Geranium rotundifolium</i>												
Geranio Volgare	<i>Geranium molle L.</i>												
Giacinto Romano	<i>Bellevalia romana (L.) Sweet</i>												
Gigaro Chiaro	<i>Arum italicum Miller</i>												
Ginepro	<i>Juniperus communis</i>												
Ginestra Dei Carbonai	<i>Cytisus scoparius (L.) Link, 1822)</i>												
Ginestra Odorosa	<i>Spartium junceum L.</i>												
Ginestrella Commune	<i>Osyris alba L.</i>												
Ginestrino	<i>Lotus corniculata L.</i>												
Girasole Comune	<i>Heliantus annus L.</i>												
Giunco Nodoso	<i>Juncus articulatus L.</i>												
Giunco Tenace	<i>Juncus inflexus L.</i>												
Gladiolo Dei Campi	<i>Gladiolus italicus Miller</i>												
Gramigna	<i>Agropyron repens (L.) Beauv.</i>												

Grano Duro	<i>Triticum durum</i> Desf.												
Grano Villoso	<i>Dasypyrum villosum</i> (L.) Borbas												
Grespino Comune	<i>Sonchus oleraceus</i> L.												
Grespino Spinoso	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill.												
Ilatro Comune	<i>Phyllirea latifolia</i> L.												
Incensaria Comune	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh												
Inula Viscosa	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Aiton)												
Iperico	<i>Hypericum perforatum</i> L.												
Lampascione	<i>Muscari comosum</i> L.												
Lassana Comune	<i>Lapsana communis</i> L.												
Latte Di Gallina	<i>Ornithogalum exscapum</i> Ten.												
Leccio	<i>Quercus ilex</i> L.												
Lentisco	<i>Pistacia lentiscus</i> L.												
Ligustro Comune	<i>Ligustrum vulgare</i> L.												
Lino Delle Fate	<i>Stipa austroitalica</i> Martinovsky	X				P	X			X			
Lino Spinato	<i>Linum trigynum</i> L.												
Lisca Maggiore	<i>Typha latifolia</i> L.												
Loglio Comune	<i>Lolium perenne</i> L.												
Lupinella Comune	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.												
Malva	<i>Malva silvestris</i> L.												
Malvone Punteggiato	<i>Lavatera punctata</i> All.												
Marrubio Comune	<i>Marrubium vulgare</i> L.												
Marruca	<i>Paliurus spina-christi</i> Milker												
Masticogna Latticifera	<i>Atractylis gummifera</i> L.												
Meliloto Bianco	<i>Melilotus alba</i> Med.												
Meliloto Comune	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Coulot & Rabaute												

Menta Campestre	<i>Mentha arvensis L.</i>												
Mercorella Comune	<i>Mercurialis annua L.</i>												
Miglio Multifloro	<i>Oryzopsis miliacea L.</i>												
Mordigallina	<i>Anagallis arvensis L.</i>												
Morella Comune	<i>Salanum nigrum L.</i>												
Muscari Atlantico	<i>Muscari atlanticum Boiss. et Reuter</i>												
Nappola Spinosa	<i>Xanthium spinosum L.</i>												
Narciso Italiano	<i>Narcissus tazetta L.</i>												
Nontiscordardimè Minore	<i>Myosotis arvensis (L.) Hill</i>												
Ofride Verde Bruna	<i>Ophrys sphecodes Miller</i>			X									
Olivo	<i>Olea europaea L. var. sylvestris Brot.</i>												
Olmo Campestre	<i>Ulmus minor Miller</i>												
Ombrellini Maggiori	<i>Tordylium maximum L.</i>												
Ombrellini Pugliese	<i>Tordylium apulum L.</i>												
Orchide Italica	<i>Orchis italica Poiret</i>			X								X	
Orchide Purpurea	<i>Orchis purpurea Hudson</i>			X									
Orchidea Piramidale	<i>Anacamptis pyramidalis (L.)</i>												
Orniello	<i>Fraxinus ornus L.</i>												
Ortica	<i>Urtica dioica L.</i>												
Orzo Bulboso	<i>Hordeum bulbosum L.</i>												
Orzo Selvatico	<i>Hordeum murinum L.</i>												
Pabbio Verticillato	<i>Setaria verticillata (L.) Beauv.</i>												
Paleo Comune	<i>Brachypodium pinnatum (L.) Beauv</i>												
Paleo Dei Montoni	<i>Festuca ovina L.</i>												
Paleo Delle Garighe	<i>Brachypodium ramosum (L)</i>												
Paleo Odoroso	<i>Anthoxanthum odoratum L.</i>												


Paleo Rupestre	<i>Brachypodium rupestre (Host)</i>												
Paleo Splendente	<i>Koeleria splendens Presl</i>												
Papavero Comune	<i>Papaver rhoeas L.</i>												
Pastinaca	<i>Pastinaca sativa L.</i>												
Perastro	<i>Pyrus pyrastrer Burgsd.</i>												
Perlina Gialla	<i>Odontites luteus (L.) Clairv., 1811)</i>												
Perlina Maggiore	<i>Parentucellia viscosa (L.) Caruel</i>												
Perlina Minore	<i>Bellardia trixago L. (All.)</i>												
Perpetuini d'Italia	<i>Helichysum italicum Roth</i>												
Peverina Dei Campi	<i>Cerastium glomeratum Thuill.</i>												
Piantaggine	<i>Plantago major L.</i>												
Pimpinella	<i>Sanguisorba minor Scop.</i>												
Pino D'aleppo	<i>Pinus halepensis Miller</i>												
Pino Domestico	<i>Pinus pinea L.</i>												
Pino Silvestre	<i>Pinus sylvestris L., 1753</i>												
Pioppo Bianco	<i>Populus alba L.</i>												
Pioppo Tremulo	<i>Populus tremula L.</i>												
Pisello Selvatico	<i>Lathyrus hirsutus L.</i>												
Piumino Nano	<i>Lagurus ovatus L. Pium.</i>												
Poligala	<i>Polygala comosa Schkuhr</i>												
Poligono Nodoso	<i>Polygonum lapathifolium L.</i>												
Polmonaria	<i>Polmonaria officinalis L.</i>												
Portulaca	<i>Portulaca oleracea L.</i>												
Pratolina Comune	<i>Bellis perennis L.</i>												
Prezzemolo Bastardo	<i>Ammoides pusilla (Brot.) Breistr</i>												
Primula	<i>Primula vulgaris Huds., 1762</i>												

Prugnolo Selvatico	<i>Prunus spinosa L.</i>												
Pungitopo	<i>Ruscus aculeatus L.</i>												
Radicchiella Capillare	<i>Crepis capillaris (L.) Wallr</i>												
Radichella	<i>Crepis vesicaria L.</i>												
Radichella Minore	<i>Crepis neglecta L.</i>												
Ranuncolo	<i>Ranunculus repens L.</i>												
Ranuncolo Millefoglio	<i>Ranunculus millefoliatus Vahl.</i>												
Raperonzolo Selvatico	<i>Tragopogon porrifolium L.</i>												
Ravanello Selvatico	<i>Raphanus raphanistrum L.</i>												
Reseda Comune	<i>Reseda lutea L.</i>												
Robinia Pseudoacacia	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>												
Romice Crespa	<i>Rumex crispus L.</i>												
Rosa Canina	<i>Rosa canina L. sensu Bouleng.</i>												
Rosmarino	<i>Rosmarinus officinalis L.</i>												
Roverella	<i>Quercus pubescens Willd. s.l.</i>												
Rovo Bluastro	<i>Rubus caesius L.</i>												
Rovo Comune	<i>Rubus fruticosus L.</i>												
Rovo Selvatico	<i>Rubus ulmifolius Schott</i>												
Ruchetta	<i>Diplotaxis eruroides (L.) DC</i>												
Rucola	<i>Diplotaxis muralis (L.) DC</i>												
Rucola Selvatica	<i>Echium italicum L.</i>												
Saepola Di Buenos Aires	<i>Conyza bonariensis (L.) Cronq.</i>												
Salice Comune	<i>Salix alba L.</i>												
Salice Rosso	<i>Salix purpurea L.</i>												
Salicone	<i>Salix caprea L.</i>												
Salsapariglia	<i>Smilax aspera L.</i>												

Salvia Comune	<i>Salvia officinalis L.</i>												
Salvia Dei Prati.	<i>Salvia pratensis L.</i>												
Sambuco Commune	<i>Sambucus nigra L.</i>												
Sanguinella	<i>Digitaria sanguinalis (L.) Scop.</i>												
Scardaccione	<i>Dipsacus fullonum L.</i>												
Scorzonera Villosa	<i>Scorzonera villosa Scop.</i>												
Sedanina D'acqua	<i>Apium nodiflorum L.</i>												
Senape Bianca	<i>Sinapis alba L.</i>												
Senape Nera	<i>Brassica nigra (L.) Koch</i>												
Senecio Comune	<i>Senecio vulgaris L.</i>												
Serapide Lingua	<i>Serapias lingua L.</i>			X									
Silene Bianca	<i>Silene alba L.</i>												
Sonaglini Minore	<i>Briza minor L.</i>												
Sorbo Domestico	<i>Sorbus domestica L.</i>												
Sorgo Selvatico	<i>Sorghum halepense (L.) Pers.</i>												
Spergularia Comune	<i>Spergularia rubra (L.) Presl</i>												
Speronella Comune	<i>Delphinium halteratum S. et S.</i>												
Speronella Consolida	<i>Consolida regalis S. F. Gray</i>												
Stellina Dei Campi	<i>Asperula arvensis L.</i>												
Succiamele Delle Fave	<i>Orobanche crenata Forssk., 1775)</i>												
Succiamele Ramoso	<i>Orobanche ramosa L.</i>												
Sulla Comune	<i>Hedysarum coronarium L.</i>												
Tamaro	<i>Tamus communis L.</i>												
Tamerice	<i>Tamarix gallica L.</i>												
Tarassaco comune	<i>Taraxacum officinale Weber</i>												
Terebinto	<i>Pistacia terebinthus L.</i>												


Tifa Minima	<i>Typha minima</i> L.												
Trifoglio Irsuto	<i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser.												
Trifoglio Bianco	<i>Trifolium repens</i> L.												
Trifoglio Campestre	<i>Trifolium campestre</i> Schreber												
Trifoglio Dei Prati	<i>Trifolium pratense</i> L.												
Trifoglio Vulnerario	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.												
Veccia Comune	<i>Vicia sativa</i> L.												
Veccia Montanina	<i>Vicia cracca</i> L.												
Veccia Tentennina	<i>Vicia hirsuta</i> L.												
Veccia Viola Del Latte	<i>Astragalus danicus</i> Retz.												
Verbascio Coda Grossa	<i>Verbascum macrurum</i> Ten. 1826												
Verbena	<i>Verbena officinalis</i> L.												
Vilucchio Bianco	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.												
Vilucchio Bicchierino	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.												
Vilucchio Comune	<i>Convolvulus arvensis</i> L.												
Vilucchio Elegantissimo	<i>Convolvulus elegantissimus</i> Miller												
Viola Bianca	<i>Viola alba</i> Besser												
Viola Dei Campi	<i>Viola arvensis</i> Murray												
Viola Mammola	<i>Viola odorata</i> L.												
Viperina Azzurra	<i>Echium vulgare</i> L.												
Vite Comune	<i>Vitis vinifera</i> L.												
Zafferano Selvatico	<i>Crocus biflorus</i> Miller												
Zafferanone Selvatico	<i>Carthamus lanatus</i> L.												
Zizzania	<i>Lolium temulentum</i> L.												

Parco Eolico Fenice Status Legale Flora		
Normativa	N. Specie	Percentuale
Berna	1	7%
Cites A	0	0%
Cites B	6	46%
Cites D	0	0%
Habitat all.2	1	8%
Habitat all.4	1	8%
Habitat all. 5	1	8%
Barcellona all. 2	0	0%
Endemica.	1	8%
IUCN	2	15%
Lista rossa regionale	0	0%
Totale specie inserite nelle normative comunitarie 13		



Delle 303 specie di flora individuata all'interno dell'area di studio, soltanto 13 specie sono inserite nelle normative di tutela comunitarie. Inoltre tutte e 13 le specie prediligono habitat al di fuori delle aree di impianto.

Parco Eolico Fenice Status Legale Flora		
<i>Totale</i>	<i>n. specie</i>	<i>Percentuale</i>
<i>Specie Individuate</i>	303	96%
<i>Specie Tutelate</i>	13	4%



FAUNA

L'inserimento di parchi eolici in un contesto ambientale, non influisce necessariamente in maniera negativa sulla zoocenosi presente sul territorio. Il disturbo arrecato dalle attività agricole, zootecniche, la fitta rete viaria, la presenza di infrastrutture pubbliche e private, insieme alla drastica riduzione di ambienti naturali, sono probabilmente i motivi che rendono poco idonea l'area di progetto/studio, alla presenza stabile di specie faunistiche di particolare interesse naturalistico, fatta eccezione per alcune specie, le quali, durante i brevi periodi di migrazione transitano e sostano sul territorio in aree con maggiore naturalità. La vallata del fiume fortore ed i boschi dei monti Dauni sono senza dubbio le aree con la presenza maggiore di fauna, sia essa stanziale che migratoria. La conoscenza dei popolamenti faunistici e della loro distribuzione nell'ambito di una determinata area, rappresenta un valido strumento per stimare e successivamente verificare l'impatto e le interferenze che una azione antropica comporterà successivamente sull'ambiente in generale, ed in particolare sulla fauna. La scarsa varietà di ambienti presenti all'interno dell'area di studio, dovuta soprattutto alla massiccia antropizzazione del territorio, insieme alla tipologia colturale delle aree agricole, non consentono l'insediamento stabile di un consistente numero di specie faunistiche, oltre che di densità di popolazioni appartenenti alle specie presenti. E' opportuno anche sottolineare che, molto importante per la fauna, è il mantenimento di un ambiente naturale più intatto possibile. Come è noto, la presenza della fauna, in una area, dipende strettamente dalla tipologia, estensione e conservazione degli habitat presenti. Infatti, la copertura vegetale di un territorio, offre alla fauna presente, sia la nicchia trofica che quella di rifugio, oltre alla possibilità di nidificazione e riproduzione. In alcuni periodi dell'anno è possibile riscontrare, nell'area di studio, un discreto aumento del numero di specie faunistiche e l'incremento delle popolazioni presenti; la maturazione delle colture agricole praticate sul territorio, l'erratismo e la dispersione sul territorio della fauna migratrice, sono fattori che determinano sia le specie che la densità di popolazione presente in un'area. Una analisi più approfondita va certamente effettuata all'area palustre della vallata del fiume Fortore situata a Nord-Ovest dell'area di impianto, ed all'area boschiva dei Monti Dauni presente all'interno dell'AVI a Sud-Ovest dell'area di impianto. Infatti, per le loro tipologie ambientali, sono sicuramente le aree con maggiore presenza di specie e popolamenti faunistici.

Per stabilire le specie faunistiche presenti all'interno dell'Area di Studio, sono stati effettuati, prima di tutto, ripetuti sopralluoghi sul campo per individuare, attraverso l'osservazione diretta, le specie faunistiche presenti nei periodi di indagini; successivamente è stata considerata la presenza della fauna potenziale, quella cioè è strettamente legata agli ambienti naturali seminaturali ed antropici, presenti sul territorio. Inoltre si è consultata tutta la bibliografia esistente, e consultati cacciatori ed agricoltori locali.

Nel contesto delle valutazioni di impatto ambientale, la fauna è intesa come l'insieme di organismi animali che insiste sull'area di progetto e di studio, sia stabilmente che occasionalmente. È necessario, quindi che vengano considerati non solo le specie faunistiche stanziali, ma tutte quelle che, anche sporadicamente, per le proprie attività trofiche o riproduttive, frequentano l'area di studio. La fauna rappresenta un aspetto fondamentale dell'ecosistema, di frequente viene utilizzata come indice di qualità ambientale.

La caratterizzazione faunistica di un'area richiede particolare attenzione, in quanto la fauna è strettamente dipendente dallo status effettivo delle matrici ambientali (flora, acqua, suolo) presenti, e dalle interazioni che si vengono a formare tra di esse.

INTRODUZIONE

Fauna è un termine utilizzato per indicare l'insieme delle specie animali (tutti i taxa) che risiedono stabilmente o occasionalmente su un territorio, e adattate a vivere all'interno dei suoi ecosistemi/habitat. I popolamenti faunistici presenti in un'area, sono in generale, soggetti ad un regime dinamico di densità di popolazione, riferito alla loro presenza stabile; la migrazione totale o parziale, gli spostamenti determinati dal clima, dalla ricerca di cibo o dall'areale di riproduzione, insieme al disturbo causato dalle azioni antropiche, sono fattori che determinano sia la presenza che la densità di popolazione di ogni singola specie faunistica. La presenza delle specie faunistiche nell'area di studio, è stata considerata anche con l'individuazione di pochi esemplari, infatti di seguito verrà riportato nella tabella dello stato fenologico la loro densità di popolazione, dove sono state considerate anche quelle presenze accidentali o occasionali. Come è noto, molte specie avifaunistiche, non hanno una presenza stabile su di un territorio, una parte migra, quindi è presente soltanto un periodo dell'anno, altri si spostano di continuo. Alcune specie sono state considerate potenzialmente presenti perché, trovate segni,

tracce, nidi, ed habitat idonei alle esigenze della specie. Di seguito viene riportata la lista complessiva della fauna selvatica censita all'interno dell'area di studio, e quella potenzialmente presente, comprendendo tutte le specie presenti anche con pochi individui, oltre allo status fenologico e legale riferito ad ogni singola specie, evidenziando in tal modo sia le specie più comuni, quelle frequenti, quelle rare e accidentali, l'eventuale nidificazione, la nicchia di riproduzione e quella trofica, oltre all'habitat di predilezione di ogni singola specie considerata.

STRUTTURA DEL TERRITORIO

Per rappresentare meglio i popolamenti faunistici presenti, si è ritenuto opportuno dividere l'area di studio in funzione della diversa tipologia ambientale (Macchie Ecosistemiche), definite come strutture insediative, da considerare come aree di predilezione della fauna.

Esse sono:

- **Area Agricola**
- **Area Incolto**
- **Area Palustre**
- **Area Boschiva**
- **Area Antropica**

Area Agricola - (seminativi, colture arboree e arbustive). L'area agricola occupa la maggior parte dell'Area di Studio, comprende tutta la zona seminativi, di oliveti, vigneti, orti, frutteti, ed altre colture arboree presenti nell'area di indagine allargata. Il continuo disturbo alla fauna selvatica, causato dalle frequenti attività agricole effettuate sul territorio, determina un territorio scarsamente popolato da specie di pregio. In questo ambito vengono comprese anche le abitazioni e vecchi casolari abbandonati presenti. L'area in esame è in grado di offrire solo disponibilità alimentari e scarsa possibilità di rifugio (fatta eccezione per i rapaci notturni ed il gheppio che nidificano nei vecchi casolari abbandonati. La presenza di alcune specie faunistiche è legata anche ai vari cicli delle coltivazioni ed alle colture praticate. Alcune specie maggiormente presenti sono: Volpe (*Vulpes vulpes*), Riccio (*Erinaceus europaeus*), Faina (*Martes foina*), Passera europea (*Passer domesticus*), Gheppio (*Falco tinnunculus*), Poiana (*Buteo buteo*), Barbagianni (*Tyto alba*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Cappellaccia

(*Galerida cristata*), Rondone (*Apus apus*), Lucertola campestre (*Podarcis sicula*), Ramarro (*Lacerta viridis*), Biacco (*Coluber viridiflavus*).

Area Incolto - (prato pascolo-maggesi, margini stradali). Per incolti si intendono quelle zone a prato-pascolo che sono generalmente ricoperte da vegetazione erbacea spontanea, inframezzata da alberi, arbusti e cespugli, adibite a pascolo per bestiame domestico. Sono considerate anche quelle aree che solo temporaneamente vengono lasciate incolte (set-aside). L'ambito in questione risulta frequentato da: Volpe (*Vulpes vulpes*), Lepre comune (*Lepus europaeus*), Donnola (*Mustela nivalis*), Riccio (*Erinaceus europaeus*), Poiana (*Buteo buteo*), Gheppio (*Falco tinnunculus*), Tortora (*Strptopelia turtur*), Barbagianni (*Tyto alba*), Rondone (*Apus apus*), Upupa (*Upupa epops*), Cappellaccia (*Galerida cristata*), Sturno (*Sturnus vulgaris*), Gazza (*Pica pica*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Saltimpalo (*Saxicola torquata*), Pettiroso (*Erithacus rubecula*), Cinciallegra (*Parus major*), Passera mattugia (*Passer montanus*), Cardellino (*Carduelis carduelis*), Strillozzo (*Emberiza calandra*).

Area Palustre - L'area palustre della zona in esame è caratterizzata principalmente dalla vallata del fiume Fortore, da piccoli canali e da una serie di fossi a scavo che raccolgono l'acqua delle sorgenti, fontanili e soprattutto l'acqua piovana. In relazione alla sporadica presenza di vegetazione igrofila/ripariale ed in virtù della marcata e massiccia antropizzazione della zona, l'area in esame risulta poco frequentata dalla fauna legata ad ambienti umidi, tranne per quella molto comune. Alcune specie tipiche di ambienti acquatici: Garzetta (*Egretta garzetta*), Airone cenerino (*Ardea cinerea*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Alzavola (*Anas crecca*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Martin pescatore (*Alcedo atthis*), Rondine (*Hirundo rustica*), Ballerina bianca (*Motacilla alba alba*), Testuggine d'acqua (*Emys orbicularis*), Biscia dal collare (*Natrix natrix*), Rana verde (*Rana esculenta*), Rospo comune (*Bufo bufo*), alcuni passeriformi insettivori e granivori.

Area boschiva - interessa principalmente tutta la fascia boschiva a prevalenza di Roverelle della fascia preappenninica situata a Sud-Ovest dell'area di impianto presente all'interno dell'AVI, oltre a piccoli lembi di bosco e alberi sparsi presenti lungo la Vallata del fiume Fortore. Alcune delle specie comuni che prediligono ambienti boschivi: Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), Colombaccio (*Columba palumbus*), Picchio rosso (*Dendrocopos major*), Sparviero (*Accipiter nisus*), Allocco (*Strix aluco*), Beccaccia

(*Scolopax rusticola*), Scricciolo (*Troglodytes troglodytes*), Cinghiale (*Sus scrofa*), Volpe (*Vulpes vulpes*), Tasso (*Meles meles*), Poiana (*Buteo buteo*), Testuggine comune (*Testudo Hermannii*).

Area antropica - (centri abitati urbani, rurali, industriali sia abitati che disabitati). Per area antropizzata si intende tutto l'edificato sia urbano che rurale, l'area occupata da fabbricati di qualsiasi genere sia abitati che disabitati. Quest'area è senza dubbio quella con il minor numero di specie faunistiche presenti in quanto, la presenza dell'uomo e delle sue attività limitano molto l'insediamento di popolamenti faunistici, ad eccezione solo di quelle specie che sono abituate a vivere a stretto contatto con l'uomo e con tutte le sue attività, approfittando anche di tutti i rifiuti e scarti alimentari che esso produce. Alcune specie presenti che da tempo hanno imparato a convivere con l'uomo e le sue attività, sono: Volpe (*Vulpes vulpes*), Faina (*Martes foina*), Civetta (*Athene noctua*), Barbagianni (*Tyto alba*), Rondone (*Apus apus*), Tortora (*Strptopelia turtur*), Balestruccio (*Delichon urbica*), Taccola (*Corvus monedula*), Passera europea (*Passer domesticus*).

Elenco della fauna individuata attraverso avvistamenti diretti oltre a tracce e segni lasciati da alcune specie, all'interno dell'area di studio del Parco Eolico Fenice durante le uscite sul campo.

Parco Eolico Fenice Specie Faunistiche avvistate	
Nome Scientifico	Specie
<i>Accipiter nisus</i> Linnaeus, 1758	Sparviere
<i>Actitis hypoleucos</i> Linnaeus, 1758	Piro-piro piccolo
<i>Aegithalos caudatus</i> Linnaeus, 1758	Codibugnolo
<i>Alcedo atthis</i> Linnaeus, 1758	Martin pescatore
<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Alzavola
<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Germano reale
<i>Apodemus sylvaticus</i> , Linnaeus, 1758	Topo selvatico
<i>Apus apus</i> Linnaeus, 1758	Rondone
<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Airone cenerino
<i>Athene noctua</i> Scopoli, 1769	Civetta
<i>Bubulcus ibis</i> Linnaeus, 1758	Airone guardabuoi
<i>Bufo bufo</i> Linnaeus, 1758	Rospo comune
<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino
<i>Buteo buteo</i> Linnaeus, 1758	Poiana
<i>Calandrella brachydactyla</i> Leisler, 1814	Calandrella
<i>Carduelis carduelis</i> Linnaeus, 1758	Cardellino
<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Corriere piccolo
<i>Ciconia Ciconia</i> Linnaeus, 1758	Cicogna bianca
<i>Circus aeruginosus</i> Linnaeus, 1758	Falco di palude
<i>Circus pygargus</i> Linnaeus, 1758	Albanella minore
<i>Columba livia</i> , J.F. Gmelin. 1789	Piccione selvatico
<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Colombaccio
<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	Ghiandaia marina
<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Cornacchia
<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Taccola
<i>Coturnix coturnix</i> Linnaeus, 1758	Quaglia
<i>Delichon urbica</i> Linnaeus, 1758	Balestruccio
<i>Egretta garzetta</i> Linnaeus, 1758	Garzetta
<i>Emberiza cirrus</i> Linnaeus, 1758	Zigolo nero
<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Riccio
<i>Erithacus rubecula</i> Linnaeus, 1758	Pettirosso
<i>Falco naumanni</i>	Grillaio
<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Gheppio

<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1758	Falco cuculo
Nome Scientifico	Specie
<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Fringuello
<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Folaga
<i>Galerida cristata</i> Linnaeus, 1758	Cappellaccia
<i>Gallinula chloropus</i> Linnaeus, 1758	Gallinella d'acqua
<i>Garrulous glandarius</i> Linnaeus, 1758	Ghiandaia
<i>Hierophis viridiflavus</i> Lacépède, 1789	Biacco
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Rondine
<i>Lacerta viridis</i> Laurenti, 1768	Ramarro
<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Averla capirossa
<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Gabbiano reale
<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1758	Gabbiano comune
<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	Lepre
<i>Martes foina</i> Erxleben, 1777	Faina
<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Gruccione
<i>Miliaria calandra</i> Linnaeus, 1758	Strillozzo
<i>Milvus migrans</i> Boddaert, 1783	Nibbio bruno
<i>Milvus milvus</i> Linnaeus, 1758	Nibbio reale
<i>Natrix natrix</i> , Linnaeus, 1758	Biscia dal collare
<i>Otus scops</i> Linnaeus, 1758	Assiolo
<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Cinciallegra
<i>Passer domesticus</i> Linnaeus, 1758	Passera europea
<i>Passer montanus</i> Linnaeus, 1758	Passera mattugia
<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Fagiano comune
<i>Phoenicurus ochruros</i> S.G. Gmelin, 1774	Codirosso spazzacamino
<i>Phoenicurus phoenicurus</i> Linnaeus, 1758	Codirosso
<i>Phylloscopus collybita</i> Vieillot, 1817	Lui piccolo
<i>Pica pica</i> Linnaeus, 1758	Gazza
<i>Pipistrellus Kuhl</i> Kuhl, 1817	Pipistrello albolimbato
<i>Podarcis sicula</i> Rafinesque, 1810	Lucertola campestre
<i>Rana esculenta</i> Linnaeus, 1758	Rana verde italiana
<i>Rattus norvegicus</i> Berkenhout, 1769	Ratto delle chiaviche
<i>Rhinolophus ferruequinum</i> Schreber, 1774	Rinolofo maggiore
<i>Saxicola torquata</i> Linnaeus, 1758	Saltimpalo
<i>Serinus serinus</i> Linnaeus, 1758	Verzellino
<i>Streptopelia decaocto</i> E. Frividalczki, 1838	Tortora dal collare orientale
<i>Streptopelia turtur</i> Linnaeus, 1758	Tortora
<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Storno
<i>Sylvia atricapilla</i> Linnaeus, 1758	Capinera

<i>Sylvia melanocephala</i> G.F.Gmelin,1789	Occhiocotto
<i>Nome Scientifico</i>	<i>Specie</i>
<i>Tarentula mauritanica</i> Linnaeus, 1758	Geco comune
<i>Troglodytes troglodytes</i> Linnaeus, 1758	Scricciolo
<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merlo
<i>Tyto alba</i> Scolpoli, 1769	Barbagianni
<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Upupa
<i>Vulpes vulpes</i> Linnaeus, 1758	Volpe

**Specie faunistiche presenti e potenzialmente presenti all'interno dell'area di
studio Parco Eolico Fenice**

Parco Eolico Fenice Specie Faunistiche			
Classe	Nome scientifico	Nome italiano	Classificatore
Uccelli	<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Cannaiola	<i>Hermann, 1804</i>
Uccelli	<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro-piro piccolo	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Aegithalos caudatus</i>	Codibugnolo	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Alauda arvensis</i>	Allodola	<i>Linnaeus, 1758</i>
Pesci	<i>Alburnus albidus</i>	Alborella	<i>Bonaparte 1841</i>
Uccelli	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Anas clypeata</i>	Mestolone	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Anas crecca</i>	Alzavola	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Anas querquedula</i>	Marzaiola	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Anser anser</i>	Oca selvatica	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Anthus pratensis</i>	Pispola	<i>Linnaeus, 1758</i>
Mammiferi	<i>Apodemus sylvaticus</i>	Topo campagnolo	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Apus apus</i>	Rondone	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino	<i>Linnaeus, 1758</i>
Mammiferi	<i>Arvicola terrestris</i>	Arvicola Terrestre	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Asio otus</i>	Gufo comune	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Athene noctua</i>	Civetta	<i>Scopoli, 1769</i>
Mammiferi	<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastello comune	<i>Schreber, 1774</i>
Uccelli	<i>Bubulcus ibis</i>	Airone guardabuoi	<i>Linnaeus, 1758</i>
Anfibi	<i>Bufo bufo</i>	Rospo comune	<i>Linnaeus, 1758</i>
Anfibi	<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Burhinus oedipnes</i>	Occhione	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Buteo buteo</i>	Poiana	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella	<i>Leisler, 1814</i>
Mammiferi	<i>Canis lupus</i>	Lupo appenninico	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiapapre	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Carduelis chloris</i>	Verdone	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Carduelis spinus</i>	Lucarino	<i>Linnaeus, 1758</i>
Uccelli	<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume	<i>Temminck, 1820</i>
Uccelli	<i>Charadrius dubius</i>	Corriere piccolo	<i>Scopoli, 1786</i>
Uccelli	<i>Chilodactylus niger</i>	Mignattino	<i>Linnaeus, 1758</i>

Uccelli	<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca	Linnaeus, 1758
Classe	Nome scientifico	Nome italiano	Classificatore
Uccelli	<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	Linnaeus, 1766
Uccelli	<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Cisticola juncidis</i>	Beccamoschino	Rafinesque, 1810
Uccelli	<i>Columba livia</i>	Piccione selvatico	J.F. Gmelin. 1789
Uccelli	<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Corvus corone</i>	Cornacchia grigia	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Corvus monedula</i>	Taccola	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	Linnaeus, 1758
Pesci	<i>Cyprinus carpio</i>	Carpa	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Delichon urbica</i>	Balestruccio	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Dendrocopos major</i>	Picchio rosso maggiore	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	Linnaeus, 1758
Rettili	<i>Elaphe quatorlineata</i>	Cervone	Lacépède, 1789
Uccelli	<i>Emberiza cirrus</i>	Zigolo nero	Linnaeus, 1758
uccelli	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Migliarino di palude	Linnaeus, 1758
Rettili	<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine d'acqua	Linnaeus, 1758
Mammiferi	<i>Eptesicus serotinus</i>	Serotino comune	Schreber, 1774
Mammiferi	<i>Erinaceus europaeus</i>	Riccio	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Erithacus rubecula</i>	Pettiroso	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Falco naumanni</i>	Grillaio	Fleischer, 1818
Uccelli	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	Tunstall, 1771
Uccelli	<i>Falco Subbuteo</i>	Lodolaio	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Fulica atra</i>	Folaga	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Galerida cristata</i>	Cappellaccia	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Gallinago gallinago</i>	Beccaccino	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Garrulous glandarius</i>	Ghiandaia	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Grus grus</i>	Gru	Linnaeus, 1758
Rettili	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Bianco melanico	Lacépède, 1789
Uccelli	<i>Hirundo rustica</i>	Rondine	Linnaeus, 1758
Mammiferi	<i>Hypsugo savii</i>	Pipistrello di Savi	Bonaparte, 1837
Uccelli	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	Linnaeus, 1766

Rettili	<i>Lacerta viridis</i>	Ramarro	Laurenti, 1768
Classe	Nome scientifico	Nome italiano	Classificatore
Uccelli	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Lanius minor</i>	Averla cenerina	j. F. Gmelin, 1788
Uccelli	<i>Lanius senator</i>	Averla capirossa	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Larus argentatus</i>	Gabbiano reale	Pontoppidan, 1763
Uccelli	<i>Larus ridibundus</i>	Gabbiano comune	Linnaeus, 1758
Mammiferi	<i>Lepus europaeus</i>	Lepre	Pallas, 1778
Anfibi	<i>Lissotriton italicus</i>	Tritone italico	Peracca, 1898
Mammiferi	<i>Martes foina</i>	Faina	Erxleben, 1777
Uccelli	<i>Melanocorypha calandra</i>	Calandra	Linnaeus, 1766
Mammiferi	<i>Meles meles</i>	Tasso	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Merops apiaster</i>	Gruccione	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Miliaria calandra</i>	Strillozzo	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	Boddaert, 1783
Uccelli	<i>Milvus milvus</i>	Nibbio reale	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Monticola solitarius</i>	Passero solitario	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Motacilla flava</i>	Cutrettola	Linnaeus, 1758
Mammiferi	<i>Mus domesticus</i>	Topo domestico	Schwart, 1943
Mammiferi	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	Linnaeus, 1758
Mammiferi	<i>Mustela nivalis</i>	Donnola	Linnaeus, 1766
Rettili	<i>Natrix natrix</i>	Natrice dal collare	Linnaeus, 1758
Rettili	<i>Natrix tessellata</i>	Biscia tassellata	Laurenti, 1768
Mammiferi	<i>Nyctalus noctula</i>	Nottola comune	Schreber, 1774
Uccelli	<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Otus scops</i>	Assiolo	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Parus caeruleus</i>	Cinciarella	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Parus major</i>	Cinciallegra	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Passer domesticus</i>	Passera europea	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Perdix perdix</i>	Starna	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Marangone	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano comune	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Codiroso spazzacamino	S.G. Gmelin, 1774
Uccelli	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codiroso	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Phylloscopus collybita</i>	Luì piccolo	Viellot, 1817
Uccelli	<i>Pica pica</i>	Gazza	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Picus viridis</i>	Picchio verde	Linnaeus, 1758

Mammiferi	<i>Pipistrellus Kuhlii</i>	Pipistrello albolimbato	Kuhl, 1817
Classe	Nome scientifico	Nome italiano	Classificatore
Uccelli	<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato	Linnaeus, 1758
Rettili	<i>Podarcis sicula</i>	Lucertola campestre	Rafinesque, 1810
Uccelli	<i>Prunella modularis</i>	Passera scopaiola	Linnaeus, 1758
Anfibi	<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	Bonaparte, 1840
Anfibi	<i>Rana esculenta</i>	Rana verde italiana	Linnaeus, 1758
Mammiferi	<i>Rattus norvegicus</i>	Ratto delle chiaviche	Berkenhout, 1769
Uccelli	<i>Regulus regulus</i>	Regolo	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Remiz pendulinus</i>	Pendolino	Linnaeus, 1758
Mammiferi	<i>Rhinolophus ferruequinum</i>	Rinolofo maggiore	Schreber, 1774
Uccelli	<i>Saxicola rubetra</i>	Stiaccino	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Saxicola torquata</i>	Saltimpalo	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Serinus serinus</i>	Verzellino	Linnaeus, 1758
Mammiferi	<i>Sorex minutus</i>	Toporagno nano	Linnaeus, 1766
Pesci	<i>Squalius squalus</i>	Cavedano	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Sterna albifrons</i>	Fratricello	Pallas, 1764
Uccelli	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tortora dal collare orientale	E. Frividaldszki, 1838
Uccelli	<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora comune	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Strix aluco</i>	Allocco	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno	Linnaeus, 1758
Mammiferi	<i>Sus scrofa</i>	Cinghiale	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola	Latham, 1787
Uccelli	<i>Sylvia melanocephala</i>	Occhiocotto	G.F.Gmelin, 1789
Uccelli	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Tuffetto	Pallas, 1764
Mammiferi	<i>Talpa romana</i>	Talpa romana	Thomas, 1902
Rettili	<i>Tarentula mauritanica</i>	Geco comune	Linnaeus, 1758
Rettili	<i>Testudo hermanni</i>	Tartaruga di terra	Gmelin, 1766
Uccelli	<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Tringa ochropus</i>	Piro piro culbianco	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Turdus iliacus</i>	Tordo sassello	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Turdus merula</i>	Merlo	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio	C.L.Brehm, 1831
Uccelli	<i>Turdus pilaris</i>	Cesena	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Turdus viscivorus</i>	Tordela	Linnaeus, 1758
Uccelli	<i>Tyto alba</i>	Barbagianni	Scolpoli, 1769
Uccelli	<i>Upupa epops</i>	Upupa	Linnaeus, 1758

Uccelli	<i>Vanellus vanellus</i>	Pavoncella	<i>Linnaeus, 1758</i>
Classe	Nome scientifico	Nome italiano	Classificatore
Rettili	<i>Vipera aspis</i>	Vipera	<i>Linnaeus, 1758</i>
Mammiferi	<i>Vulpes vulpes</i>	Volpe	<i>Linnaeus, 1758</i>

Parco Eolico Fenice Specie faunistiche con Habitat di predilezione	
Specie	Habitat
Airone cenerino	frequenta prati umidi e torrenti anche nei pressi di centri urbani e abitati.
Airone guardabuoi	frequenta zone umide poco estese, zone palustri, risaie e praterie dove si associa spesso al bestiame al pascolo. meno acquatico degli altri aironi.
Albanella minore	brughiere, praterie, pascoli, steppe cerealicole a zone umide. generalmente alle basse quote. fino ai 1500 m in asia. anche nelle praterie d'altitudine durante le migrazioni.
Albanella reale	brughiere, praterie, coltivi erbacei, pascoli e zone umide, generalmente al di sotto dei 500 m in Europa. localmente, quote più elevate in asia. anche in praterie d'altitudine durante le migrazioni.
Alborella	fiumi a corrente moderata, laghi di ogni estensione, canali di pianura.
Allocco	frequenta boschi di latifoglie e misti, alternati ad ampie radure che fungono da territori di caccia, zone agricole
Allodola	frequenta campagne più o meno coltivate, steppe, prati, pascoli e dune sabbiose, sia in pianura che in quota.
Alzavola	frequenta zone umide anche di piccole dimensioni con bassi fondali: paludi, torbiere, risaie, acquitrini, stagni, lagune, saline, aree di mare
Arvicola Terrestre	fossi, canali irrigui, fiumi, stagni delle pianure e dei fondovalle, rive dei laghi, specchi d'acqua dolce e salmastra
Assiolo	ambienti aperti in genere, anche di tipo rurale o suburbano. fino ai 1500 m.
Averla capirossa	frequenta campagne alberate con siepi, aree incolte ricche di cespugli e alberi sparsi, macchia mediterranea, oliveti, frutteti, vigneti,
Averla cenerina	frequenta margini di boschi, campi coltivati e strade campestri con vegetazione ad alberi sparsi e cespugli sia in pianura che sui rilievi a pendii dolci. nelle zone di svernamento è presente nelle savane e nelle secche boscaglie di acacie.
Averla piccola	ambienti aperti cespugliosi, campagne percorse da siepi, macchie rade, radure, lande incolte, ambienti ecotonali fra pascoli e bosco. dal fondovalle a quasi 2000 m s.l.m. nidifica fra i cespugli e piccoli alberi tra i 70 cm e i 2 metri.
Balestruccio	costruiscono il loro nido sotto grondaie, tettoie, entrate delle porte, raramente anche sotto rupi, ponti in cemento armato o affini
Ballerina bianca	frequenta un'ampia tipologia di habitat, preferendo le zone aperte, presso stagni, laghi, corsi d'acqua, rive marine. localmente può vivere su terreni secchi o addirittura semidesertici. si è pure adattata agli ambienti coltivati e a quelli urbani, dove trova abbondanza di cibo e di siti di nidificazione.
Barbagianni	ambienti aperti di vario genere, comprese zone umide, rurali e suburbane. generalmente al di sotto dei 600 metri in europa; anche a quote più elevate altrove.
Barbastello comune	aree boscate collinari e di bassa e media montagna,
Beccaccia	si riproduce in foreste miste di latifoglie, talvolta anche in consociazione con conifere, purchè sia garantita la presenza di sottobosco, radure e suoli ricchi di lettiera.
Beccaccino	si adatta dovunque, anche se predilige paludi, prati umidi, praterie e risaie.
Beccamoschino	aree con bassa vegetazione erbosa, spesso vicino all'acqua, paludi, ma anche campi asciutti.
Biacco	macchie, margini di boschi, radure, zone rocciose, muri a secco e pietraie; anche siepi, coltivi e aree antropizzate
Biscia tassellata	habitat acquatici, da cui di solito non si allontana, fiumi, canali, torrenti e ruscelli.
Calandra	frequenta zone aperte a clima secco, incolte o parzialmente coltivate, pianeggianti o collinari, con vegetazione bassa e assenza di alberi e cespugli.
Calandrella	frequenta ambienti aridi aperti con scarsa vegetazione erbacea, greti ciottolosi e sabbiosi di corsi d'acqua, incolti, steppe cerealicole.
Cannaiola	specie strettamente legata agli ambienti umidi e paludosi
Capinera	vive nell'intrico delle siepi più fitte, nei cespugli e tra i rami degli alberi da frutta, ma non disdegna il sottobosco.
Cappellaccia	frequenta gli ambienti steppici: terreni incolti, aridi, pietrosi, zone semidesertiche, lande coltivate preferibilmente a foraggiare, campi arati
Cardellino	da prati fioriti, praterie con erba alta, boschi aperti, piantagioni, frutteti, parchi e giardini

Carpa	laghi grandi e piccoli e nei tratti medi ed inferiori dei fiumi
Cavedano	acque dolci correnti, limpide e calme. nei laghi si distribuisce lungo le acque litorali, nei fiumi fino agli estuari
Cervone	macchia mediterranea, il limitare di boschi, i boschi radi e soleggiati o in genere i luoghi con vegetazione sparsa, le sassaie, i muretti a secco e gli edifici abbandonati
Cesena	frequenta boschi, parchi, frutteti in prossimità di praterie e pianure coltivate.
Cicogna bianca	ambienti aperti come paludi o pianure erbose, dove può trovare facilmente cibo; per nidificare sceglie punti molto alti e scoperti, come la cima di edifici o di tralicci elettrici.
Cinciallegra	boschi di conifere, frutteti, campi, siepi, giardini e parchi urbani.
Cinciarella	abita nei boschi misti di bassa collina o pianeggianti, nei frutteti, nei giardini e nei parchi. e' rara nelle foreste di conifere
Cinghiale	boschi folti a prevalenza di latifoglie con sottobosco, alternati a terreni pantanosi, pascoli o terreni coltivati
Civetta	zone aperte, pianeggianti, collinari, montane, boschive e alberate, coltivate e incolte, secche e umide, appartate e frequentate. predilige gli ambienti urbanizzati, soprattutto quelli rurali.
Codibugnolo	frequenta i boschi di latifoglie con folto sottobosco, campagne con filari, frutteti e vigneti, parchi e giardini urbani.
Codirosso	predilige boschi non troppo chiusi di larici e cembri, o boschi ai margini di torrenti. si concentra principalmente a quote medio-basse, ma arriva a raggiungere anche i 2000 metri di altitudine sulle alpi, mantenendosi generalmente nelle vicinanze di centri abitati.
Codirosso spazzacamino	zone montane, nelle quali il codirosso spazzacamino va alla ricerca di terreni sassosi o pareti rocciose fino al limite delle nevi perenni. durante la stagione fredda, la specie abbandona queste zone per scendere a quote inferiori.
Colombaccio	si è ben adattato alle città, tanto da essere un assiduo frequentatore dei parchi, anche se è molto più timido del piccione; il suo habitat principale, tuttavia, rimane la campagna, dove è molto presente.
Cornacchia grigia	campagne coltivate purché disseminate di alberi, siepi e boschetti, pascoli, brughiere, boschi, rive di fiumi e laghi, coste marine, aree urbane e suburbane.
Corriere piccolo	frequenta laghi, fiumi, ghiaietti allagati; durante l'inverno si può ritrovare lungo le coste marine.
Cuculo	frequenta le foreste con radure, campagne alberate, grandi parchi cittadini, pascoli d'alta quota fino a 2.000 m di altitudine sulle alpi.
Cutrettola	predilige soprattutto i campi umidi, ma si può riprodurre anche in zone asciutte, come nei campi di cereali.
Donnola	terreni coltivati, boschi, zone cespugliate, sassaie e presso abitazioni abbandonate
Fagiano comune	frequenta una grande varietà di ambienti, come i margini dei boschi, i parchi, i terreni coltivati, i canneti e le zone cespugliose, dal livello del mare fino a quote di 1500 metri circa.
Faina	boschi, margini di boschi, zone rocciose, spesso anche vicino ad abitazioni
Falco cuculo	frequenta gli ambienti aperti con esclusione di quelli desertici o troppo aridi: steppe alberate, terreni coltivati alternati a boschi, foreste
Falco di palude	zone umide interne e di litorale, con sufficienti estensioni di canneti. anche foraggiere e steppe cerealicole, soprattutto se adiacenti ad ambienti allagati.
Falco pecchiaiolo	frequenta gli ambienti boscosi d'ogni tipo, possibilmente con spazi aperti sia in pianura che in montagna.
Falco pellegrino	predilige gli habitat aperti, come praterie, tundra e campi. sono più diffusi nella tundra e nelle aree costiere
Folaga	stagni calmi, terreni umidi e acque che scorrono lentamente, con molte piante acquatiche e canne palustri.
Fringuello	frequenta boschi, siepi, giardini, aree aperte con alberi sparsi
Gabbiano comune	frequenta le zone umide sia d'acqua dolce che salata, naturali o artificiali, costiere o dell'entroterra; è pure presente nei laghetti e lungo i fiumi all'interno delle città.
Gabbiano reale	frequenta le coste e il mare aperto, le zone umide costiere, le aree portuali e le città costiere; di rado si inoltra nell'entroterra. abitualmente si porta nelle discariche di rifiuti urbani.
Gallinella d'acqua	frequenta zone umide con fitta vegetazione, fiumi a corso lento, risaie e praterie in prossimità dell'acqua.
Garzetta	ambienti acquitrinosi, sponde di fiumi, laghi e stagni.
Gazza	prati, cespuglietti, margini dei boschi, frutteti, campi coltivati e in generale da spazi aperti.

Geco comune	muri a secco, nelle vecchie abitazioni e nelle rovine, nelle legnaie e sui tetti
Germano reale	zone umide d'acqua dolce quali laghi, fiumi, risorgive, stagni e paludi, e si adatta bene anche in habitat intensamente coltivati
Gheppio	campi aperti ed erbosi e terreni agricoli, che forniscono loro sufficienti spazi aperti
Ghiandaia	foreste cedue e miste, con predilezione per le aree boschive a prevalenza di querce e carpini
Ghiandaia marina	frequenta praterie steppose, zone incolte, coltivi con alberi sparsi, boschi di querce e pinete con radure sia di pianura che di bassa collina.
Grillaio	frequenta ambienti aperti con scarsa copertura arborea ed arbustiva: prati, pascoli, praterie, zone stepposo-cerealicole, ambienti rocciosi
Gru	frequenta torbiere alberate, zone aperte erbose e paludi. nelle zone di svernamento è presente in lagune, steppe, pascoli, aree coltivate e lungo il corso di grandi fiumi e laghi.
Gruccione	campagne aperte con vegetazione arborea e arbustiva poco densa e discontinua.
Gufo comune	ambienti aperti con alberi sparsi, in filari o in macchie. anche zone boschive alternate a zone aperte.
Lepre	campi coltivati, incolti, boschi,
Lodolaio	frequenta colline, pianure, boschi, in prossimità di zone umide. caccia prevalentemente in volo, di mattina presto o di sera tardi.
Lucarino	boschi di conifere, prediligendo soprattutto gli alberi di larici e abeti rossi, nonché ontano e betulla
Lucertola campestre	margini di boschi, boscaglie, radure e prati, coltivi, aree urbane, pietraie, cataste di legna, pinete litoranee, litorali sabbiosi, dune con vegetazione scarsa, alvei di torrenti e fiumi, sponde di laghi e stagni
Lù piccolo	frequenta un'ampia varietà di habitat con alberi e arbusti, quali parchi e boschi misti o decidui.
Lupo appenninico	zone montane densamente boscate, relativamente ricche di siti rifugio e di prede e con scarsa presenza antropica.
Marangone o Cormorano	frequenta le zone umide d'acqua dolce o debolmente salmastra, caratterizzate da abbondante vegetazione palustre emergente.
Martin pescatore	strettamente legato alla vita acquatica, frequenta fiumi, torrenti, laghi, stagni, canali, lagune salmastre ed estuari.
Marzaiola	frequenta le zone umide aperte anche di piccole dimensioni, con acque dolci e bassi fondali, ed evita quelle troppo chiuse dalla vegetazione
Merlo	il bosco, ma si adatta a vivere in numerosi ambienti e non raramente lo si trova nei frutteti e nei vigneti, in aree urbane a contatto ravvicinato con l'uomo..
Mestolone	frequenta specchi d'acqua dolce e salmastra con fitta vegetazione e ricche di fango.
Migliarino di palude	paludi e acquitrini con canneti, carici, erbe alte, e alberi. durante la migrazione frequenta anche habitat più secchi.
Mignattino	zone paludose d'acqua dolce naturali o artificiali, laghi, fiumi a corso lento, risaie, lagune salmastre, saline, estuari e coste del mare.
Natrice dal collare	zone umide di ogni tipo
Natrice dal collare	corsi d'acqua ricchi di anfibi
Nibbio bruno	vive in zone di pianura o collinari, in zone boschive mature miste di latifoglie, circondate da zone aperte terrestri o acquatiche, pascoli
Nibbio reale	aree collinari in cui sono presenti boschi con alberi sufficientemente grandi da potervi collocare il nido accanto ad ampie aree aperte, sia coltivate che non, in cui si alimenta; evita le zone con agricoltura intensiva.
Nottola comune	zone boschive e di habitat forestali
Oca Selvatica	nelle aree di riproduzione frequenta preferibilmente le zone umide con acqua dolce ricche di vegetazione palustre, mentre nei quartieri di svernamento è presente nei terreni palustri poco profondi anche di acque salmastre, nei pascoli, nei campi coltivati e, ove è disturbata, in mare.
Occhiocotto	frequenta la macchia mediterranea, i boschi con fitto strato arbustivo, i cespugliati di steppa, i parchi e i giardini urbani.
Occhione	occupa ambienti aridi, prati, coltivi, pascoli, spesso in prossimità di zone umide. specie terricola,
Passera europea	zone agricole, zone urbane; comportamento migratorio. sedentaria; sito di nidificazione. edificio, cavità; durata dell'incubazione (giorni). 12-14.
Passera mattugia	predilige paesaggi agricoli ricchi di siepi, boschetti campestri e alberi. dove siano disponibili cavità adatte alla nidificazione, cova anche nei frutteti, negli edifici delle aziende agricole e nei parchi. la si trova anche lungo i bordi dei boschi, mentre evita

	agglomerati con poco verde.
Passera scopaiola	occupa principalmente boschi con sottobosco, giovani piantagioni di conifere, torbiere boscate e arbusteti di ontano che dominano il limite della vegetazione arborea.
Passero solitario	frequenta pendii aridi e assolati in zone rocciose dalle coste marine alle alte montagne, cave di pietra, ambienti urbani e manufatti
Pavoncella	è tipica di ambienti aperti; nidifica in prati, campi coltivati e incolti. durante la riproduzione è territoriale
Pendolino	frequenta le zone umide di pianura con acqua dolce o salmastra, ricche di cespugli, alberi e canneti. di rado si insedia a quote superiori ai 200
Pettirosso	i boschi di conifere sono il suo habitat naturale, ma è spesso presente anche in giardini, siepi, boschetti, boschi con sottobosco. nidifica nei buchi o nelle spaccature di alberi, ai piedi delle siepi, nell'edera o anche in vecchi oggetti lasciati dall'uomo.
Picchio rosso maggiore	frequenta le zone collinari e di pianura con boschi sia fitti che radi, parchi, giardini, siepi alberate in aperta campagna e coltivazioni di pioppo.
Picchio verde	vive in boschi, boschetti e luoghi alberati, con tutte le esposizioni, in zone umide e secche, appartate e frequentate. preferisce le zone alberate discontinue, alternate da zone coltivate.
Piccione selvatico	frequentano coste rocciose marine e ambienti circostanti, zone rocciose dell'interno. si nutrono principalmente di sostanze vegetali raccolte direttamente sul terreno o posandosi sugli alberi (o sugli arbusti).
Pipistrello albolimbato	boschi e foreste di ogni tipo, agro ecosistemi con coltivi, boschetti e siepi, parchi e giardini, aree urbane comprese le grandi città
Pipistrello di Savi	zone costiere, le aree rocciose, i boschi e le foreste di ogni tipo, nonché i più vari ambienti antropizzati, dalle zone agricole alle grandi città
Piro-piro boschereccio	zone agricole, laghi, zone umide, corsi d'acqua; comportamento migratorio. prevalentemente migratrice su lunga distanza
Piro-piro culbianco	cave di argilla e zone umide con boschetti e canneti
Piro-piro piccolo	in periodo riproduttivo frequenta le rive dei corsi d'acqua, specie a regime torrentizio, e quelle dei laghi, preferendo le sponde sassose o ciottolose anziché quelle sabbiose o fangose; nelle aree di svernamento s'insedia in un'ampia varietà di zone umide, sia dell'entroterra che costiere
Pispola	frequenta ambienti erbosi aperti, umidi e freschi, privi di vegetazione arborea o comunque con pochi alberi e di modesta altezza
Piviere dorato	coltivi scarsamente alberati, lagune, barene e valli da pesca
Poiana	zone boscose alternate a spazi aperti. anche ambienti umidi alberati.
Quaglia	frequenta le campagne, vicino ai campi coltivati di fieno e cereali, nei terreni aperti con bassa vegetazione. generalmente solitaria si ritrova con gli altri per il periodo della migrazione
Ramarro	margini di boschi, cespuglieti, siepi, radure erbose, prati, coltivi, alvei di fiumi, aree urbane, pinete litoranee, pietraie
Rana agile	boschi e boscaglie, anche xerofili, radure, campi e prati umidi
Rana verde italiana	ambienti umidi, zone costiere. sottobosco di pinete e foreste di latifoglie, in prati e coltivi
Ratto delle chiaviche	campagna, aree urbanizzate paludi, canali e fiumi, discariche, i porti, fognature, aree verdi, cantine.
Regolo	frequenta boschi misti e di conifere e, in inverno, nel sottobosco e nelle siepi..
Riccio	boscaglie e le macchie, lo si trova frequentemente ai margini delle aree coltivate, nei giardini, nei parchi e nei frutteti
Rigogolo	frequenta boschi di essenze a foglia caduca o misti, frutteti, pioppeti, boschi planiziali, parchi urbani e giardini.
Rinolofo maggiore	zone calde e aperte con alberi e cespugli prossime ad acque ferme o correnti, anche in vicinanza di insediamenti umani
Rondine	zone agricole con bestiame e fienili. compiono lunghissime migrazioni sorvolando aree aperte ma anche tratti di mare e creste montuose.
Rondone	vive in città e paesi soprattutto con centri storici ricchi di cavità, a volte anche su coste rocciose o altri dirupi naturali, mentre comunemente nella taiga e ormai solo localmente altrove nidifica nelle cavità scavate dai picchi negli alberi.
Rospo comune	aree boschive di conifere, latifoglie e boschi misti, soprattutto in luoghi umidi, tanto quanto campagne aperte
Rospo smeraldino	habitat umidi, orti, coltivi, giardini,
Saltimpalo	la sua residenza invernale è l'europa meridionale e occidentale. in europa centrale e orientale il saltimpalo è presente da marzo a novembre. vive su superfici aperte con vegetazione arbustiva, per esempio in brughiere, praterie alte, incolti, prati, campi


	coltivati.
Scricciolo	frequenta un'ampia varietà di ambienti: boschi e loro margini, zone fresche e ombrose con cespugli e alberi sparsi, macchia mediterranea
Serotino comune	aree boscate , parchi e giardini, agrosistemi con presenza di siepi.
Smeriglio	frequenta ambienti aperti e semi-boscati, tundra, brughiere e zone umide
Sparviere	boschi di qualsiasi tipo, anche governati a ceduo, e zone alberate in genere, a tutte le altitudini.
Starna	frequenta pianure e colline caratterizzate da alternanza di colture arate, medicaie, prati, pascoli, frutteti, vigneti, incolti, fasce cespugliose
Sterpazzola	frequenta ambienti soleggiati ove si alternano spazi aperti con folta vegetazione erbacea e cespugli, dal livello del mare fino ad altitudini di circa 1.500 metri. nella stagione riproduttiva preferisce i margini dei boschi, le radure, i terreni incolti e le brughiere.
Stiaccino	nidifica in praterie ampie, ricche di strutture e leggermente concimate. sui pascoli estensivi, nelle torbiere alte e nelle associazioni alpine di arbusti nani gli effettivi sono lievemente inferiori.
Sturno	frequenta campagne coltivate e incolti di pianura, di collina ed anche di montagna, parchi e giardini, boschi, villaggi e città. in italia è sedentario e nidificante, erratico, migratore e svernante regolare.
Strillozzo	predilige aree aperte o molto aperte, purché vi sia qualche alto posatoio come punto di controllo e di canto e qualche sito in grado di offrire riparo, ed evita quindi foreste, zone umide – frequentate solo come dormitori – terreni rocciosi e accidentati, alte montagne e aree urbane.
Succiacapre	le strutture dell'habitat del succiacapre sono molto varie, tuttavia sono sempre ambienti aperti, asciutti e dal clima temperato
Taccola	frequenta ambienti rupestri, boschi non troppo fitti, campagne alberate. nei centri urbani si insedia in posizioni dominanti: torri, campanili
Talpa romana	campi coltivati, prati con terreni prevalentemente freschi, porosi dove può agevolmente scavare le sue gallerie
Tarabusino	zone umide d'acqua dolce, ferma o corrente; predilige canneti fitti come il suo parente di maggiori dimensioni
Tartaruga di terra	macchia mediterranea, boschi di querce e di lecci
Tasso	zone boschive con fitto sottobosco, incolti
Testuggine palustre	stagni, laghi, risorgive, fiumi, canali e fossati, paludi, bacini di cave esaurite; in generale, zone umide con ricca vegetazione.
Topo campagnolo	ambienti boschivi e di macchia, sia costieri che di montagna, boschi, campi, giardini e pietraie.
Topo domestico	ambienti urbani e suburbani e selvatico.
Toporagno nano	aree boschive, zone erbose e nelle siepi , cespuglieti, praterie, zone umide e fresche
Tordela	frequenta boschi puri o misti di conifere e latifoglie con radure e ampie aree erbose, dalle rive del mare alle alte montagne
Tordo bottaccio	frequenta boschi di conifere miste o di latifoglie ricchi di sottobosco, pianure alberate e cespugliate, vigneti, oliveti, macchia mediterranea, parchi e giardini.
Tordo sassello	frequenta boschi, parchi e, al di fuori del periodo della riproduzione, pascoli, zone coltivate, terreni in prossimità di zone umide.
Tortora	Il suo habitat preferenziale è quello dei campi, nelle zone rurali, dove siano presenti grandi alberi su cui nidificare.
Tortora dal collare orientale	frequenta principalmente i parchi urbani e suburbani, nonché i margini delle terre coltivate ove siano presenti alberature
Tritone italico	laghi, stagni, maceri, pozze, risorgive. fuori dall'acqua in ambienti del suolo, prati e boschi
Tuffetto	frequenta le zone umide sia d'acqua dolce che debolmente salmastra anche di piccole dimensioni, purché sia presente un'abbondante vegetazione
Upupa	ama i luoghi secchi, semi-alberati, caldi e assolati e per questo la si può incontrare in frutteti, prati e vigneti o lungo strade sterrate tipiche delle nostre campagne, dove può fare i bagni di polvere e trovare il suo cibo preferito
Usignolo di fiume	frequenta la fitta vegetazione ripariale erbacea e arbustiva delle zone paludose, delle rive di fiumi, laghi e stagni, e delle torbiere.
Verdone	frequenta campagne alberate, frutteti, boschi, campi coltivati a graminacee, parchi e giardini urbani e suburbani. predilige le zone pianeggianti
Verzellino	l'habitat di questi uccelli è rappresentato dalle aree di pianura e collina con presenza di aree boschive non eccessivamente fitte, sia decidue che sempreverdi

Vipera comune	luoghi aridi e caldi arbusti, siepi, margini dei boschi.
Volpe	zone boschive e le pinete costiere, coltivi, incolti centri abitati
Zigolo nero	frequenta praterie, incolti erbosi e cespugliati, coltivi, frutteti, vigneti, boschi anche molto degradati in zone collinari e montane

***Nb:** nella lista delle specie faunistiche potenziali, sono comprese anche quelle avvistate direttamente durante i vari sopralluoghi su campo.*

Il totale complessivo delle specie faunistiche individuate all'interno dell'area di studio è 154 così suddivise per Classe.

Specie faunistiche		
Classe	n. specie	Percentuale
Pesci	3	2%
Anfibi	5	3%
Rettili	10	7%
Mammiferi	21	14%
Uccelli	114	74%



Pesci - specie presenti e potenzialmente presenti all'interno dell'Area di Studio n. 3


Classe Pesci				
Ordine	Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Classificatore
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Alburnus albidus</i>	Alborella	Bonaparte 1841)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Cyprinus carpio</i>	Carpa	Linnaeus 1758
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Squalius squalus</i>	Cavedano	Linnaeus 1758

Nessun pesce interferisce in maniera diretta con le opere di progetto ed il loro funzionamento.

Anfibi - specie presenti e potenzialmente presenti all'interno dell'Area di Studio
n. 5

Classe Anfibi				
Ordine	Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Classificatore
Anuri	Bufonidi	<i>Bufo bufo</i>	Rospo comune	<i>Linnaeus, 1758</i>
Anuri	Bufonidi	<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	<i>Laurenti, 1768</i>
Caudati	Salamàndridi	<i>Lissotriton italicus</i>	Tritone italico	<i>Peracca, 1898</i>
Anuri	Ranidi	<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	<i>Bonaparte, 1837</i>
Anuri	Ranidi	<i>Rana esculenta</i>	Rana verde italiana	<i>Linnaeus, 1758</i>

Anfibi		
Famiglia	n. specie	Percentuale
Bufonidi	2	40%
Ranidi	2	40%
Salamandridi	1	20%




Nessun anfibio interferisce in maniera diretta con le opere di progetto in fase di esercizio. Lieve disturbo ed interferenze durante la fase di cantiere e di dismissione.

Rettili – specie presenti e potenzialmente presenti all'interno dell'Area di Studio

n. 10

Classe Rettili				
Ordine	Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Classificatore
Squamati	Colubridi	<i>Elaphe quattuorlineata</i>	Cervone	Lacépède, 1789
Testudines	Emydidae	<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre	Linnaeus, 1758
Squamati	Colubridi	<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco	Lacépède, 1789
Squamati	Lacèrtidi	<i>Lacerta viridis</i>	Ramarro	Laurenti, 1768
Squamati	Colubridi	<i>Natrix natrix</i>	Biscia dal collare	Linnaeus, 1758
Squamati	Colubridi	<i>Natrix tassellata</i>	Biscia tassellata	Laurenti, 1768
Squamati	Lacèrtidi	<i>Podarcis sicula</i>	Lucertola campestre	Rafinesque, 1810
Squamati	Gecconidi	<i>Tarentula mauritanica</i>	Geco comune	Linnaeus, 1758
Testudinati	Testudinini	<i>Testudo hermanni</i>	Testuggine comune	Gmelin, 1766
Squamati	Viperidi	<i>Vipera aspis</i>	Vipera comune	Linnaeus, 1758

Rettili		
Famiglia	n. specie	Percentuale
Testutidini	1	10%
Gecconidi	1	10%
Lacèrtidi	2	20%
Colubridi	4	40%
Emydidi	1	10%
Viperidi	1	10%




*Nessun rettile interferisce in maniera diretta con le opere di progetto in fase di esercizio.
Lieve disturbo ed interferenze durante la fase di cantiere e dismissione.*

Mammiferi – specie presenti e potenzialmente presenti all'interno dell'Area di Studio n. 21

Classe Mammiferi				
Ordine	Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Classificatore
Roditori	Muridi	<i>Apodemus sylvaticus</i>	Topo campagnolo/selvatico	Linnaeus, 1758
Roditori	Muridi	<i>Arvicola terrestris</i>	Arvicola Terrestre	Linnaeus, 1758
Chiroteri	Vespertilionidi	<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastello comune	Schreber, 1774
Carnivori	Canidi	<i>Canis lupus</i>	Lupo appenninico	Linnaeus, 1758
Chiroteri	Vespertilionidi	<i>Eptesicus serotinus</i>	Serotino comune	Schreber, 1774
Insettivori	Erinaceidi	<i>Erinaceus europaeus</i>	Riccio	Linnaeus, 1758
Chiroteri	Vespertilionidi	<i>Hypsugo savii</i>	Pipistrello di Savi	Bonaparte, 1837
Lagomorfi	Leporidi	<i>Lepus europaeus</i>	Lepre	Pallas, 1778
Carnivori	Mustelidi	<i>Martes foina</i>	Faina	Erxleben, 1777
Carnivori	Mustelidi	<i>Meles meles</i>	Tasso	Linnaeus, 1758
Roditori	Muridi	<i>Mus domesticus</i>	Topo domestico	Schwart, 1943
Roditori	Gliridi	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	Linnaeus, 1758
Carnivori	Mustelidi	<i>Mustela nivalis</i>	Donnola	Linnaeus, 1766
Chiroteri	Vespertilionidi	<i>Nyctalus noctula</i>	Nottola comune	Schreber, 1774
Chiroteri	Vespertilionidi	<i>Pipistrellus Kuhlii</i>	Pipistrello albolimbato	Kuhl, 1817
Roditori	Muridi	<i>Rattus norvegicus</i>	Ratto delle chiaviche	Berkenhout, 1769
Chiroteri	Rinolofidi	<i>Rhinolophus ferruequinum</i>	Rinolofo maggiore	Schreber, 1774
Insettivori	Soricidi	<i>Sorex minutus</i>	Toporagno nano	Linnaeus, 1766
Artiodattili	Suidi	<i>Sus scrofa</i>	Cinghiale	Linnaeus, 1758
Insettivori	Talpidi	<i>Talpa romana</i>	Talpa romana	Thomas, 1902
Carnivori	Canidi	<i>Vulpes vulpes</i>	Volpe	Linnaeus, 1758

Mammiferi		
Famiglia	n. specie	Percentuale
Talpidi	1	5%
Erinaceidi	1	5%
Soricidi	1	5%
Rinolofidi	1	5%
Vespertilionidi	5	24%
Leporidi	1	5%
Muridi	4	19%
Canidi	2	9%
Mustelidi	3	14%
Suidi	1	5%
Gliridi	1	5%



Nessun mammifero interferisce in maniera diretta con le opere di progetto in fase di esercizio, bassa interferenza per alcuni Chirotteri (di solito volano al di sotto della rotazione delle pale). Lieve disturbo ed interferenze durante la fase di cantiere e dismissione. Probabile distruzione di sito di riproduzione per qualche roditore.

Nb: le specie di chirotteri inserite nella lista dei mammiferi, sono da considerarsi, in parte, come specie potenziali. La ricerca di siti di riproduzione, la ricerca con il Bat-detector, oltre all'avvistamento diretto di alcuni individui, non stabilisce in modo preciso l'appartenenza dell'individuo censito a quella determinata specie.

Uccelli – specie presenti e potenzialmente presenti all'interno dell'Area di Studio n. 114

Classe Uccelli					
Cod. Euring	Ordine	Famiglia	Nome Scientifico	Specie	Classificatore
02690	Accipitriformi	Accipitridi	<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere	<i>Linnaeus, 1758</i>
12510	Passeriformi	Silvidi	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Cannaiola	<i>Hermann. 1804</i>
05560	Caradriformi	Tringini	<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro-piro piccolo	<i>Linnaeus, 1758</i>
14370	Passeriformi	Egitalidi	<i>Aegithalos caudatus</i>	Codibugnolo	<i>Linnaeus, 1758</i>
09760	Passeriformi	Alaudidi	<i>Alauda arvensis</i>	Allodola	<i>Linnaeus, 1758</i>
08310	Coraciformi	Alcedinidi	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	<i>Linnaeus, 1758</i>
01940	Anseriformi	Anatidi	<i>Anas clypeata</i>	Mestolone	<i>Linnaeus, 1758</i>
01840	Anseriformi	Anatidi	<i>Anas crecca</i>	Alzavola	<i>Linnaeus, 1758</i>
01860	Anseriformi	Anatidi	<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale	<i>Linnaeus, 1758</i>
01910	Anseriformi	Anatidi	<i>Anas querquedula</i>	Marzaiola	<i>Linnaeus, 1758</i>
01610	Anseriformi	Anatidi	<i>Anser anser</i>	Oca selvatica	<i>Linnaeus, 1758</i>
10110	Passeriformi	Motacillidi	<i>Anthus pratensis</i>	Pispola	<i>Linnaeus, 1758</i>
07950	Apodiformi	Apodidi	<i>Apus apus</i>	Rondone	<i>Linnaeus, 1758</i>
01220	Ciconiformi	Ardeidi	<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino	<i>Linnaeus, 1758</i>
07670	Stringiformi	Strigini	<i>Asio otus</i>	Gufo comune	<i>Linnaeus, 1758</i>
07570	Stringiformi	Bubonini	<i>Athene noctua</i>	Civetta	<i>Scopoli, 1769</i>
01110	Ciconiformi	Ardeidi	<i>Bubulcus ibis</i>	Airone guardabuoi	<i>Linnaeus, 1758</i>
04560	Caradriformi	Burinidi	<i>Burhinus oedicephalus</i>	Occhione	<i>Linnaeus, 1758</i>
02870	Accipitriformi	Accipitridi	<i>Buteo buteo</i>	Poiana	<i>Linnaeus, 1758</i>
09680	Passeriformi	Alaudidi	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella	<i>Leisler, 1814</i>

0778	Caprimulgiformi	Caprimulgidi	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	<i>Linnaeus, 1758</i>
16530	Passeriformi	Fringillidi	<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino	<i>Linnaeus, 1758</i>
16490	Passeriformi	Fringillidi	<i>Carduelis chloris</i>	Verdone	<i>Linnaeus, 1758</i>
16540	Passeriformi	Fringillidi	<i>Carduelis spinus</i>	Lucarino	<i>Linnaeus, 1758</i>
12200	Passeriformi	Silvidi	<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume	<i>Temminck, 1820</i>
04690	Caradriformi	Caradridi	<i>Charadrius dubius</i>	Corriere piccolo	<i>Scopoli, 1786</i>
06270	Caradriformi	Sternidi	<i>Chilodonia niger</i>	Mignattino	<i>Linnaeus, 1758</i>
01340	Ciconiformi	Ciconidi	<i>Ciconia Ciconia</i>	Cicogna bianca	<i>Linnaeus, 1758</i>
02600	Accipitriformi	Accipitridi	<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	<i>Linnaeus, 1758</i>
02610	Accipitriformi	Accipitridi	<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	<i>Linnaeus, 1766</i>
02630	Accipitriformi	Accipitridi	<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	<i>Linnaeus, 1758</i>
12260	Passeriformi	Silvidi	<i>Cisticola juncidis</i>	Beccamoschino	<i>Rafinesque, 1810</i>
06650	Columbiformi	Columbidi	<i>Columba livia,</i>	Piccione selvatico	<i>J.F. Gmelin. 1789</i>
06700	Columbiformi	Columbidi	<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio	<i>Linnaeus, 1758</i>
08410	Coraciformi	Coracidi	<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	<i>Linnaeus, 1758</i>
15670	Passeriformi	Corvidi	<i>Corvus corone</i>	Cornacchia grigia	<i>Linnaeus, 1758</i>
15600	Passeriformi	Corvidi	<i>Corvus monedula</i>	Taccola	<i>Linnaeus, 1758</i>
03700	Galliformi	Fasianidi	<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia	<i>Linnaeus, 1758</i>
07240	Cuculiformi	Cuculidi	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	<i>Linnaeus, 1758</i>
10010	Passeriformi	Irundinidi	<i>Delichon urbica</i>	Balestruccio	<i>Linnaeus, 1758</i>
08760	Piciformi	Picidi	<i>Dendrocopos major</i>	Picchio rosso maggiore	<i>Linnaeus, 1758</i>
01190	Ciconiformi	Ardeidi	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	<i>Linnaeus, 1766</i>
18580	Passeriformi	Emberizidi	<i>Emberiza cirrus</i>	Zigolo nero	<i>Linnaeus, 1766</i>
18770	Passeriformi	Emberizidi	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Migliarino di palude	<i>Linnaeus, 1758</i>
10990	Passeriformi	Turdidi	<i>Erithacus rubecula</i>	Pettirosso	<i>Linnaeus, 1758</i>
03090	Falconiformi	Falconidi	<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	<i>Linnaeus, 1758</i>


03030	Falconiformi	Falconidi	<i>Falco naumanni</i>	Grillaio	<i>Fleischer, 1818</i>
03200	Falconiformi	Falconidi	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	<i>Tunstall, 1771</i>
03100	Falconiformi	Falconidi	<i>Falco Subbuteo</i>	Lodolaio	<i>Linnaeus, 1758</i>
03040	Falconiformi	Falconidi	<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio	<i>Linnaeus, 1758</i>
03070	Falconiformi	Falconidi	<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	<i>Linnaeus, 1766</i>
16360	Passeriformi	Fringillidi	<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello	<i>Linnaeus, 1758</i>
04290	Galliformi	Rallidi	<i>Fulica atra</i>	Folaga	<i>Linnaeus, 1758</i>
09720	Passeriformi	Alaudidi	<i>Galerida cristata</i>	Cappellaccia	<i>Linnaeus, 1758</i>
05190	Caradriformi	Galliginini	<i>Gallinago gallinago</i>	Beccaccino	<i>Linnaeus, 1758</i>
04240	Galliformi	Rallidi	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua	<i>Linnaeus, 1758</i>
15390	Passeriformi	Corvidi	<i>Garrulous glandarius</i>	Ghiandaia	<i>Linnaeus, 1758</i>
04330	Galliformi	Gruidi	<i>Grus grus</i>	Gru	<i>Linnaeus, 1758</i>
09920	Passeriformi	Irundinidi	<i>Hirundo rustica</i>	Rondine	<i>Linnaeus, 1758</i>
00980	Ciconiformi	Ardeidi	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	<i>Linnaeus, 1766</i>
15150	Passeriformi	Lanidi	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	<i>Linnaeus, 1758</i>
15190	Passeriformi	Lanidi	<i>Lanius minor</i>	Averla cenerina	<i>j.F.gmelin, 1788</i>
15230	Passeriformi	Lanidi	<i>Lanius senator</i>	Averla capirossa	<i>Linnaeus, 1758</i>
05920	Caradriformi	Laridi	<i>Larus argentatus</i>	Gabbiano reale	<i>Pontoppidan, 1763</i>
05820	Caradriformi	Laridi	<i>Larus ridibundus</i>	Gabbiano comune	<i>Linnaeus, 1766</i>
09610	Passeriformi	Alaudidi	<i>Melanocorypha calandra</i>	Calandra	<i>Linnaeus, 1766</i>
08400	Coraciformi	Meropidi	<i>Merops apiaster</i>	Gruccione	<i>Linnaeus, 1758</i>
18820	Passeriformi	Emberizidi	<i>Miliaria calandra</i>	Strillozzo	<i>Linnaeus, 1758</i>
02380	Accipitriformi	Accipitridi	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	<i>Boddaert, 1783</i>
02390	Accipitriformi	Accipitridi	<i>Milvus milvus</i>	Nibbio reale	<i>Linnaeus, 1758</i>
11660	Passeriformi	Turdidi	<i>Monticola solitarius</i>	Passero solitario	<i>Linnaeus, 1758</i>
10200	Passeriformi	Motacillidi	<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca	<i>Linnaeus, 1758</i>

10170	Passeriformi	Motacillidi	<i>Motacilla flava</i>	Cutrettola	<i>Linnaeus, 1758</i>
15080	Passeriformi	Oriolidi	<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo	<i>Linnaeus, 1758</i>
07390	Stringiformi	Bubonini	<i>Otus scops</i>	Assiolo	<i>Linnaeus, 1758</i>
14620	Passeriformi	Paridi	<i>Parus caeruleus</i>	Cinciarella	<i>Linnaeus, 1758</i>
14640	Passeriformi	Paridi	<i>Parus major</i>	Cinciallegra	<i>Linnaeus, 1758</i>
15910	Passeriformi	Passeridi	<i>Passer domesticus</i>	Passera europea	<i>Linnaeus, 1758</i>
15980	Passeriformi	Passeridi	<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia	<i>Linnaeus, 1758</i>
03670	Galliformi	Fasianidi	<i>Perdix perdix</i>	Starna	<i>Linnaeus, 1758</i>
02310	Accipitriformi	Accipitridi	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	<i>Linnaeus, 1758</i>
00720	Pelecaniformi	Falacrocoracidi	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Marangone	<i>Linnaeus, 1758</i>
03940	Galliformi	Fasianidi	<i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano comune	<i>Linnaeus, 1758</i>
11220	Passeriformi	Turdidi	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codiroso	<i>Linnaeus, 1758</i>
11210	Passeriformi	Turdidi	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Codiroso spazzacamino	<i>S.G.gmelin, 1774</i>
13110	Passeriformi	Silvidi	<i>Phylloscopus collybita</i>	Luì piccolo	<i>Vieillot, 1817</i>
15490	Passeriformi	Corvidi	<i>Pica pica</i>	Gazza	<i>Linnaeus, 1758</i>
08560	Piciformi	Picidi	<i>Picus viridis</i>	Picchio verde	<i>Linnaeus, 1758</i>
04850	Caradriformi	Caradridi	<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato	<i>Linnaeus, 1758</i>
10840	Passeriformi	Prunellidi	<i>Prunella modularis</i>	Passera scopaiola	<i>Linnaeus, 1758</i>
13140	Passeriformi	Silvidi	<i>Regulus regulus</i>	Regolo	<i>Linnaeus, 1758</i>
14900	Passeriformi	Remizidi	<i>Remiz pendulinum</i>	Pendolino	<i>Linnaeus, 1758</i>
11370	Passeriformi	Turdidi	<i>Saxicola rubetra</i>	Stiaccino	<i>Linnaeus, 1758</i>
11390	Passeriformi	Turdidi	<i>Saxicola torquata</i>	Saltimpalo	<i>Linnaeus, 1766</i>
05290	Caradriformi	Scolopacini	<i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia	<i>Linnaeus, 1758</i>
16400	Passeriformi	Fringillidi	<i>Serinus serinus</i>	Verzellino	<i>Linnaeus, 1766</i>
06840	Columbiformi	Columbidi	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tortora dal collare orientale	<i>E. Frivaldszki, 1838</i>
06870	Columbiformi	Columbidi	<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora	<i>Linnaeus, 1758</i>

07610	Stringiformi	Strigini	<i>Strix aluco</i>	Allocco	<i>Linnaeus, 1758</i>
15820	Passeriformi	Sturnidi	<i>Sturnus vulgaris</i>	Sturno	<i>Linnaeus, 1758</i>
12770	Passeriformi	Silvidi	<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera	<i>Linnaeus, 1758</i>
12750	Passeriformi	Silvidi	<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola	<i>Latham, 1787</i>
12670	Passeriformi	Silvidi	<i>Sylvia melanocephala</i>	Occhiocotto	<i>G.F.Gmelin, 1789</i>
00070	Podicipediformi	Podicipedi	<i>Tachybaptus rufficollis</i>	Tuffetto	<i>Pallas, 1764</i>
05540	Caradriformi	Tringini	<i>Tringa glareola</i>	Piro-piro boschereccio	<i>Linnaeus, 1758</i>
05530	Caradriformi	Tringini	<i>Tringa ochropus</i>	Piro-piro culbianco	<i>Linnaeus, 1758</i>
10660	Passeriformi	Trogloditidi	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo	<i>Linnaeus, 1758</i>
12010	Passeriformi	Turdidi	<i>Turdus iliacus</i>	Tordo sassello	<i>Linnaeus, 1766</i>
11870	Passeriformi	Turdidi	<i>Turdus merula</i>	Merlo	<i>Linnaeus, 1758</i>
12000	Passeriformi	Turdidi	<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio	<i>C.L.Brehm, 1831</i>
11980	Passeriformi	Turdidi	<i>Turdus pilaris</i>	Cesena	<i>Linnaeus, 1758</i>
12020	Passeriformi	Turdidi	<i>Turdus viscivorus</i>	Tordela	<i>Linnaeus, 1758</i>
07350	Stringiformi	Titonidi	<i>Tyto alba</i>	Barbagianni	<i>Scolpoli, 1769</i>
08460	Coraciformi	Upupidi	<i>Upupa epops</i>	Upupa	<i>Linnaeus, 1758</i>
04930	Caradriformi	Caradridi	<i>Vanellus vanellus</i>	Pavoncella	<i>Linnaeus, 1758</i>

Classe Uccelli		
<i>Famiglia</i>	<i>n. specie</i>	<i>Percentuale</i>
Accipitridi	8	6%
Alaudidi	4	3%
Alcedinidi	1	1%
Anatidi	5	7%
Apodidi	1	1%
Ardeidi	4	4%
Bubonini	1	1%
Burinidi	1	1%
Caprimulgidi	1	1%
Caradradi	3	2%
Ciconidi	1	1%
Columbidi	4	3%
Coracidi	1	1%
Corvidi	4	3%
Cuculidi	1	1%
Egitalidi	1	1%
Emberizidi	3	2%
Falacrocoracidi	1	1%
Falconidi	6	4%
Fasianidi	3	2%
Fringillidi	5	4%
Galliginini	1	1%
Gruidi	1	1%
Irundinidi	2	1%
Lanidi	3	2%
Laridi	2	3%
Meropidi	1	1%
Motacillidi	3	2%
Oriolidi	1	1%
Paridi	2	1%
Passeridi	2	1%
Picidi	2	1%
Podicipidi	1	2%
Prunellidi	1	1%
Rallidi	2	2%
Remizidi	1	1%
Scolopacini	1	1%

Silvidi	8	6%
Sternidi	1	1%
Strigini	2	1%
Sturnidi	1	1%
Titonidi	1	1%
Tringini	3	4%
Trogloditidi	1	1%
Turdidi	11	8%
Upupidi	1	1%



Parco Eolico Fenice

STATUS FENOLOGICO DELLE SPECIE FAUNISTICHE INDIVIDUATE ALL'INTERNO DELL'AREA DI STUDIO

Per una migliore interpretazione dei dati sullo **status fenologico** delle specie faunistiche presenti o potenzialmente presenti all'interno dell'area di studio, si è usata una simbologia abbreviata posta accanto al nome della specie. Inoltre si precisa che tutti i dati relativi alle specie di seguito riportate si riferiscono alle predilezioni, preferenze, comportamenti e abitudini proprie della specie anche al di fuori della stretta area di indagine.

Le sigle così individuate sono:

Parco Eolico Fenice Status Fenologico della Fauna		
Sigla	Descrizione	Riferimento
C	Comune – specie con più alta densità e maggiore presenza all'interno dell'area di studio, ubiquitaria.	Presenza
F	Frequente – specie con medie densità e presenza sufficiente all'interno dell'area di studio, localizzata all'interno di habitat di predilezione.	Presenza
R	Rara – specie con scarsa densità e presenza all'interno dell'area di studio, localizzata con pochi individui all'interno di habitat di predilezione.	Presenza
A	Accidentale – specie con presenza sporadica e occasionale. Individui isolati spinti fuori dal proprio areale o della propria rotta da forti perturbazioni atmosferiche ed altri fenomeni rari.	Presenza
S	Sedentaria, la specie risiede sullo stesso territorio durante tutto l'arco dell'anno.	Fenologia
M reg.	Migratrice regolare, la specie si trasferisce regolarmente in due periodi dell'anno (ripasso primaverile e passo autunnale) con tutti gli individui della popolazione in altri areali molto distanti tra di loro.	Fenologia
M par.	Migratrice parziale, la specie si trasferisce regolarmente in due periodi dell'anno (ripasso primaverile e passo autunnale) con una parte della popolazione in altri areali molto distanti tra di loro.	Fenologia
H1	Vegetazione igrofila-palustre	Habitat
H2	Vegetazione spontanea arborea-arbustiva-erbacea	Habitat
H3	Seminativi e colture arboree	Habitat
H4	Edificato urbano-rurale	Habitat
H5	Aree boscate e macchia mediterranea	Habitat
N C	Nidificante certo, si riferisce a tutte le specie stanziali, e a quelle che è stato riscontrata la presenza del nido all'interno degli habitat dell'area di studio.	Riproduzione
N P	Nidificante probabile, quelle specie che sono presenti all'interno dell'area di studio durante il periodo della riproduzione, dove sono	Riproduzione

	state riscontrate tracce della nidificazione.	
X	Non nidificante	Riproduzione

Presenza delle specie faunistiche presenti e potenzialmente presente all'interno dell'area di studio

Parco Eolico Fenice Presenze Faunistiche in Area di Studio		
Nome Scientifico	Nome Italiano	Presenza
<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere	C
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Cannaiola	R
<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro-piro piccolo	F
<i>Aegithalos caudatus</i>	Codibugnolo	R
<i>Alauda arvensis</i>	Allodola	C
<i>Alburnus albidus</i>	Alborella	F
<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	F
<i>Anas clypeata</i>	Mestolone	R
<i>Anas crecca</i>	Alzavola	C
<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale	C
<i>Anas querquedula</i>	Marzaiola	R
<i>Anser anser</i>	Oca selvatica	A
<i>Anthus pratensis</i>	Pispola	F
<i>Apodemus sylvaticus</i>	Topo campagnolo	C
<i>Apus apus</i>	Rondone	C
<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino	F
<i>Arvicola terrestris</i>	Arvicola Terrestre	C
<i>Asio otus</i>	Gufo comune	F
<i>Athene noctua</i>	Civetta	C
<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastello comune	F
<i>Bubulcus ibis</i>	Airone guardabuoi	F
<i>Bufo bufo</i>	Rospo comune	C
<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	F
<i>Burhinus oedicephalus</i>	Occhione	R
<i>Buteo buteo</i>	Poiana	C
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella	F
<i>Canis lupus</i>	Lupo appenninico	R
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiapapere	R
<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino	F

<i>Carduelis chloris</i>	Verdone	<i>R</i>
<i>Carduelis spinus</i>	Lucarino	<i>R</i>
<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume	<i>F</i>
<i>Charadrius dubius</i>	Corriere piccolo	<i>A</i>
<i>Chilodonia niger</i>	Mignattino	<i>A</i>
<i>Ciconia Ciconia</i>	Cicogna bianca	<i>A</i>
<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	<i>F</i>
<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	<i>R</i>
<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	<i>F</i>
<i>Cisticola juncidis</i>	Beccamoschino	<i>R</i>
<i>Columba livia</i>	Piccione selvatico	<i>C</i>
<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio	<i>C</i>
<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	<i>R</i>
<i>Corvus corone</i>	Cornacchia grigia	<i>C</i>
<i>Corvus monedula</i>	Taccola	<i>C</i>
<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia	<i>C</i>
<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	<i>R</i>
<i>Cyprinus carpio</i>	Carpa	<i>F</i>
<i>Delichon urbica</i>	Balestruccio	<i>C</i>
<i>Dendrocopos major</i>	Picchio rosso maggiore	<i>R</i>
<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	<i>C</i>
<i>Elaphe quatorlineata</i>	Cervone	<i>C</i>
<i>Emberiza cirrus</i>	Zigolo nero	<i>F</i>
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Migliarino di palude	<i>R</i>
<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine d'acqua	<i>R</i>
<i>Eptesicus serotinus</i>	Serotino comune	<i>F</i>
<i>Erinaceus europaeus</i>	Riccio	<i>C</i>
<i>Erithacus rubecula</i>	Pettiroso	<i>F</i>
<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	<i>R</i>
<i>Falco naumanni</i>	Grillaio	<i>F</i>
<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	<i>R</i>
<i>Falco Subbuteo</i>	Lodolaio	<i>A</i>
<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio	<i>C</i>
<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	<i>C</i>
<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello	<i>C</i>
<i>Fulica atra</i>	Folaga	<i>C</i>
<i>Galerida cristata</i>	Cappellaccia	<i>C</i>
<i>Gallinago gallinago</i>	Beccaccino	<i>F</i>
<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua	<i>C</i>
<i>Garrulous glandarius</i>	Ghiandaia	<i>C</i>

<i>Grus grus</i>	Gru	<i>R</i>
<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco	<i>C</i>
<i>Hirundo rustica</i>	Rondine	<i>C</i>
<i>Hypsugo savii</i>	Pipistrello di Savi	<i>F</i>
<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	<i>F</i>
<i>Lacerta viridis</i>	Ramarro	<i>C</i>
<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	<i>F</i>
<i>Lanius minor</i>	Averla cenerina	<i>A</i>
<i>Lanius senator</i>	Averla capirossa	<i>F</i>
<i>Larus argentatus</i>	Gabbiano reale	<i>C</i>
<i>Larus ridibundus</i>	Gabbiano comune	<i>C</i>
<i>Lepus europaeus</i>	Lepre	<i>C</i>
<i>Lissotriton italicus</i>	Tritone italico	<i>R</i>
<i>Martes foina</i>	Faina	<i>F</i>
<i>Melanocorypha calandra</i>	Calandra	<i>R</i>
<i>Meles meles</i>	Tasso	<i>F</i>
<i>Merops apiaster</i>	Gruccione	<i>F</i>
<i>Miliaria calandra</i>	Strillozzo	<i>C</i>
<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	<i>R</i>
<i>Milvus milvus</i>	Nibbio reale	<i>R</i>
<i>Monticola solitarius</i>	Passero solitario	<i>R</i>
<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca	<i>F</i>
<i>Motacilla flava</i>	Cutrettola	<i>R</i>
<i>Mus domesticus</i>	Topo domestico	<i>C</i>
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	<i>R</i>
<i>Mustela nivalis</i>	Donnola	<i>R</i>
<i>Natrix natrix</i>	Natrice dal collare	<i>F</i>
<i>Natrix tassellata</i>	Biscia tassellata	<i>F</i>
<i>Nyctalus noctula</i>	Nottola comune	<i>R</i>
<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo	<i>R</i>
<i>Otus scops</i>	Assiolo	<i>F</i>
<i>Parus caeruleus</i>	Cinciarella	<i>F</i>
<i>Parus major</i>	Cinciallegra	<i>F</i>
<i>Passer domesticus</i>	Passera europea	<i>C</i>
<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia	<i>F</i>
<i>Perdix perdix</i>	Starna	<i>F</i>
<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	<i>R</i>
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Marangone	<i>R</i>
<i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano comune	<i>C</i>
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Codiroso spazzacamino	<i>F</i>

<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codiroso	<i>F</i>
<i>Phylloscopus collybita</i>	Luì piccolo	<i>F</i>
<i>Pica pica</i>	Gazza	<i>C</i>
<i>Picus viridis</i>	Picchio verde	<i>R</i>
<i>Pipistrellus Kuhlii</i>	Pipistrello albolimbato	<i>C</i>
<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato	<i>R</i>
<i>Podarcis sicula</i>	Lucertola campestre	<i>C</i>
<i>Prunella modularis</i>	Passera scopaiola	<i>R</i>
<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	<i>R</i>
<i>Rana esculenta</i>	Rana verde italiana	<i>C</i>
<i>Rattus norvegicus</i>	Ratto delle chiaviche	<i>C</i>
<i>Regulus regulus</i>	Regolo	<i>R</i>
<i>Remiz pendulinus</i>	Pendolino	<i>R</i>
<i>Rhinolophus ferruequinum</i>	Rinolofo maggiore	<i>C</i>
<i>Saxicola rubetra</i>	Stiaccino	<i>F</i>
<i>Saxicola torquata</i>	Saltimpalo	<i>F</i>
<i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia	<i>F</i>
<i>Serinus serinus</i>	Verzellino	<i>F</i>
<i>Sorex minutus</i>	Toporagno nano	<i>F</i>
<i>Squalius squalus</i>	Cavedano	<i>F</i>
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tortora dal collare orientale	<i>C</i>
<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora comune	<i>C</i>
<i>Strix aluco</i>	Allocco	<i>R</i>
<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno	<i>C</i>
<i>Sus scrofa</i>	Cinghiale	<i>C</i>
<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera	<i>F</i>
<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola	<i>F</i>
<i>Sylvia melanocephala</i>	Occhiocotto	<i>R</i>
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Tuffetto	<i>R</i>
<i>Talpa romana</i>	Talpa romana	<i>R</i>
<i>Tarentula mauritanica</i>	Geco comune	<i>F</i>
<i>Testudo hermanni</i>	Tartaruga di terra	<i>R</i>
<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio	<i>R</i>
<i>Tringa ochropus</i>	Piro piro culbianco	<i>R</i>
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo	<i>F</i>
<i>Turdus iliacus</i>	Tordo sassello	<i>F</i>
<i>Turdus merula</i>	Merlo	<i>C</i>
<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio	<i>C</i>
<i>Turdus pilaris</i>	Cesena	<i>R</i>
<i>Turdus viscivorus</i>	Tordela	<i>F</i>

<i>Tyto alba</i>	Barbagianni	<i>C</i>
<i>Upupa epops</i>	Upupa	<i>F</i>
<i>Vanellus vanellus</i>	Pavoncella	<i>F</i>
<i>Vipera aspis</i>	Vipera comune	<i>R</i>
<i>Vulpes vulpes</i>	Volpe	<i>C</i>

I dati riferiti alla presenza della specie sul territorio (comune, frequente, raro, accidentale) non si riferiscono alla densità totale della popolazione della specie indicata, ma tale valore, viene attribuito in base al numero di individui della stessa specie presenti all'interno dell'Area di Studio.

Presenze faunistiche in area di studio		
<i>Presenza</i>	<i>n. specie</i>	<i>Percentuale</i>
Comune	50	32%
Frequente	52	34%
Rara	46	30%
Accidentale	6	4%



La presenza maggiore pari al 34% (frequente) è data dalle specie che di solito, anche con pochi individui frequenta l'area di studio. La maggior parte di esse sono quelle dette sinantropiche, cioè abituate alla presenza dell'uomo e delle sue attività.


Parco Eolico Fenice Fenologia Specie Faunistiche in area di studio		
Nome Scientifico	Nome Italiano	Fenologia
<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere	M par
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Cannaiola	M reg
<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro-piro piccolo	M reg
<i>Aegithalos caudatus</i>	Codibugnolo	M par
<i>Alauda arvensis</i>	Allodola	M reg
<i>Alburnus albidus</i>	Alborella	S
<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	S
<i>Anas clypeata</i>	Mestolone	M reg
<i>Anas crecca</i>	Alzavola	M reg
<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale	M par
<i>Anas querquedula</i>	Marzaiola	M reg
<i>Anser anser</i>	Oca selvatica	M reg
<i>Anthus pratensis</i>	Pispola	M reg
<i>Apodemus sylvaticus</i>	Topo campagnolo	S
<i>Apus apus</i>	Rondone	M reg
<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino	M par
<i>Arvicola terrestris</i>	Arvicola Terrestre	S
<i>Asio otus</i>	Gufo comune	S
<i>Athene noctua</i>	Civetta	S
<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastello comune	S
<i>Bubulcus ibis</i>	Airone guardabuoi	M par
<i>Bufo bufo</i>	Rospo comune	S
<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	S
<i>Burhinus oedicephalus</i>	Occhione	M reg
<i>Buteo buteo</i>	Poiana	S
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella	M reg
<i>Canis lupus</i>	Lupo appenninico	S
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	M reg
<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino	M par
<i>Carduelis chloris</i>	Verdone	M reg
<i>Carduelis spinus</i>	Lucarino	M reg
<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume	M par
<i>Charadrius dubius</i>	Corriere piccolo	M reg
<i>Chilodactylus niger</i>	Mignattino	M reg
<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca	M reg

<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	M par
<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	M reg
<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	M reg
<i>Cisticola juncidis</i>	Beccamoschino	M par
<i>Columba livia</i>	Piccione selvatico	S
<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio	M par
<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	M reg
<i>Corvus corone</i>	Cornacchia grigia	S
<i>Corvus monedula</i>	Taccola	S
<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia	M reg
<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	M reg
<i>Cyprinus carpio</i>	Carpa	S
<i>Delichon urbica</i>	Balestruccio	M reg
<i>Dendrocopos major</i>	Picchio rosso maggiore	S
<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	M par
<i>Elaphe quatorlineata</i>	Cervone	S
<i>Emberiza cirrus</i>	Zigolo nero	M par
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Migliarino di palude	M par
<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine d'acqua	S
<i>Eptesicus serotinus</i>	Serotino comune	S
<i>Erinaceus europaeus</i>	Riccio	S
<i>Erithacus rubecula</i>	Pettiroso	M par
<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	M reg
<i>Falco naumanni</i>	Grillaio	M reg
<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	S
<i>Falco Subbuteo</i>	Lodolaio	M reg
<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio	S
<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	M reg
<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello	M par
<i>Fulica atra</i>	Folaga	M par
<i>Galerida cristata</i>	Cappellaccia	S
<i>Gallinago gallinago</i>	Beccaccino	M reg
<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua	S
<i>Garrulous glandarius</i>	Ghiandaia	S
<i>Grus grus</i>	Gru	M reg
<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco	S
<i>Hirundo rustica</i>	Rondine	M reg
<i>Hypsugo savii</i>	Pipistrello di Savi	S
<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	M reg
<i>Lacerta viridis</i>	Ramarro	S

<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	M reg
<i>Lanius minor</i>	Averla cenerina	M reg
<i>Lanius senator</i>	Averla capirossa	M reg
<i>Larus argentatus</i>	Gabbiano reale	S
<i>Larus ridibundus</i>	Gabbiano comune	S
<i>Lepus europaeus</i>	Lepre	S
<i>Lissotriton italicus</i>	Tritone italico	S
<i>Martes foina</i>	Faina	S
<i>Melanocorypha calandra</i>	Calandra	M reg
<i>Meles meles</i>	Tasso	S
<i>Merops apiaster</i>	Gruccione	M reg
<i>Miliaria calandra</i>	Strillozzo	S
<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	M reg
<i>Milvus milvus</i>	Nibbio reale	S
<i>Monticola solitarius</i>	Passero solitario	M par
<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca	M reg
<i>Motacilla flava</i>	Cutrettola	M reg
<i>Mus domesticus</i>	Topo domestico	S
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	S
<i>Mustela nivalis</i>	Donnola	S
<i>Natrix natrix</i>	Natrice dal collare	S
<i>Natrix tassellata</i>	Biscia tassellata	S
<i>Nyctalus noctula</i>	Nottola comune	S
<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo	M reg
<i>Otus scops</i>	Assiolo	M reg
<i>Parus caeruleus</i>	Cinciarella	M reg
<i>Parus major</i>	Cinciallegra	M par
<i>Passer domesticus</i>	Passera europea	S
<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia	S
<i>Perdix perdix</i>	Starna	S
<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	M reg
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Marangone	M par
<i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano comune	S
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Codirosso spazzacamino	M reg
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codirosso	M reg
<i>Phylloscopus collybita</i>	Luì piccolo	M par
<i>Pica pica</i>	Gazza	S
<i>Picus viridis</i>	Picchio verde	S
<i>Pipistrellus Kuhlii</i>	Pipistrello albolimbato	S
<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato	M reg

<i>Podarcis sicula</i>	Lucertola campestre	S
<i>Prunella modularis</i>	Passera scopaiola	M reg
<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	S
<i>Rana esculenta</i>	Rana verde italiana	S
<i>Rattus norvegicus</i>	Ratto delle chiaviche	S
<i>Regulus regulus</i>	Regolo	M reg
<i>Remiz pendulinus</i>	Pendolino	M reg
<i>Rhinolophus ferruequinum</i>	Rinolofo maggiore	S
<i>Saxicola rubetra</i>	Stiaccino	M reg
<i>Saxicola torquata</i>	Saltimpalo	M par
<i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia	M reg
<i>Serinus serinus</i>	Verzellino	M reg
<i>Sorex minutus</i>	Toporagno nano	S
<i>Squalius squalus</i>	Cavedano	S
<i>Sterna albifrons</i>	Fraticello	M reg
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tortora dal collare orientale	S
<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora comune	M reg
<i>Strix aluco</i>	Allocco	S
<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno	M par
<i>Sus scrofa</i>	Cinghiale	S
<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera	M par
<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola	M reg
<i>Sylvia melanocephala</i>	Occhiocotto	M par
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Tuffetto	M par
<i>Talpa romana</i>	Talpa romana	S
<i>Tarentula mauritanica</i>	Geco comune	S
<i>Testudo hermanni</i>	Tartaruga di terra	S
<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio	M reg
<i>Tringa ochropus</i>	Piro piro culbianco	M reg
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo	S
<i>Turdus iliacus</i>	Tordo sassello	M reg
<i>Turdus merula</i>	Merlo	M par
<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio	M reg
<i>Turdus pilaris</i>	Cesena	M reg
<i>Turdus viscivorus</i>	Tordela	M reg
<i>Tyto alba</i>	Barbagianni	S
<i>Upupa epops</i>	Upupa	M reg
<i>Vanellus vanellus</i>	Pavoncella	M reg
<i>Vipera aspis</i>	Vipera comune	S
<i>Vulpes vulpes</i>	Volpe	S

Fenologia Fauna		
Fenologia	n. specie	Percentuale
Migratore regolare	64	41%
Migratore parziale	26	17%
Stanziale	66	42%



Il 41% della fauna presa in considerazione è migratore regolare, cioè risiede sul territorio per alcuni periodi dell'anno, sia primaverili che invernali. Di conseguenza la parziale presenza annuale sul territorio, riduce di molto le probabilità di interferenza con le opere di progetto.

I dati riferiti allo status fenologico delle specie faunistiche individuate all'interno dell'area di studio (Stanziale, M reg., M par.), si riferiscono al comportamento della specie a prescindere dal territorio dove la specie è stata censita. La migrazione è un fenomeno di grandissime dimensioni su vasta scala, che non interessa aree di piccole dimensioni. Nella categoria delle specie stanziali, sono state inserite anche le classi degli anfibi, dei rettili e dei mammiferi corrispondenti a n. 39 specie; le quali per loro natura non possono essere considerate come specie migratrici. Per le specie migratrice regolari non è stato considerato se sono svernanti oppure estivanti, perché in ogni caso, risiedono sul territorio soltanto una parte dell'anno.

Parco Eolico Fenice Habitat Faunistici in area di studio		
<i>Nome Scientifico</i>	<i>Nome Italiano</i>	<i>Habitat</i>
<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere	H2-H5
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Cannaiola	H1
<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro-piro piccolo	H1
<i>Aegithalos caudatus</i>	Codibugnolo	H1-H2
<i>Alauda arvensis</i>	Allodola	H2-H3
<i>Alburnus albidus</i>	Alborella	H1
<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	H1
<i>Anas clypeata</i>	Mestolone	H1
<i>Anas crecca</i>	Alzavola	H1
<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale	H1
<i>Anas querquedula</i>	Marzaiola	H1
<i>Anser anser</i>	Oca selvatica	H1-H2
<i>Anthus pratensis</i>	Pispola	H2-H3
<i>Apodemus sylvaticus</i>	Topo campagnolo	H2-H3
<i>Apus apus</i>	Rondone	H3-H4
<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino	HI
<i>Arvicola terrestris</i>	Arvicola Terrestre	H2-H3
<i>Asio otus</i>	Gufo comune	H2-H4
<i>Athene noctua</i>	Civetta	H2-H3-H4
<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastello comune	H1-H4
<i>Bubulcus ibis</i>	Airone guardabuoi	HI-H2
<i>Bufo bufo</i>	Rospo comune	H1-H2
<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	H1-H2
<i>Burhinus oedicephalus</i>	Occhione	H2-H3
<i>Buteo buteo</i>	Poiana	H2-H3-H5
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella	H2-H3
<i>Canis lupus</i>	Lupo appenninico	H2-H3-H5
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiapapre	H2
<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino	H2-H3
<i>Carduelis chloris</i>	Verdone	H2-H3-H5
<i>Carduelis spinus</i>	Lucarino	H2-H5
<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume	H1
<i>Charadrius dubius</i>	Corriere piccolo	H1
<i>Chilodactylus niger</i>	Mignattino	H1
<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca	H1-H2
<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	H1-H3

<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	H2-H3
<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	H2-H3
<i>Cisticola juncidis</i>	Beccamoschino	H1
<i>Columba livia</i>	Piccione selvatico	H3-H4
<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio	H2-H3-H5
<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	H2-H3
<i>Corvus corone</i>	Cornacchia grigia	H2-H3
<i>Corvus monedula</i>	Taccola	H2-H3-H4
<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia	H3
<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	H2
<i>Cyprinus carpio</i>	Carpa	H1
<i>Delichon urbica</i>	Balestruccio	H1-H3
<i>Dendrocopos major</i>	Picchio rosso maggiore	H5
<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	H1
<i>Elaphe quatorlineata</i>	Cervone	H2-H3-H4
<i>Emberiza cirrus</i>	Zigolo nero	H2-HE
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Migliarino di palude	H1
<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine d'acqua	H1
<i>Eptesicus serotinus</i>	Serotino comune	H3-H4
<i>Erinaceus europaeus</i>	Riccio	H2-H5
<i>Erithacus rubecula</i>	Pettiroso	H2-H5
<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	H2-H3
<i>Falco naumanni</i>	Grillaio	H2-H3
<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	H2-H3
<i>Falco Subbuteo</i>	Lodolaio	H2-H3
<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio	H2-H3-H4
<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	H2-H3
<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello	H2-H3
<i>Fulica atra</i>	Folaga	H1
<i>Galerida cristata</i>	Cappellaccia	H2-H3
<i>Gallinago gallinago</i>	Beccaccino	H1
<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua	H1
<i>Garrulous glandarius</i>	Ghiandaia	H2-H3-H5
<i>Gavia arctica</i>	Strolaga mezzana	H1
<i>Grus grus</i>	Gru	H1-H2
<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco	H2-H3
<i>Hirundo rustica</i>	Rondine	H2-H3
<i>Hypsugo savii</i>	Pipistrello di Savi	H3-H4
<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	H1
<i>Lacerta viridis</i>	Ramarro	H2-H3

<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	H1-H2
<i>Lanius minor</i>	Averla cenerina	H2
<i>Lanius senator</i>	Averla capirossa	H2
<i>Larus argentatus</i>	Gabbiano reale	H1-H2-H3
<i>Larus ridibundus</i>	Gabbiano comune	H1-H2-H3
<i>Lepus europaeus</i>	Lepre	H2-H3
<i>Lissotriton italicus</i>	Tritone italico	H1
<i>Martes foina</i>	Faina	H2-H3-H5
<i>Melanocorypha calandra</i>	Calandra	H2-H3
<i>Meles meles</i>	Tasso	H2-H3-H5
<i>Merops apiaster</i>	Gruccione	H1-H2-H3
<i>Miliaria calandra</i>	Strillozzo	H2-H3
<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	H1-H2-H3
<i>Milvus milvus</i>	Nibbio reale	H2-H3-H5
<i>Monticola solitarius</i>	Passero solitario	H2-H3
<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca	H1-H2
<i>Motacilla flava</i>	Cutrettola	H1-H2
<i>Mus domesticus</i>	Topo domestico	H3-H4
<i>Musccardinus avellanarius</i>	Moscardino	H5
<i>Mustela nivalis</i>	Donnola	H2-H3
<i>Natrix natrix</i>	Natrice dal collare	H1
<i>Natrix tassellata</i>	Biscia tassellata	H1
<i>Nyctalus noctula</i>	Nottola comune	H3-H4
<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo	H2-H5
<i>Otus scops</i>	Assiolo	H2-H3-H4
<i>Parus caeruleus</i>	Cinciarella	H1-H2
<i>Parus major</i>	Cinciallegra	H1-H2
<i>Passer domesticus</i>	Passera europea	H3-H4
<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia	H2-H3
<i>Perdix perdix</i>	Starna	H2-H3
<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	H2-H5
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Marangone	H1
<i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano comune	H2-H3-H5
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Codirosso spazzacamino	H2-H3-H4
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codirosso	H2-H3-H4
<i>Phylloscopus collybita</i>	Luì piccolo	H1-H2-H5
<i>Pica pica</i>	Gazza	H2-H3-H4
<i>Picus viridis</i>	Picchio verde	H5
<i>Pipistrellus Kuhlī</i>	Pipistrello albolimbato	H2-H3-H4
<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato	H1-H2

<i>Podarcis sicula</i>	Lucertola campestre	H2-H3
<i>Prunella modularis</i>	Passera scopaiola	H1-H2
<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	H1
<i>Rana esculenta</i>	Rana verde italiana	H1
<i>Rattus norvegicus</i>	Ratto delle chiaviche	H3-H4
<i>Regulus regulus</i>	Regolo	H2-H5
<i>Remiz pendulinus</i>	Pendolino	H1
<i>Rhinolophus ferruequinum</i>	Rinolofo maggiore	H3-H5
<i>Saxicola rubetra</i>	Stiaccino	H2-H3
<i>Saxicola torquata</i>	Saltimpalo	H2-H3
<i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia	H2-H5
<i>Serinus serinus</i>	Verzellino	H2-H3
<i>Sorex minutus</i>	Toporagno nano	H2-H3
<i>Squalius squalus</i>	Cavedano	H1
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tortora dal collare orientale	H3-H4
<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora comune	H3
<i>Strix aluco</i>	Allocco	H5
<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno	H1-H2-H3
<i>Sus scrofa</i>	Cinghiale	H2-H3-H5
<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera	H2
<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola	H2-H5
<i>Sylvia melanocephala</i>	Occhiocotto	H2-H5
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Tuffetto	H1
<i>Talpa romana</i>	Talpa romana	H2
<i>Tarentula mauritanica</i>	Geco comune	H3
<i>Testudo hermanni</i>	Tartaruga di terra	H2-H5
<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio	H1
<i>Tringa ochropus</i>	Piro piro culbianco	H1
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo	H2-H5
<i>Turdus iliacus</i>	Tordo sassello	H2-H3
<i>Turdus merula</i>	Merlo	H2-H5
<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio	H2-H3
<i>Turdus pilaris</i>	Cesena	H2-H5
<i>Turdus viscivorus</i>	Tordela	H2-H3
<i>Tyto alba</i>	Barbagianni	H3-H4
<i>Upupa epops</i>	Upupa	H2-H3
<i>Vanellus vanellus</i>	Pavoncella	H1-H2
<i>Vipera aspis</i>	Vipera comune	H2 – H5
<i>Vulpes vulpes</i>	Volpe	H2-H3-H5

Gli habitat faunistici sono stati attribuiti ad ogni specie, in riferimento al comportamento della stessa specie e di individui della specie a prediligere quel determinato habitat come nicchia rifugio/riproduzione, nicchia trofica, o solamente una delle due.

Habitat faunistici			
Habitat	Sigla	n. specie	Percentuale
Vegetazione igrofila-palustre	H1	65	21%
Vegetazione spontanea arborea-arbustiva-erbacea	H2	109	36%
Seminativi e colture arboree	H3	78	25%
Edificato urbano-rurale	H4	21	7%
Aree boscate e macchia mediterranea	H5	33	11%



Il 36% della fauna predilige l'habitat con vegetazione spontanea arborea-arbustiva-erbacea fuori dall'area di progetto, il 25% della fauna utilizza l'habitat seminativi e colture arboree costituente anche l'area di progetto, il 21% l'habitat vegetazione igrofila-palustre fuori dall'area di progetto, il 11% l'habitat Aree boscate e macchia mediterranea, fuori dall'area di progetto, il 7% l'habitat edificato urbano rurale. Si precisa comunque che del 25% di area agricola, una percentuale è destinata a colture arboree ed arbustive, di conseguenza le specie che utilizzano stabilmente i seminativi (area di progetto) si riducono di molto. Come è noto, la fauna selvatica, per la sua grande mobilità, in teoria potrebbe essere presente in ogni habitat individuato sul territorio. L'habitat di predilezione riportato in tabella, indica le preferenze di ogni singola specie a frequentare quel determinato habitat, motivata soprattutto dalla presenza della nicchia

trofica o dalla nicchia riproduzione/rifugio. La percentuale riferita agli habitat faunistici riportata dal grafico, non si riferisce alla superficie interessata da quel determinato habitat, ma al numero delle specie faunistiche, riscontrate e riscontrabili in quella tipologia di habitat. Quasi tutte le specie presenti all'interno dell'Area di Studio frequentano più habitat. Spesso le condizioni ambientali della nicchia trofica, non coincidono con le esigenze ambientali della nicchia rifugio/riproduzione, riferito alle predilezione di ogni singola specie.

Status riproduttivo, all'interno dell'area di studio, delle specie faunistiche presenti e potenzialmente presenti


Parco Eolico Fenice Fauna Nidificante in area di studio		
<i>Nome Scientifico</i>	<i>Nome Italiano</i>	<i>Riproduzione</i>
<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere	N P
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Cannaiola	N P
<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro-piro piccolo	X
<i>Aegithalos caudatus</i>	Codibugnolo	N P
<i>Alauda arvensis</i>	Allodola	X
<i>Alburnus albidus</i>	Alborella	N C
<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	N P
<i>Anas clypeata</i>	Mestolone	X
<i>Anas crecca</i>	Alzavola	X
<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale	N P
<i>Anas querquedula</i>	Marzaiola	X
<i>Anser anser</i>	Oca selvatica	X
<i>Anthus pratensis</i>	Pispola	X
<i>Apodemus sylvaticus</i>	Topo campagnolo	N C
<i>Apus apus</i>	Rondone	N C
<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino	X
<i>Arvicola terrestris</i>	Arvicola Terrestre	N C
<i>Asio otus</i>	Gufo comune	N P
<i>Athene noctua</i>	Civetta	N C
<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastello comune	N C
<i>Bubulcus ibis</i>	Airone guardabuoi	X
<i>Bufo bufo</i>	Rospo comune	N C
<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	N C
<i>Burhinus oedicephalus</i>	Occhione	N P
<i>Buteo buteo</i>	Poiana	N C
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella	N P
<i>Canis lupus</i>	Lupo appenninico	N P
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	NP
<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino	N C
<i>Carduelis chloris</i>	Verdone	X
<i>Carduelis spinus</i>	Lucarino	X
<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume	NP
<i>Charadrius dubius</i>	Corriere piccolo	N P
<i>Chilodactylus niger</i>	Mignattino	X

<i>Ciconia Ciconia</i>	Cicogna bianca	X
<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	X
<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	X
<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	N P
<i>Cisticola juncidis</i>	Beccamoschino	N P
<i>Columba livia</i>	Piccione selvatico	N C
<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio	N C
<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	N C
<i>Corvus corone</i>	Cornacchia grigia	N C
<i>Corvus monedula</i>	Taccola	N C
<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia	N C
<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	N P
<i>Cyprinus carpio</i>	Carpa	N C
<i>Delichon urbica</i>	Balestruccio	N C
<i>Dendrocopos major</i>	Picchio rosso maggiore	N P
<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	X
<i>Elaphe quatorlineata</i>	Cervone	N C
<i>Emberiza cirrus</i>	Zigolo nero	N P
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Migliarino di palude	NP
<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine d'acqua	NP
<i>Eptesicus serotinus</i>	Serotino comune	N C
<i>Erinaceus europaeus</i>	Riccio	N C
<i>Erithacus rubecula</i>	Pettiroso	X
<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	X
<i>Falco naumanni</i>	Grillaio	N P
<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	N P
<i>Falco Subbuteo</i>	Lodolaio	X
<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio	N C
<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	X
<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello	N P
<i>Fulica atra</i>	Folaga	N P
<i>Galerida cristata</i>	Cappellaccia	N P
<i>Gallinago gallinago</i>	Beccaccino	X
<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua	N P
<i>Garrulous glandarius</i>	Ghiandaia	N C
<i>Grus grus</i>	Gru	X
<i>Hierophis viridiflavus</i>	Biacco	N C
<i>Hirundo rustica</i>	Rondine	N C
<i>Hypsugo savii</i>	Pipistrello di Savi	N C
<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	X

<i>Lacerta viridis</i>	Ramarro	N C
<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	N P
<i>Lanius minor</i>	Averla cenerina	N P
<i>Lanius senator</i>	Averla capirossa	N P
<i>Larus argentatus</i>	Gabbiano reale	X
<i>Larus ridibundus</i>	Gabbiano comune	X
<i>Lepus europaeus</i>	Lepre	N C
<i>Lissotriton italicus</i>	Tritone italico	NC
<i>Martes foina</i>	Faina	N C
<i>Melanocorypha calandra</i>	Calandra	N P
<i>Meles meles</i>	Tasso	N C
<i>Merops apiaster</i>	Gruccione	N P
<i>Miliaria calandra</i>	Strillozzo	N P
<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	N P
<i>Milvus milvus</i>	Nibbio reale	X
<i>Monticola solitarius</i>	Passero solitario	N P
<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca	X
<i>Motacilla flava</i>	Cutrettola	N P
<i>Mus domesticus</i>	Topo domestico	N C
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	N C
<i>Mustela nivalis</i>	Donnola	N C
<i>Natrix natrix</i>	Natrice dal collare	N C
<i>Natrix tassellata</i>	Biscia tassellata	N C
<i>Nyctalus noctula</i>	Nottola comune	N C
<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo	N P
<i>Otus scops</i>	Assiolo	N C
<i>Parus caeruleus</i>	Cinciarella	N C
<i>Parus major</i>	Cinciallegra	N P
<i>Passer domesticus</i>	Passera europea	N C
<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia	N C
<i>Perdix perdix</i>	Starna	NP
<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	N P
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Marangone	X
<i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano comune	N C
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Codiroso spazzacamino	N P
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codiroso	N C
<i>Phylloscopus collybita</i>	Luì piccolo	N P
<i>Pica pica</i>	Gazza	N C
<i>Picus viridis</i>	Picchio verde	N P
<i>Pipistrellus Kuhlii</i>	Pipistrello albolimbato	N C

<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato	X
<i>Podarcis sicula</i>	Lucertola campestre	N C
<i>Prunella modularis</i>	Passera scopaiaola	X
<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	N C
<i>Rana esculenta</i>	Rana verde italiana	N C
<i>Rattus norvegicus</i>	Ratto delle chiaviche	N C
<i>Regulus regulus</i>	Regolo	X
<i>Remiz pendulinus</i>	Pendolino	N P
<i>Rhinolophus ferruequinum</i>	Rinolofo maggiore	N C
<i>Saxicola rubetra</i>	Stiaccino	N P
<i>Saxicola torquata</i>	Saltimpalo	N C
<i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia	X
<i>Serinus serinus</i>	Verzellino	N C
<i>Sorex minutus</i>	Toporagno nano	N C
<i>Squalius squalus</i>	Cavedano	N C
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tortora dal collare orientale	N C
<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora comune	N C
<i>Strix aluco</i>	Allocco	N C
<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno	N P
<i>Sus scrofa</i>	Cinghiale	N C
<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera	N C
<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola	N P
<i>Sylvia melanocephala</i>	Occhiocotto	N P
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Tuffetto	X
<i>Talpa romana</i>	Talpa romana	N C
<i>Tarentula mauritanica</i>	Geco comune	N C
<i>Testudo hermanni</i>	Tartaruga di terra	N C
<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio	X
<i>Tringa ochropus</i>	Piro piro culbianco	X
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo	X
<i>Turdus iliacus</i>	Tordo sassello	X
<i>Turdus merula</i>	Merlo	N C
<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio	X
<i>Turdus pilaris</i>	Cesena	X
<i>Turdus viscivorus</i>	Tordela	N P
<i>Tyto alba</i>	Barbagianni	N C
<i>Upupa epops</i>	Upupa	N C
<i>Vanellus vanellus</i>	Pavoncella	X
<i>Vipera aspis</i>	Vipera comune	N C
<i>Vulpes vulpes</i>	Volpe	N C

Fauna Status riproduttivo		
Nidificante	n. specie	Percentuale
Nidificante certo	66	43%
Nidificante probabile	48	31%
Non nidificante	41	26%



Nb: i nidificanti certi e probabili, si riferiscono alle specie di tutte le classi, che si riproducono o potrebbero riprodursi all'interno dell'area di studio. La stima della nidificazione riguarda la riproduzione di ogni singola specie avvenuta anche in anni diversi da quelli censiti.

Il 43% dei nidificanti certi si riferisce a tutte le specie faunistiche che si riproducono all'interno dell'area di studio. L'alta percentuale di specie è giustificata dal fatto che le 70 specie che si riproducono sono costituite da:

- N. 3 specie di Pesci;
- N. 5 specie di Anfibi;
- N. 10 specie di rettili;
- N. 21 specie di mammiferi;
- N. 31 specie di uccelli su 114 specie coinvolte.

Parco Eolico Fenice

STATUS LEGALE DELLA FAUNA PRESENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI STUDIO

Alcune delle specie presenti godono di particolari protezioni dovute alla loro rarità o particolarità. Si riporta di seguito il tipo di protezione (Leggi e regolamenti comunitari, Leggi e regolamenti Nazionali, Leggi e regolamenti Regionali, convenzioni internazionali ed altro) di cui gode in generale la fauna.

Normative
157/92 art. 2
157/92
79/409 CEE ap. 1
79/409 CEE ap. 2/1
79/409 CEE ap. 2/II
79/409 CEE ap. 3/I
79/409 CEE ap. 3/II
Berna ap. 2
Berna ap. 3
Cites all. A
Cites all. B
Cites all. D
Bonn ap.1
Bonn ap. 2
Habitat ap. 2
Habitat ap. 4
Habitat ap. 5
Barcellona all. 2
Endemica
Checklist
Iucn

Normative	
157/92 art. 2	Specie protette dalla legge del 11 febbraio 1992, La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. Art.2 l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
157/92	Specie protette dalla legge del 11 febbraio 1992, La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale
79/409 CEE ap. 1	direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
79/409 CEE ap. 2/1	direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
79/409 CEE ap. 2/II	direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
79/409 CEE ap. 3/I	direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
79/409 CEE ap. 3/II	direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Berna ap. 2	Convenzione sulla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979
Berna ap. 3	Convenzione sulla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979
Cites all. A	Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, un accordo internazionale tra governi che entrò in vigore nel 1975. Il suo scopo è quello di garantire che nessuna specie di fauna o flora selvatiche divenga o sia soggetta ad uno sfruttamento insostenibile a causa del commercio internazionale.
Cites all. B	Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, un accordo internazionale tra governi che entrò in vigore nel 1975. Il suo scopo è quello di garantire che nessuna specie di fauna o flora selvatiche divenga o sia soggetta ad uno sfruttamento insostenibile a causa del commercio internazionale.
Cites all. D	Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, un accordo internazionale tra governi che entrò in vigore nel 1975. Il suo scopo è quello di garantire che nessuna specie di fauna o flora selvatiche divenga o sia soggetta ad uno sfruttamento insostenibile a causa del commercio internazionale.
Bonn ap.1	Allegato 1 convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica adottata a Bonn il 23 giugno 1979
Bonn ap. 2	allegato 2 convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica adottata a Bonn il 23 giugno 1979
Habitat ap. 2	Allegato 2 alla Direttiva 43/92/CEE "Habitat" denominato Specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.). Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997.
Habitat ap. 4	Allegato 4 alla Direttiva 43/92/CEE "Habitat" denominato Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997
Habitat ap. 5	Allegato 5 alla Direttiva 43/92/CEE "Habitat" denominato Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione. Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997.

Normative	
Barcellona all. 2	Allegato 2 alla Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento; adottata il 16 Febbraio 1976, e approvata con Decisione del Consiglio Europeo 25 luglio 1977, n. 77/585/CEE(G.U.C.E. 19 settembre 1977,n.L 240)
Endemica	specie il cui areale di distribuzione è rispettivamente limitato all'Italia o si estende anche ai territori vicini
Minacciate	Minacciate: specie minacciate tratte dalla CHECK LIST delle specie della fauna italiana, 1999. (M = minacciata; R = Rara)
IUCN	Categoria IUCN, di cui segue la decodifica dei suffissi principali.

Legende delle categorie IUCN		
<i>Sigla</i>	<i>Categoria in italiano</i>	<i>Categoria in inglese</i>
EX	Estinto	Extinct
EW	Estinto in natura	Extinct in the wild
CR	Gravemente minacciato	Critically endangered
EN	Minacciato	Endangered
VU	Vulnerabile	Vulnerable
LR	A minor rischio	Lower Risk
cd	Dipendenti dalla protezione	Conservation Dependent
nt	Quasi a rischio	Near Threatened
lc	A rischio relativo	Least Concern
DD	Dati insufficienti	Data Deficient
NE	Non valutato	Not Evaluated

Parco Eolico Fenice Status Legale Fauna Area di Studio																					
Specie	L. 157/92 art. 2	L. 157/92	79/409 CEE Ap.1	79/409 CEE Ap.2/I	79/409 CEE Ap.2/II	79/409 CEE Ap.3/I	79/409 CEE Ap.3/II	BERNA Ap.2	BERNA Ap.3	CITES All. A	CITES All. B	CITES All. D	BONN Ap.1	BONN Ap.2	HABITAT Ap.2	HABITAT Ap.4	HABITAT Ap.5	BARCELLONA all. 2	ENDEMICA	CHECKLIST	IUCN
Airone Cenerino		x							x												
Airone guardabuoi		x						x													
Albanella Minore	x		x						x	x				x							
Albanella reale	x		x						x	x				x							
Alborella									x						x				x	VU A1ace	
Allocco	x							x		x	x										
Allodola		x			x				x												
Alzavola				x			x		x					x							
Arvicola Terrestre																					
Assiolo	x							x		x	x										
Averla Capirossa		x						x													
Averla cenerina		x	x					x													
Averla piccola		x	x					x													
Balestruccio		x						x													
Ballerina Bianca		x						x													
Barbagianni	x							x		x	x										

Barbastello Comune		x						x						x	x	x					VU A2c
Beccaccia				x			x		x					x							
Beccaccino				x			x		x					x							
Beccamoschino		x						x													
Biacco								x									x				
Biscia tassellata								x									x				
Calandra		x	x					x													
Calandrella		x	x					x													
Cannaiola		x						x													
Capinera		x						x													
Cappellaccia		x							x												
Cardellino		x						x													
Carpa																					
Cavedano																					
Cervone								x							x	x					
Cesena					x				x												
Cicogna bianca	x		x					x						x							
Cinciallegre		x						x													
Cinciarella		x						x													
Cinghiale																					
Civetta	x							x		x	x										
Codibugnolo		x						x													
Codiroso		x						x													
Codiroso Spazzacamino		x						x													
Colombaccio				x		x															
Cornacchia Grigia																					

Corriere piccolo		x						x						x						
Cuculo		x							x											
Cutrettola		x						x												
Donnola		x							x											
Fagiano Comune				x		x			x											
Faina		x							x											
Falco Cuculo	x							x		x				x						
Falco Di Palude	x		x						x	x				x						
Falco Pecchiaiolo	x		x						x	x				x						
Falco pellegrino	x		x					x		x	x			x						
Folaga				x			x		x					x						
Fringuello		x							x											
Gabbiano Comune		x			x				x											
Gabbiano Reale		x			x				x											
Gallinella D'acqua					x				x											
Garzetta		x	x					x												
Gazza																				
Geco Comune																				
Germano Reale				x		x			x					x						
Gheppio	x							x		x				x						
Ghiandaia																				
Ghiandaia Marina	x		x					x						x						
Grillaio	x		x					x		x			x							VU A1ace
Gru	x		x					x		x				x						
Gruccione		x						x						x						
Gufo Comune	x							x		x	x									


Lepre																				
Lodolaio	x							x		x				x						
Lucarino		x						x												
Lucertola Campestre								x								x				
Luì piccolo		x						x												
Lupo appenninico	x							x		x	x				x	x			x	M
Marangone		x							x											
Martin pescatore		x	x					x												
Marzaiola				x					x					x						
Merlo					x				x											
Mestolone				x			x		x					x						
Migliarino di palude		x						x												
Mignattino		x	x					x												
Moscardino		x							x							x				LR/nt
Natrice Dal Collare									x											
Nibbio Bruno	x		x						x	x				x						
Nibbio reale	x		x						x	x				x						
Nottola Comune		x						x						x		x				
Oca selvatica		x		x			x		x					x						
Occhiocotto		x						x												
Occhione		x	x					x						x						
Passera Europea		x																		
Passera Mattugia		x							x											
Passera Scopaiola		x						x												
Passero Solitario		x						x												
Pavoncella					x				x					x						

Pendolino																				
Pettiroso		x						x												
Picchio Rosso Maggiore	x							x												
Picchio verde	x							x												
Piccione Selvatico		x		x					x											
Pipistrello albolimbato		x						x						x		x				
Pipistrello Di Savi		x						x						x		x				
Piro piro boschereccio		x	x					x						x						
Piro-piro culbianco		x						x						x						
Piro-piro piccolo		x							x					x						
Pispola		x						x												
Piviere dorato		x	x		x		x		x					x						
Poiana	x								x	x				x						
Quaglia					x				x					x						
Ramarro								x								x				
Rana agile																				
Rana Verde Italiana																				
Ratto Delle Chiaviche																				
Regolo		x						x												
Riccio		x							x											
Rigogolo		x						x												
Rinolofo Maggiore																				
Rondine		x						x												
Rondone		x						x												
Rospo Comune									x											
Rospo Smeraldino								x								x				

Saltimpalo		x					x												
Scricciolo		x					x												
Serotino Comune		x					x					x		x					
Smeriglio	x		x				x		x			x							
Sparviere	x							x	x			x							
Spatola	x		x				x		x			x							
Sterpazzola		x					x												
Stiaccino		x					x												
Storno		x																	
Strillozzo		x					x												
Succiapre		x	x				x												
Taccola		x																	
Talpa Romana																			
Tarabusino		x	x				x												
Tasso		x						x											
Testuggine Comune							x		x				x	x				M	LR/nt
Testuggine d'acqua							x						x	x					LR/nt
Topo Campagnolo																			
Topo Domestico																			
Toporagno Nano		x						x											
Tordela		x			x			x											
Tordo bottaccio					x			x											
Tordo sassello					x			x											
Tortora					x			x											
Tortora Dal Collare		x			x			x											
Tritone italico							x								x			x	

Tuffetto		x						x													
Upupa		x						x													
Usignolo		x						x													
Usignolo di fiume		x						x													
Verdone		x						x													
Verzellino		x						x													
Vipera comune									x												
Volpe																					
Zigolo Nero		x						x													

Normative di inserimento Specie Faunistiche		
<i>Normative di riferimento</i>	<i>n. specie</i>	<i>percentuale</i>
157/92 art. 2	26	7%
157/92	81	22%
79/409 CEE ap. 1	24	6%
79/409 CEE ap. 2/1	2	1%
79/409 CEE ap. 2/II	5	1%
79/409 CEE ap. 3/I	0	0%
79/409 CEE ap. 3/II	1	1%
Berna ap. 2	83	22%
Berna ap. 3	49	13%
Cites all. A	22	4%
Cites all. B	7	2%
Cites all. D	0	0%
Bonn ap.1	1	1%
Bonn ap. 2	38	10%
Habitat ap. 2	6	2%
Habitat ap. 4	16	4%
Habitat ap. 5	0	0%
Barcellona all. 2	0	0%
Endemica	3	1%
Checklist	2	1%
Iucn	6	2%



Percentuale di specie faunistiche inserite in ognuna delle normative comunitarie, nazionali e regionali

L'inserimento di una specie faunistica in una o più normative, indica il grado di protezione, maggiore o minore, che ogni singola specie beneficia. Maggiore sono le normative a tutela di una specie, maggiore è la rarità, la vulnerabilità, la criticità della stessa.

All'interno dell'area di progetto non sono state individuate specie vulnerabili, critiche o minacciate, tranne per qualche caso accidentale che si presenta occasionalmente.

STIMA DEGLI IMPATTI TRA OPERE DI PROGETTO E COMPONENTI

ECOSISTEMI – HABITAT - FLORA – FAUNA

Il Decreto Legislativo 152/2006 all'art. 5, punto 1, comma c, definisce l'impatto ambientale come *"l'alterazione qualitativa e/o quantitativa dell'ambiente (inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici) in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati, nonché della messa in esercizio delle relative attività."*

Stimare e valutare gli impatti sulle componenti ambientali, dovuti alle azioni di progetto di un parco eolico, è sempre complicato a causa delle complesse relazioni dei vari elementi ambientali presenti sul territorio, e della vastità dell'area di studio, oltre alla difficoltà di quantificare un impatto, come ad esempio la frammentazione o sottrazione di ecosistemi e habitat, o la previsione di quali e come saranno gli impatti su flora e fauna. Negli studi di impatto ambientale esiste l'esigenza di definire la stima degli impatti diretti ed indiretti, all'interno dell'area di cantiere e nell'area di studio. Inoltre valutare gli impatti in fase di cantiere, in fase di esercizio ed in fase di dismissione dell'opera. Si ha quindi una fase di previsione degli impatti potenzialmente significativi generati dalle opere di progetto, attraverso l'utilizzo delle risorse naturali e all'emissione di inquinanti.

Lo scopo principale di un SIA è quello di:

- Identificare le probabili interferenze tra opera ed ambiente;
- Stimare il grado di impatto su ogni componente ambientale, che la realizzazione dell'opera comporta.

La stima degli impatti deve considerare l'insieme delle modifiche apportate all'ambiente da un'attività o un'opera antropica. Qualsiasi cambiamento all'ambiente, sia negativo che positivo, derivante da attività. La stima degli impatti, di solito, viene calcolata in base alla tolleranza che una determinata specie floro-faunistica ha nei confronti della presenza dell'uomo, delle sue attività e delle azioni che compie in aree naturali, seminaturali e

antropiche. Tale tolleranza cambia certamente in base all'ambiente preso in considerazione, ed alla tipologia di progetto che si va ad insediare in quell'ambiente. Un ambiente completamente naturale, dove la presenza dell'uomo è scarsa, qualsiasi attività antropica svolta su quel territorio creerebbe un impatto maggiore, mentre un'attività svolta in ambiente antropizzato crea di solito impatti bassi o nulli, perché soprattutto la fauna è abituata da tempo alla presenza dell'uomo e delle sue attività.

Individuazione degli impatti potenziali sulla componente ambientale Ecosistema – Flora – Fauna e definizione della matrice di correlazione opera-ambiente

Tenendo conto della sensibilità ambientale complessiva del territorio e dell'area di studio (area di progetto e area vasta), sono stati individuati degli impatti potenziali con l'obiettivo di agevolare il riconoscimento delle interazioni opera-ambiente, che l'insieme delle attività connesse alle fasi di realizzazione e di esercizio dell'opera, possono determinare sulla componente faunistica in particolare. E sulle componenti ambientali ecosistemi – habitat – flora.

In particolare le interazioni tra componenti ambientali e opere ed azioni di progetto possono essere di tre tipi:

- quelle di carattere temporaneo, dovuti alle attività riguardanti esclusivamente la fase di realizzazione delle opere (fase di cantiere);
- quelle di carattere definitivo, dovuti al funzionamento dell'infrastruttura e delle opere che lo compongono, (fase di esercizio);
- quelle di carattere temporaneo, dovuti alle attività riguardanti esclusivamente la fase di smantellamento delle opere (fase di dismissione).

I rischi ambientali dell'opera, in relazione alla tutela delle specie floro-faunistiche, sono soprattutto quelli legati al disturbo in fase di cantiere e dismissione. Al termine di questa fase, si ristabiliranno nuovi equilibri tra flora, fauna e territorio. Durante la fase di esercizio si stima un rischio di interferenza, tra tipologia di progetto e flora e fauna molto basso, in considerazione soprattutto delle specie individuate sul territorio, e della loro presenza stabile.

La valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto, è stata effettuata con l'individuazione preliminare degli impatti potenziali. Essi sono riconducibili ai seguenti elementi:

- *Perdita di habitat;*


- *Frammentazione di habitat;*
- *Disturbo a specie faunistiche sensibili;*
- *Mortalità da collisione;*

Perdita di habitat - La perdita di habitat nell'area d'intervento interessa soltanto l'area agricola, infatti le aree di impianto delle turbine e delle opere accessorie, insistono su terreni agricoli (seminativi). L'impatto sulle aree coltivate è trascurabile visto che i terreni limitrofi sono anch'essi condotti prevalentemente a seminativi.

Frammentazione di habitat - L'habitat agricolo viene interessato dalla frammentazione perché al suo interno vengono realizzati, oltre a quelli già esistenti, nuovi stradelli di collegamento di servizio tra le torri ed altre strutture di progetto.

Disturbo a specie faunistiche sensibili - Nell'area d'intervento non sono state individuate specie rare o sensibili, fatta eccezione per qualche specie di transito durante i periodi di erratismo, o accidentale.

Mortalità da collisione – la probabilità di collisione tra tipologia di progetto e fauna è scarsa. L'altezza di rotazione delle pale, la limitata presenza di specie avifaunistiche, la presenza di alcune specie per un periodo limitato dell'anno sul territorio, ed altro, riducono di molto la probabilità di interferenza tra opera e fauna. Maggiore rischio di impatto per alcuni rapaci in perlustrazione per la caccia, ed alcune specie durante i voli di trasferimento da un habitat all'altro durante la dispersione e l'erratismo sul territorio.



Nota bibliografica su mortalità per collisione dell'avifauna contro strutture in elevazione

Fonte: ANEV

Fauna - Causa di morte per collisione		
Tipologia infrastruttura	Media Stime n. uccelli morti	Percentuale
Veicoli	60-80 milioni	15-30%
Palazzi e finestre	98-890 milioni	50-60%
Linee elettriche	Decine di migliaia-174 milioni	15-20%
Torri di comunicazione	4-50 milioni	2-5%
Impianti eolici	10.000-40.000	0,01-0,02%

AZIONI DI PROGETTO

L'analisi degli effetti "attesi" a seguito della realizzazione dell'opera di progetto è stata effettuata con riferimento alle azioni desumibili dagli elaborati progettuali. Tali azioni possono infatti interferire sia con l'assetto fisico che con quello biologico dall'area di studio: gli interventi temporanei, come per esempio l'installazione di un'area di cantiere provocano, in primis, asportazione del suolo, diminuzione di superfici agricole. Si rende quindi indispensabile l'individuazione delle azioni di progetto da considerare, e che, in buona approssimazione, sono indicate nella tabella di seguito riportata. In tale tabella vengono esplicitate le azioni relative alle diverse fasi di realizzazione e di messa in esercizio dell'area, evidenziandone le attività corrispondenti che, in diversa misura, possono essere generatrici di impatti.

FASE DI CANTIERE E DI DISMISSIONE

Durante la fase di cantiere e di dismissione (smantellamento dell'impianto) l'area di intervento, per motivi pratici, è interessata da maggiori superfici sulla quale operare, aree di risulta temporanei, aree per parcheggio automezzi ed attrezzature varie, deposito materiali ecc... Terminata la fase di cantiere sull'intera area, occupata temporaneamente dalla cantierizzazione dell'opera, ritornerà lentamente la vegetazione naturale/sinantropica esistente prima della realizzazione dell'opera che si riapproprierà di tutte le aree, vecchie e nuove, lasciate incolte. La fauna, dopo l'allontanamento di alcuni individui delle specie presenti nella stretta area di intervento, causato dalla suddetta fase, ritornerà ad occupare tutta l'area interessata dal parco eolico, con l'aumento di alcune specie, quelle meno sensibili, che approfitteranno dell'aumento della superficie di aree ad incolto ottenuto tramite gli interventi di compensazione.

FASE DI ESERCIZIO

Durante la fase di esercizio, una volta ristabiliti gli equilibri tra componenti ambientali e territorio, si stimano impatti bassi o nulli sulle componenti trattate, soltanto lievi disturbi indiretti per la fauna presente, e qualche probabile impatto diretto con alcune specie faunistiche (rapaci).

Azioni di Progetto	
<i>Fasi</i>	<i>Attività</i>
<i>1) Impianto del Cantiere</i>	- Occupazione temporanea di suolo - Movimenti di terra - Trattamento dei terreni
<i>2) Utilizzo di Risorse Naturali</i>	- Approvvigionamento idrico da corpo idrico - Approvvigionamento di inerti - Eventuale riutilizzo dei materiali di sbancamento
<i>3) Realizzazione delle Opere</i>	- Depositi di materiali - Discariche dei materiali di risulta - Realizzazione viabilità interna al cantiere - Sistemazioni a verde - Viabilità di collegamento tra le torri
<i>4) Interventi di Recupero</i>	- Reimpianti vegetazionali di flora erbacea, arbustiva ed arborea - Rinaturalizzazione di aree degradate all'interno dell'area di progetto
<i>5) Chiusura Lavori (dismissione impianto)</i>	- Smantellamento cantiere e ripristini vari - rinaturalizzazione dell'area di cantiere
<i>6) Esercizio e Gestione</i>	- Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto eolico - Monitoraggio e controllo del funzionamento degli aerogeneratori

Legenda grado di impatto del Parco Eolico sulle componenti ambientali trattate.

Il valore riportato nelle tabelle è stato calcolato in base alla presenza e alle caratteristiche ambientali degli ecosistemi ed habitat interessati dai lavori di progetto; sulla presenza e capacità di resilienza delle singole specie floristiche presenti all'interno dell'area di impianto e di studio, e dal comportamento delle varie specie faunistiche individuate all'interno dell'area di studio.

Gli indicatori utilizzati sono stati:

- *La presenza della specie all'interno dell'area di intervento;*
- *La presenza della specie all'interno dell'area di studio;*
- *La presenza della specie sul territorio;*
- *La densità di popolazione di ogni singola specie;*
- *Se la specie è migratrice regolare, migratrice parziale o stanziale;*
- *Se la specie è comune, frequente, rara oppure accidentale;*
- *La capacità della specie faunistica di ricolonizzare l'area di intervento;*
- *La capacità di resilienza delle specie floristiche;*
- *La familiarità di alcune specie faunistiche con la presenza dell'uomo e delle sue attività;*
- *la presenza di siti di riproduzione all'interno dell'area di progetto;*
- *la presenza di eventuali corridoi ecologici all'interno dell'area di studio;*
- *l'interferenza delle opere di progetto con le rotte migratorie;*

<i>Legenda</i>	
<i>Grado di impatto</i>	<i>Significato</i>
<i>Impatto alto</i>	<i>Si intende quando, a causa delle azioni delle tre fasi principali dell'impianto, indispensabili per il funzionamento di un parco eolico, le specie coinvolte, interessate direttamente ed indirettamente, scompaiono definitivamente dall'area di studio.</i>
<i>Impatto medio</i>	<i>Si intende quando, a causa delle azioni delle tre fasi principali dell'impianto, indispensabili per il funzionamento di un parco eolico, le specie coinvolte, interessate direttamente ed indirettamente, si allontanano temporaneamente dall'area di studio. Ritornando successivamente, dopo il nuovo riassetto di quel territorio, a rioccupare quegli stessi spazi.</i>
<i>Impatto basso</i>	<i>Si intende quando, a causa delle azioni delle tre fasi principali dell'impianto, indispensabili per il funzionamento di un parco eolico, le specie coinvolte, interessate direttamente ed indirettamente, si spostano temporaneamente negli stessi habitat limitrofi all'area di intervento, per ritornare successivamente ad occupare gli stessi spazi. Riguarda soprattutto le specie faunistiche sinantropiche, quelle abituate da tempo alla presenza dell'uomo e delle sue attività.</i>

Impatto nullo	<i>Si intende quando, a causa delle azioni delle tre fasi principali dell'impianto, indispensabili per il funzionamento di un parco eolico, le specie coinvolte, interessate direttamente ed indirettamente, si spostano a margine dell'area di cantiere soltanto durante i lavori, per poi ritornare, all'interno dell'area anche durante i periodi di sospensione dei lavori, oppure rimangono all'interno dell'area di cantiere limitandosi a restare lontano dai mezzi meccanici. Riguarda soprattutto le specie faunistiche sinantropiche, quelle abituate da tempo alla presenza dell'uomo e delle sue attività.</i>

Parco Eolico Fenice

Si riporta di seguito tabella di sintesi degli impatti tra tipologia di progetto e classi faunistiche (ricettori sensibili)

Sintesi degli Impatti tra tipologia di progetto e Componente Faunistica presente all'interno dell'Area Di Studio				
	Tipologia di progetto			
	Piazzole	Torri	Pale	Stradelli di servizio
Ricettori	Popolamenti di anfibi, rettili, uccelli e mammiferi	Popolamenti di anfibi, rettili, uccelli e mammiferi	Popolamenti di uccelli e mammiferi (chiroterri)	Popolamenti di anfibi, rettili e mammiferi
Impatto atteso	Sostituzione di Habitat; riduzione di Habitat agricolo; incremento di Habitat pratio-erbaceo; riduzione di nicchia trofica per uccelli granivori e roditori, aumento di nicchia trofica e di rifugio per anfibi, rettili, uccelli (tranne passeriformi granivori) mammiferi.	Interferenza irrilevante con gli spostamenti di anfibi, rettili, uccelli e mammiferi	Possibilità remota di collisione, durante la rotazione, con avifauna e chiroterri in volo.. Nell'area in esame la scarsa presenza di avifauna limita maggiormente tale possibilità. Si precisa, comunque che, l'altezza minima di rotazione delle pale, cioè la distanza tra la punta dell'ala e la superficie del suolo è di 50/60 metri, ben al di sopra dell'altezza di volo della maggior parte dell'avifauna e chiroterri individuati sul territorio.	Nell'area in esame già esistono numerosi stradelli di servizio che collegano le varie colture agricole praticate. Lieve diminuzione e frammentazione di habitat agricolo.
Stima impatto	Basso	Nulla	Medio	Basso

Interventi di mitigazione	<i>Copertura di vegetazione spontanea (Prato-pascolo, dove possibile) sulla base di cemento.</i>	<i>XXX</i>	<i>Dipingere di nero una pala</i>	<i>Fasce di vegetazione arbustiva erbacea ai margini degli stradelli.</i>
Interventi di compensazione	<i>Rinaturalizzazione di aree degradate. Piantumazione di alberature e siepi a margine delle aree coltivate e negli alvei degradati dei torrenti e canali presenti sul territorio. L'impianto di specie arboree ed arbustive con frutti e bacche al fine di aumentare la disponibilità alimentare dell'intera area, costituirà una fitta rete di corridoi ecologici che garantiranno spostamenti sicuri alla fauna presente, oltre ad allontanarla dalle infrastrutture di progetto.</i>	<i>Rinaturalizzazione di aree degradate. Piantumazione di alberature e siepi a margine delle aree coltivate e negli alvei degradati dei torrenti e canali presenti sul territorio. L'impianto di specie arboree ed arbustive con frutti e bacche al fine di aumentare la disponibilità alimentare dell'intera area, costituirà una fitta rete di corridoi ecologici che garantiranno spostamenti sicuri alla fauna presente, oltre ad allontanarla dalle infrastrutture di progetto.</i>	<i>Rinaturalizzazione di aree degradate. Piantumazione di alberature e siepi a margine delle aree coltivate e negli alvei degradati dei torrenti e canali presenti sul territorio. L'impianto di specie arboree ed arbustive con frutti e bacche al fine di aumentare la disponibilità alimentare dell'intera area, costituirà una fitta rete di corridoi ecologici che garantiranno spostamenti sicuri alla fauna presente, oltre ad allontanarla dalle infrastrutture di progetto.</i>	<i>Rinaturalizzazione di aree degradate. Piantumazione di alberature e siepi a margine delle aree coltivate e negli alvei degradati dei torrenti e canali presenti sul territorio. L'impianto di specie arboree ed arbustive con frutti e bacche al fine di aumentare la disponibilità alimentare dell'intera area, costituirà una fitta rete di corridoi ecologici che garantiranno spostamenti sicuri alla fauna presente, oltre ad allontanarla dalle infrastrutture di progetto.</i>

La realizzazione dell'infrastruttura comporta, comunque, anche impatti positivi. Gli interventi di compensazione, contribuiranno a ricreare, attraverso intervento di ripristino e ricuciture ambientali, un miglioramento stabile dell'ambiente coinvolto, garantendo soprattutto alla fauna una migliore qualità ambientale e maggiore disponibilità alimentare.

STIMA IN DETTAGLIO, DEGLI IMPATTI DIRETTI ED INDIRETTI, VALUTATA PER OGNI SINGOLA COMPONENTE PER LA FASE DI CANTIERE, DI ESERCIZIO E DI DISMISSIONE.

ECOSISTEMI

Gli ecosistemi (macchie ecosistemiche) presi in considerazione per la valutazione degli impatti tra opere di progetto e componente ecosistema, sono stati definiti in base alle loro caratteristiche ambientali e naturalistiche delle quali sono costituiti. Anche se alcuni ecosistemi sono di piccole dimensioni oppure frammentati (ecosistemi naturali e naturaliformi), sono stati presi comunque in considerazione.


Per le macchie ecosistemiche riscontrate in area di studio, sono stati stimati gli impatti diretti ed indiretti in fase cantiere, fase di esercizio e fase di dismissione.

Gli macchie ecosistemiche riscontrate all'interno dell'area di studio sono:

- **Ecosistema Agricolo**
- **Ecosistema Prativo-Erbaceo**
- **Ecosistema Igrofilo-Palustre**
- **Ecosistema Forestale (Boschi/Macchia Mediterranea)**
- **Ecosistema Antropico**


Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Ecosistemi e opere di progetto Fase di CANTIERE					
Ecosistemi	Stima degli impatti DIRETTI				Note
	Alto	Medio	Basso	Nulla	
<i>Ecosistema Agricolo</i>		X			Impatto diretto medio, l'ecosistema è direttamente interessato dall'opera. Sottrazione e frammentazione di aree agricole (seminativi)
<i>Ecosistema Prativo-Erbaceo</i>			X		Basso impatto diretto. Probabile piccola sottrazione o frammentazione di superfici prative. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema.
<i>Ecosistema Igrofilo-Palustre</i>				X	Nessun impatto diretto. Nessuna sottrazione o frammentazione di superfici prative. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema
<i>Ecosistema Forestale</i>				X	Nessun impatto diretto. Nessuna sottrazione o frammentazione di superfici prative. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema
<i>Ecosistema Antropico</i>				X	Nessun impatto diretto. Nessuna sottrazione o frammentazione di superfici prative. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema

Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Ecosistemi e opere di progetto Fase di cantiere Impatti diretti		
Grado Di Impatto	N. Specie	Percentuale
Alto	0	0%
Medio	1	20%
Basso	1	20%
Nulla	3	60%




Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Ecosistemi e opere di progetto Fase di CANTIERE					
Ecosistemi	Stima degli impatti IN DIRETTI				Note
	Alto	Medio	Basso	Nulla	
<i>Ecosistema Agricolo</i>		X			Impatto indiretto medio, l'ecosistema è direttamente interessato dall'opera. L'ecosistema viene perturbato anche indirettamente dalle azioni di cantiere.
<i>Ecosistema Prativo-Erbaceo</i>			X		Basso impatto indiretto. Eventuali micropolveri trasportati dal vento. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema.
<i>Ecosistema Igrofilo-Palustre</i>			X		Basso impatto indiretto. Eventuali microinquinanti portati dall'acqua piovana. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema
<i>Ecosistema Forestale</i>				X	Nessun impatto indiretto. Nessuna interferenza con le superfici forestali. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema
<i>Ecosistema Antropico</i>				X	Nessun impatto indiretto. Nessuna interferenza con le superfici antropiche. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema

Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Ecosistemi e opere di progetto Fase di cantiere Impatti indiretti		
Grado Di Impatto	N. Specie	Percentuale
Alto	0	0%
Medio	1	1%
Basso	2	40%
Nulla	2	40%




Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Ecosistemi e opere di progetto Fase di ESERCIZIO					
Ecosistemi	Stima degli impatti DIRETTI				Note
	Alto	Medio	Basso	Nulla	
<i>Ecosistema Agricolo</i>			X		Basso impatto diretto, presenza saltuaria di mezzi per manutenzione
<i>Ecosistema Prativo-Erbaceo</i>				X	Nessun impatto diretto. Nessuna sottrazione o frammentazione di superfici prative. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema.
<i>Ecosistema Igrofilo/Palustre</i>				X	Nessun impatto diretto. Nessuna sottrazione o frammentazione di superfici igrofilo-palustre. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema
<i>Ecosistema Forestale</i>				X	Nessun impatto diretto. Nessuna sottrazione o frammentazione di superfici forestali. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema
<i>Ecosistema Antropico</i>				X	Nessun impatto diretto. Nessuna sottrazione o frammentazione di superfici antropiche. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema

Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Ecosistemi e opere di progetto Fase di Esercizio Impatti diretti		
Grado Di Impatto	N. Specie	Percentuale
Alto	0	0%
Medio	0	0%
Basso	1	20%
Nulla	4	80%



Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Ecosistemi e opere di progetto Fase di ESERCIZIO					
Ecosistemi	Stima degli impatti INDIRETTI				Note
	Alto	Medio	Basso	Nulla	
<i>Ecosistema Agricolo</i>			X		Basso impatto indiretto, presenza saltuaria di mezzi per manutenzione
<i>Ecosistema Prativo-Erbaceo</i>			X		Basso impatto indiretto, presenza saltuaria di mezzi per manutenzione
<i>Ecosistema Igrofilo/Palustre</i>				X	Nessun impatto indiretto. Nessuna interferenza con le superfici igrofilo-palustri. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema
<i>Ecosistema Forestale</i>				X	Nessun impatto indiretto. Interferenza con le superfici forestali. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema
<i>Ecosistema Antropico</i>				X	Nessun impatto indiretto. Nessuna interferenza con le superfici antropiche. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema

Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Ecosistemi e opere di progetto Fase di Esercizio Impatti indiretti		
Grado Di Impatto	N. Specie	Percentuale
Alto	0	0%
Medio	0	0%
Basso	2	40%
Nulla	3	60%



Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Ecosistemi e opere di progetto Fase di DISMISSIONE					
Ecosistemi	Stima degli impatti DIRETTI				Note
	Alto	Medio	Basso	Nulla	
<i>Ecosistema Agricolo</i>		X			Impatto diretto medio, l'ecosistema è direttamente interessato dall'opera. Sottrazione e frammentazione di aree agricole (seminativi)
<i>Ecosistema Prativo-Erbaceo</i>			X		Basso impatto diretto. Probabile piccola sottrazione o frammentazione di superfici prative. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema.
<i>Ecosistema Igrofilo/Palustre</i>				X	Nessun impatto diretto. Nessuna sottrazione o frammentazione di superfici prative. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema
<i>Ecosistema Forestale</i>				X	Nessun impatto diretto. Nessuna sottrazione o frammentazione di superfici prative. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema
<i>Ecosistema Antropico</i>				X	Nessun impatto diretto. Nessuna sottrazione o frammentazione di superfici prative. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema

Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Ecosistemi e opere di progetto Fase di Dismissione Impatti diretti		
Grado Di Impatto	N. Specie	Percentuale
Alto	0	0%
Medio	1	20%
Basso	1	0%
Nulla	3	80%



Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Ecosistemi e opere di progetto Fase di DISMISSIONE					
Ecosistemi	Stima degli impatti INDIRETTI				Note
	Alto	Medio	Basso	Nulla	
<i>Ecosistema Agricolo</i>		X			Impatto indiretto medio, l'ecosistema è direttamente interessato dall'opera. L'ecosistema viene perturbato anche indirettamente dalle azioni di cantiere.
<i>Ecosistema Prativo-Erbaceo</i>			X		Basso impatto indiretto. Eventuali micropolveri trasportati dal vento. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema.
<i>Ecosistema Igrofilo/Palustre</i>			X		Basso impatto indiretto. Eventuali microinquinanti portati dall'acqua piovana. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema
<i>Ecosistema Forestale</i>				X	Nessun impatto indiretto. Nessuna interferenza con le superfici forestali. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema
<i>Ecosistema Antropico</i>				X	Nessun impatto indiretto. Nessuna interferenza con le superfici antropiche. L'area di progetto è situata fuori dall'ecosistema

Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Ecosistemi e opere di progetto Fase di Dismissione Impatti indiretti		
<i>Grado Di Impatto</i>	<i>N. Specie</i>	<i>Percentuale</i>
Alto	0	0%
Medio	1	20%
Basso	2	40%
Nulla	2	40%



Parco Eolico Fenice
Considerazioni complessive sugli Ecosistemi individuati all'interno dell'area di studio

Gli impatti stimati per gli ecosistemi (macchie ecosistemiche) all'interno dell'area di studio, riguardano quasi esclusivamente gli impatti diretti arrecati all'ecosistema agricolo attraverso la sottrazione e frammentazione della macchia ecosistemica.

HABITAT

Gli habitat presi in considerazione per la valutazione degli impatti tra opere ed azioni di progetto e componente habitat, sono stati definiti in base alle loro caratteristiche ambientali e naturalistiche delle quali sono costituiti. Anche se alcuni habitat sono di piccole dimensioni oppure frammentati (habitat naturali e naturaliformi), sono stati presi comunque in considerazione. Inoltre sono stati definiti soprattutto in funzione del loro rapporto con la fauna.


Per gli habitat riscontrati in area di studio sono stati stimati gli impatti diretti ed indiretti in fase cantiere, fase di esercizio e fase di dismissione

Gli habitat riscontrati all'interno dell'area di studio sono:

- **Seminativi e colture arboree ed arbustive**
- **Flora erbacea ed arbustiva**
- **Canneto e vegetazione palustre**
- **Boschi-Macchia Mediterranea**
- **Edificati (urbani e rurali)**


Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Habitat e opere di progetto Fase di CANTIERE					
Habitat	Stima degli impatti DIRETTI				Note
	Alto	Medio	Basso	Nulla	
<i>Seminativi e colture arboree ed arbustive</i>		X			Impatto diretto medio. L'habitat è direttamente interessato dall'opera. Sottrazione e frammentazione.
<i>Flora erbacea ed arbustiva,</i>			X		Impatto basso. Probabile piccola sottrazione o frammentazione di habitat. L'area di progetto è situata fuori habitat.
<i>Canneto e vegetazione palustre</i>				X	Nessun impatto diretto. Nessuna sottrazione o frammentazione di habitat. L'area di progetto è situata fuori habitat.
<i>Boschi-Macchia Mediterranea</i>				X	Nessun impatto diretto. Nessuna sottrazione o frammentazione di habitat. L'area di progetto è situata fuori habitat.
<i>Edificati (urbani e rurali)</i>				X	Nessun impatto diretto. Nessuna sottrazione o frammentazione di habitat. L'area di progetto è situata fuori habitat.

Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Habitat e opere di progetto Fase di Cantiere Impatti diretti		
Grado Di Impatto	N. Specie	Percentuale
Alto	0	0%
Medio	1	20%
Basso	1	20%
Nulla	3	60%



Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Habitat e opere di progetto Fase di CANTIERE					
Habitat	Stima degli impatti INDIRETTI				Note
	Alto	Medio	Basso	Nulla	
<i>Seminativi e colture arboree ed arbustive</i>		X			Impatto indiretto medio, l'Habitat è direttamente interessato dall'opera. L'habitat viene perturbato anche indirettamente dalle azioni di cantiere.
<i>Flora erbacea ed arbustiva,</i>			X		Basso impatto indiretto. Eventuali micropolveri trasportati dal vento. L'area di progetto è situata fuori dall'habitat.
<i>Canneto e vegetazione palustre</i>			X		Impatto indiretto basso. Nessuna sottrazione o frammentazione di habitat. L'area di progetto è situata fuori habitat. Lieve probabilità di. eventuali micropolveri trasportati dal vento o dall'acqua
<i>Boschi-Macchia Mediterranea</i>			X		Basso impatto indiretto. Eventuali micropolveri trasportati dal vento. L'area di progetto è situata fuori dall'habitat.
<i>Edificati (urbani e rurali)</i>				X	Nessun impatto indiretto. Nessuna sottrazione o frammentazione di habitat. L'area di progetto è situata fuori habitat.

Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Habitat e opere di progetto Fase di Cantiere Impatti indiretti		
Grado Di Impatto	N. Specie	Percentuale
Alto	0	0%
Medio	1	20%
Basso	3	60%
Nulla	1	20%



Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Habitat e opere di progetto Fase di ESERCIZIO					
habitat	Stima degli impatti DIRETTI				Note
	Alto	Medio	Basso	Nulla	
<i>Seminativi e colture arboree ed arbustive</i>			X		Basso impatto diretto, presenza saltuaria di mezzi per manutenzione
<i>Flora erbacea ed arbustiva,</i>				X	Nessun impatto diretto. Nessuna interferenza tra attività di progetto ed habitat. L'area di progetto è situata fuori habitat.
<i>Canneto e vegetazione palustre</i>				X	Nessun impatto diretto. Nessuna interferenza tra attività di progetto ed habitat. L'area di progetto è situata fuori habitat.
<i>Boschi-Macchia Mediterranea</i>				X	Nessun impatto diretto. Nessuna interferenza tra attività di progetto ed habitat. L'area di progetto è situata fuori habitat.
<i>Edificati (urbani e rurali)</i>				X	Nessun impatto diretto. Nessuna interferenza tra attività di progetto ed habitat. L'area di progetto è situata fuori habitat.

Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Habitat e opere di progetto Fase di Esercizio Impatti diretti		
Grado Di Impatto	N. Specie	Percentuale
Alto	0	0%
Medio	0	0%
Basso	1	20%
Nulla	4	80%



Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Habitat e opere di progetto Fase di ESERCIZIO					
Habitat	Stima degli impatti INDIRETTI				Note
	Alto	Medio	Basso	Nulla	
<i>Seminativi e colture arboree ed arbustive</i>			X		Basso impatto indiretto, presenza saltuaria di mezzi per manutenzione
<i>Flora erbacea ed arbustiva,</i>			X		Basso impatto indiretto, presenza saltuaria di mezzi per manutenzione
<i>Canneto e vegetazione palustre</i>				X	Nessun impatto indiretto. Nessuna interferenza tra attività di progetto ed habitat. L'area di progetto è situata fuori habitat.
<i>Boschi-Macchia Mediterranea</i>				X	Nessun impatto indiretto. Nessuna interferenza tra attività di progetto ed habitat. L'area di progetto è situata fuori habitat.
<i>Edificati (urbani e rurali)</i>				X	Nessun impatto indiretto. Nessuna interferenza tra attività di progetto ed habitat. L'area di progetto è situata fuori habitat.

Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Habitat e opere di progetto Fase di Esercizio Impatti indiretti		
Grado Di Impatto	N. Specie	Percentuale
Alto	0	0%
Medio	0	0%
Basso	2	40%
Nulla	3	60%



Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Habitat e opere di progetto Fase di DISMISSIONE					
Habitat	Stima degli impatti DIRETTI				Note
	Alto	Medio	Basso	Nulla	
<i>Seminativi e colture arboree ed arbustive</i>		X			Impatto diretto medio, l'habitat è direttamente interessato dall'opera
<i>Flora erbacea ed arbustiva,</i>			X		Impatto basso. Probabile piccola sottrazione o frammentazione di habitat. L'area di progetto è situata fuori habitat.
<i>Canneto e vegetazione palustre</i>				X	Nessun impatto diretto. Nessuna sottrazione o frammentazione di habitat. L'area di progetto è situata fuori habitat.
<i>Boschi-Macchia Mediterranea</i>				X	Nessun impatto diretto. Nessuna sottrazione o frammentazione di habitat. L'area di progetto è situata fuori habitat.
<i>Edificati (urbani e rurali)</i>				X	Nessun impatto diretto. Nessuna sottrazione o frammentazione di habitat. L'area di progetto è situata fuori habitat.

Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Habitat e opere di progetto Fase di Dismissione Impatti diretti		
Grado Di Impatto	N. Specie	Percentuale
Alto	0	0%
Medio	1	20%
Basso	1	20%
Nulla	3	60%



Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Habitat e opere di progetto Fase di DISMISSIONE					
Habitat	Stima degli impatti INDIRETTI				Note
	Alto	Medio	Basso	Nulla	
<i>Seminativi e colture arboree ed arbustive</i>		X			Impatto indiretto medio, l'Habitat è direttamente interessato dall'opera
<i>Flora erbacea ed arbustiva,</i>			X		Basso impatto indiretto. Eventuali micropolveri trasportati dal vento. L'area di progetto è situata fuori dall'habitat.
<i>Canneto e vegetazione palustre</i>			X		Impatto indiretto basso . Nessuna sottrazione o frammentazione di habitat. L'area di progetto è situata fuori habitat. Lieve probabilità di. eventuali micropolveri trasportati dal vento o dall'acqua
<i>Boschi-Macchia Mediterranea</i>			X		Basso impatto indiretto. Eventuali micropolveri trasportati dal vento. L'area di progetto è situata fuori dall'habitat.
<i>Edificati (urbani e rurali)</i>				X	Nessun impatto indiretto. Nessuna interferenza tra attività di progetto ed habitat. L'area di progetto è situata fuori habitat.

Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Habitat e opere di progetto Fase di Dismissione Impatti indiretti		
Grado Di Impatto	N. Specie	Percentuale
Alto	0	0%
Medio	1	20%
Basso	3	60%
Nulla	1	20%



CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SUGLI HABITAT INDIVIDUATI ALL'INTERNO DELL'AREA DI STUDIO

Gli impatti stimati per gli habitat presenti all'interno dell'area di studio, riguardano quasi esclusivamente gli impatti diretti arrecati all'habitat seminativi e colture arboree ed arbustive, in particolare ai seminativi di cereali a rotazione, e colture orticole, attraverso la sottrazione e frammentazione dell'habitat.

FLORA

La flora presa in considerazione per la valutazione degli impatti tra opere ed azioni di progetto e componente flora, è stata quella individuata durante i vari sopralluoghi effettuati sul campo, e quella potenzialmente presente, perché riscontrata negli stessi tipi di ecosistemi presenti sul territorio, anche al di fuori dell'area di studio. Inoltre sono state valutate anche quelle specie presenti con numero ridotto di esemplari.

La stima degli impatti sulla flora è stata valutata sulle specie floristiche riscontrate sul campo, all'interno dell'area di progetto, di studio, e quelle potenziali.

Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Flora e opere di progetto FASE DI CANTIERE						
Flora	Stima degli impatti DIRETTI				Habitat	Note
	Alto	Medio	Basso	Nulla		
Acero Campestre				X	boschi meso-termofili	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Acero Minore				X	boschi termomesofili di latifoglie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Aglione Delle Bische				X	pendii rocciosi, terreni aridi, incolti e vigneti.	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Aglione Italiano				X	macchie e i prati aridi	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Aglione Maggiore				X	boschi e ambienti umidi ombrosi, alla base di rupi ombrose e a volte ai margini di strade	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Aglione Pelosetto				X	macchie e cespuglieti. habitat di predilezione fuori dall'area di intervento	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Ailanto			X		lungo i bordi delle strade, in ambiente urbano, in prossimità dei fiumi e ai margini del bosco, specie alloctona	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area

						di impianto
Alaterno				X	macchia mediterranea e garighe.	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Amaranto Bianco				X	incolti, macerie, ruderi, greti fluviali	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Amaranto Comune			X		orti coltivazioni incolti	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Ambretta Annuale				X	prati e pendii piuttosto magri, oppure sui margini dei sentieri.	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Ambretta Comune				X	Prati e pascoli, bordi dei sentieri, zone incolte	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Anemone Fior-Stella			X		radure e prati asciutti.	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Arabetta Irsuta				X	terreni asciutti, poveri, nei prati aridi, negli ambienti rupestri e sui vecchi muri	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Arisaro Comune				X	luoghi a mezz'ombra, luoghi ombrosi, boschi a quote comprese tra i 0-800 metri sul livello del mare.	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Aristolochia Rotonda				X	campi incolti, prati e boscaglie.	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Arrestabue			X		prati aridi, nei luoghi sassosi,	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Asfodelo Fistoloso			X		terreno con vegetazione rada, prati aridi e pascoli	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Asfodelo			X		incolti garighe pascoli aridi terreni sassosi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di

Mediterraneo						mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Asparago				X	macchie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Asplenio				X	boschi e rupi ombrose fino oltre 2000 metri.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Aspraggine			X		incolti aridi o umidi, ruderi, aree antropizzate, bordi di strade	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Assenzio Selvatico			X		prati stabili siepi e cespugli	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Asterisco				X	distese fangose	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Astralago Rosato				X	pendii aridi, pascoli	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Astro Autunnale				X	vegetazioni ruderali discontinue, che tollera anche suoli moderatamente salati, dal livello del mare agli 800 m circa.	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Attaccamani			X		cresce lungo i bordi stradali, nei campi incolti, dal livello del mare fino a 2500 metri .	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Avena Altissima			X		prati stabili siepi e cespugli	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Avena Barbata			X		incolti margini campestri e garighe	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Avena Maggiore			X		campi, gli incolti e le stazioni ruderali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di

						mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Avena Selvatica			X		prati campi di cereali e siepi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Bambagione Pubescente				X	prati stabili, a volte anche in ambienti umidi o palustri,	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Berretta Del Prete				X	boschi di latifoglie, siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Biancospino Comune				X	boschi xerofili boscaglie cespuglietti collinari e lungo pendii erbosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Bietola D'acqua				X	incolti e orti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Bocca Di Lupo				X	boschi di latifoglie pinete e gineprai prati erbosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Boccione Maggiore			X		garighe prati aridi incolti e lungo le vie dei sentieri	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Borragine Comune			X		campi incolti siepi muri e margini di strada	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Borsa Pastore Comune			X		prati campi incolti lungo i muri delle case e sentieri	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Brunella				X	giardini, parchi pubblici, aiuole, bordo delle strade.	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Bucaneve				X	boschi di latifoglie, cespuglieti e prati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Buglossa Azzurra			X		luoghi aridi, margini delle strade, suoli basici	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Buglossa Comune			X		incolti, ambienti disturbati, aree antropizzate, vigne e campi coltivati	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Bugola				X	prati fertili e concimati, lungo siepi e margini dei sentieri, boschi di latifoglie	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Caglio Lucido				X	prati secchi, nei cespuglieti radi, nelle pinete	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Caglio Zolfino				X	Prati aridi e magri, lungo i sentieri, ai margini dei boschi, nelle zone antropizzate, nei luoghi sabbiosi e sassosi	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Calcatreppola				X	campi, garighe, margini stradali	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Calcatreppola Ametistina				X	Pascoli e prati aridi, magri, sassosi e assolati	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Calendula Dei Campi			X		prati incolti oliveti vigneti e bordi stradali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Camedrio Comune				X	prati aridi, i boschi radi e i pendii rocciosi.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Camepizio			X		prati aridi, i pascoli e gli incolti; ma anche i campi e le colture.	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Camomilla Bastarda			X		campi (culture di cereali), pascoli o luoghi incolti e abbandonati	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Camomilla Comune			X		campi di cereali incolti e bordi di strada	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di

						mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Camomilla Dei Tintori				X	conglomerati e affioramenti rocciosi assolati e aridi, nell' ambiente di boscaglia e macchia subcostiera.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Camomilla Mezzana				X	aree incolte, le zone ruderali e i campi di cereali; ma anche le scarpate, le strade rurali e depositi di immondizie	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Canna Comune				X	ambiente umido, vicini a fiumi e torrenti.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Canna Di Palude				X	margini di laghi, fiumi, in ambienti paludosi e acquitrinosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cannuccia Di Palude				X	stagni rive dei laghi torbiere e lungo i fossati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cappellini Comuni			X		prati e campi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Caprifoglio				X	margini dei boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Caprifoglio Comune				X	boschi, nelle radure boschive o in aree boschive perturbate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Carciofo Selvatico			X		pascoli aridi incolti margini delle strade	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Cardo Asinino			X		radure margini di boschi lungo sentieri pascoli luoghi rocciosi e cespugliosi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Cardo Campestre			X		campi e praterie incolti	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto

Cardo Mariano			X		incolti bordi delle vie ambienti ruderali e scarpate	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Cardo Rosso			X		pascoli margini dei sentieri e macerie	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Cardo Saettone		X			incolti, i bordi delle vie; ma anche gli ambienti ruderali e le scarpate	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Carice Villosa				X	rive e alvei, prati, ambienti umidi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Carlina Raggio D'oro			X		prati aridi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Carota				X	incolti, prati aridi, margini stradali e di fossi, ambienti ruderali, zone aperte e soleggiate.	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Cascellore Comune				X	cresce nel bosco a mezz'ombra, lungo i margini boschivi soleggiate e le rive di corsi d'acqua.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Centauro Minore		X			prati e pascoli pedemontani	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Centauro Giallo				X	terreni umidi e argillosi, si trova lungo bordi di viottoli e vicino a fossati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Centocchio Comune			X		coltivazioni ruderi e strade	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Centonchio Azzurro				X	terreni umidi e argillosi, si trova lungo bordi di viottoli e vicino a fossati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cerfoglio Inebriante				X	Luoghi incolti, siepi, macerie, bordi stradali boschivi	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto

Cerro				X	boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cicerchia Bastarda			X		incolti e campi di frumento	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Cicerchia Dei Prati			X		prati aridi siepi e margini dei boschi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Cicerchia Selvatica				X	scarpate in ombra o ai margini del bosco	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cicerchiella			X		prati aridi siepi e margini dei boschi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Ciclamino				X	boschi ombrosi di leccio e dalla macchia di cespugli	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cicoria Comune			X		margini di sentieri campi coltivati terreni incolti zone a macerie ambienti ruderali praterie e aree antropizzate	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Cicuta Maggiore				X	vicino a rigagnoli o siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cicutaria			X		incolti, bordi di strade, prati asciutti, vigne, suoli sabbiosi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Ciliegio				X	boschi di latifoglie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cinquefoglia Comune			X		zone incolte prati erbosi e ruderi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto

Cinquefoglia Primaticcia				X	prati aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cipresso Sempreverde				X	coltivato per ornamento e rimboschimento, diffuso nei parchi, giardini e cimiteri	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cisto Di Creta				X	macchie mediterranee, nei prati aridi e nelle zone calcaree delle aree vicine al mare	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cisto Rosso				X	macchie e garighe dune costiere stabilizzate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Clematide Fiammella				X	luoghi a mezz'ombra, boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Clematide Vitalba				X	siepi macchia e boscaglia	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cocomero Asinino			X		terreni sassosi e sabbiosi incolti aridi e macerie	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Coda Di Cane				X	pascoli	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Coda Di Topo Comune				X	ambienti semi aridi boscaglie	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Codolina Meridionale				X	prati stabili	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Corniolo				X	sponde dei torrenti, ai margini dei boschi di latifoglie, negli arbusteti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Crescione D'acqua				X	corsi d'acqua	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Crisantemo Campestre			X		campi incolti vigne e uliveti bordo strade	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Crisantemo Giallo			X		luoghi incolti e le strade abbandonate e, di solito, si ritrova in prossimità di pozze	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di

					d'acqua poco profonde	mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Damigella Scapigliata			X		incolti asciutti, vigneti, campi e prati aridi, bordo sentieri	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Dente Di Leone			X		prati luoghi erbosi margini delle strade e boschi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Edera				X	sottoboschi ombrosi lungo i tronchi degli alberi e a ridosso di vecchi edifici	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Eliotropio			X		discariche, maggese e stoppie lungo strade e rocce.	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Elleboro Puzzolente				X	margini dei boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Equiseto				X	terreni incolti umidi fossi scarpate ambienti ruderali terreni sabbiosi e argillosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Erba Di San Guglielmo				X	marginie dei boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Erba Falsa		X			orti, vigneti, colture sarchiate, bordi stradali	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Erba Marzolina Comune			X		prati falciabili bordi stradali incolti siepi e margini di bosco	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Erba Medica			X		prati aridi, incolti, luoghi erbosi e al bordo dei campi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Erba Medica			X		margini di sentieri campi coltivati e incolti aridi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di

Lupulina						mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Erba Perla Minore				X	incolti, pascoli aridi, garighe, dal livello del mare alla fascia montana.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Erba Ruchetta				X	incolti, luoghi sabbiosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Erba Storna Perfogliata			X		campi di cereali, gli orti e le zone ruderali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Erba Vajola			X		campi incolti prati e fossati	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Eucalipto				X	aree paludose, bonifiche specie alloctona	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Euforbia Calenzuola			X		incolti, coltivati, giardini, terreni degradati, aree antropiche	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Euforbia Falcata				X	incolti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Falsa Ortica			X		orti vigneti colture sarchiate e bordi stradali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Farinello Comune			X		zone incolte e ruderali; ma anche le colture tipo uliveti e vigneti	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Festuca Mediterranea				X	Radure e margini di boschi mediterranei Prati da freschi a secchi, anche sassosi, macereti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Fico D'india				X	terreni misti e drenati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori

						dall'area di impianto
Fienarola			X		prati	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Fienarola Annuale			X		praterie, prati	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Finocchiaccio			X		terreni aridi e calcarei delle zone collinari	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Finocchio Selvatico			X		angoli aridi sassosi assolati zone rocciose e vecchi muri a secco	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Fior Di Vespa				X	praterie ed incolti aridi, garighe e margini di macchia mediterranea	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Fiorrancio			X		incolti vigne oliveti campi e bordi delle strade	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Forasacco Eretto			X		habitat aperti, prati e praterie	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Forasacco Peloso				X	prati, siepi e terreni abbandonati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Forasacco Pendolino			X		incolti, i prati aridi e le siepi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Frassino				X	boschi umidi, valloni freschi su terreni profondi e freschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori

						dall'area di impianto
Fumaria Comune		x			campi, prati, lungo le strade	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Gallinella Comune			x		orti, giardini, coltivati; anche nei prati aridi steppici,	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Geranio Volgare				x	incolti, pascoli aridi.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Geranio Malvaccino			x		vegetazioni ruderali e terreni incolti, giardini, orti e vigneti, su suoli argillosi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Giacinto Romano			x		luoghi erbosi, prati, campi, vigneti.	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Gigaro Chiaro			x		fossi boschi vigneti oliveti e siepi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Ginepro				x	macchia mediterranea e della gariga	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ginestra Dei Carbonai				x	boschi, brughiere, lungo le scarpate rocciose o sabbiose	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ginestra Odorosa				x	radure, terreni aridi ben adattabile a tutti i terreni	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ginestrella Comune				x	radure garighe pinete e leccete	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ginestrino				x	prati umidi pascoli e margini stradali	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Girasole Comune		x			campi coltivati, orti zone abbandonate ambienti ruderali strade rurali e scarpate	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente

						in AVI ed in area di impianto.
Giunco Nodoso				X	paludi, fossi e prati umidi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Giunco Tenace				X	laghi, fiumi, paludi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Gladiolo Dei Campi				X	aree ripariali anche marittime, fiumi e fossati, paludi, prati o pascoli con ristagni d'acqua	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Gramigna			X		campi coltivati a cereali, degli oliveti e degli incolti erbosi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Grano Duro		X			campi coltivati, terreni argillosi e umidi	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Grano Villosa		X			incolti, i pascoli aridi, i bordi delle vie e i cumuli di macerie	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Grespino Comune		X			campi coltivati.	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Grespino Spinoso		X			colture concimate, i muri, i bordi delle strade	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Ilatro Comune				X	Macchie e leccete lungo le colline aride e le vallate rocciose in ambiente di macchia mediterranea	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Incensaria Comune				X	macchie, margini boschivi, prati incolti ..	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Inula Vischiosa			X		tutti i tipi di suolo, nei terreni incolti	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Iperico				X	luoghi erbosi e umidi, altre nei boschi ombrosi, altre ancora in località aride, argillose e calcaree	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lampascione			X		campi abbandonati, bordi strade, incolti aridi.	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione

						della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Lassana Comune				X	campi incolti	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Latte Di Gallina			X		Vigne, prati, oliveti, margini di viottoli e di boschi, aree antropizzate	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Leccio				X	boschi di latifoglie cedui orti campi coltivati zone ruderali e arbusteti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lentisco				X	adatto a tutti i substrati geologici	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ligustro Comune				X	macchia mediterranea	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lino Delle Fate				X	rupi, ghiaie, prati magri steppici	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lino Spinato				X	boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lisca Maggiore				X	paludi, stagni, fossi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Loglio Comune				X	rive di stagni e canneti, acque ferme o lentamente correnti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lupinella Comune			X		colture di cereali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Malva Selvatica			X		bordi di sentieri e strade prati asciutti scarpate rupi e pietraie	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Malvone Punteggiato			X		terreni coltivati incolti ruderi e margini di strade	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area

						di impianto
Marrubio Comune			X		campi siepi e incolti	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Marruca				X	boschi termofili,	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Masticogna Laticifera			X		garighe, luoghi aridi e rocciosi, bordi stradali,	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Meliloto Bianco				X	ambienti ruderali e umidi, nei campi e nei prati, lungo i sentieri e lungo le rive dei corsi d'acqua	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Meliloto Comune				X	margini di stagni, fossati, acquitrini, in terreni umidi, freschi, in zone ombreggiate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Menta Campestre			X		campi e incolti aridi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Mercorella Comune				X	fossi, corsi d'acqua, luoghi ombrosi e umidi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Miglio Multifloro			X		luoghi erbosi, incolti, al margine dei coltivi, lungo le vie e i sentieri, ruderi, muri a secco	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Mordigallina				X	aree aride e semidesertiche e incolti	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Morella Comune			X		incolti e ruderi, bordi dei sentieri e strade.	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Muscari Atlantico			X		terreni incolti e semiaridi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione

						della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Nappola Spinosa			X		incolti aridi e le aree ruderali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Narciso Italiano			X		terreni incolti e semiaridi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Nontiscordardimè Minore				X	Incolti, pascoli aridi, colture, giardini	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Ofride Verde Bruna				X	praterie ed incolti aridi, garighe e margini di macchia mediterranea	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Olivo				X	climi secchi su terreni poco rocciosi campi coltivati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Olmo Campestre				X	terreni asciutti e poco rocciosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ombrellini Maggiori			X		terreni incolti e lungo le strade	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Ombrellino Pugliese			X		boscaglie di depressioni, alberature su bordi stradali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Orchide Italica				X	incolti macchia	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Orchidea Piramidale				X	pascoli garighe macchie e boschi radi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Orchidea purpurea				X	boschi mesofili e xerofili, cespuglieti, radure, praterie, pascoli, bordi di vie e sentieri, argini di corsi d'acqua	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Orniello				X	boscaglie degradate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori

						dall'area di impianto
Ortica			X		luoghi erbosi, boscaglie, garighe	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Orzo Bulboso				X	vicino ad abitazioni sentieri zone ombra e umide e boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Orzo Selvatico				X	vicino ad abitazioni sentieri zone ombra e umide e boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pabbio Verticillato				X	zone fresche argillose vicino ad abitazioni sentieri zone ombra e umide e boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Paleo Comune				X	prati aridi, le boscaglie e le scarpate	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Paleo Dei Montoni				X	Prati umidi e paludosi,	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Paleo Delle Garighe				X	garighe, le macchie degradate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Paleo Odoroso			X		lungo strade alla base dei muri in scarpate discariche e suoli sabbiosi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Paleo Rupestre				X	prati aridi, le boscaglie e le scarpate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Paleo Splendente			X		Prati aridi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Papavero Comune			X		negli orti, nelle vigne, nei campi di mais, a volte lungo i sentieri, spesso anche in ambienti urbanizzati, in ambienti piuttosto caldi e umidi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Pastinaca				X	prati aridi boscaglie e scarpate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori

						dall'area di impianto
Perastro				X	campi e bordi di strade pascoli e gli incolti su terreni umidi; ma anche gli ambienti ruderali (sempre umidi)	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Perlina Gialla				X	prati aridi di tipo steppico	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Perlina Maggiore			X		prati, bordo strada, coltivi, scarpate ferroviarie, terreni limosi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Perlina Minore			X		luoghi incolti, garighe e campi coltivati a grano	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Perpetuini D'Italia				X	pascoli, incolti, garighe, luoghi sabbiosi e aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Peverina Dei Campi				X	bosco umido e semi-ombreggiato	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Piantaggine				X	boschi, siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pimpinella			X		pascoli aridi e sassosi e ambienti ruderali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Pino D'aleppo				X	prati giardini campi e lungo le strade	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pino Domestico				X	prati margini boscaglie e siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pino Silvestre				X	si adatta a diversi tipi di substrato	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pioppo Bianco				X	terreni freschi e profondi e substrati poveri e asciutti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Pioppo Tremulo				X	boschi montani e di collina	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pisello Selvatico				X	suoli incoerenti limosi-argillosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Piumino Nano				X	riva dei fiumi con un terreno sabbioso o calcareo	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Poligala			X		luoghi soleggiati erbosi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Poligono Nodoso			X		cresce negli incolti, tra i muri a secco di campagna, nei prati, ai bordi delle strade, in terreni difficili con condizioni di siccità.	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Polmonaria				X	boschi di latifoglie eliofile, nelle siepi e nei cespugli	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Portulaca			X		incolti e terreni di risulta nei pressi delle pietraie	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Pratolina Comune			X		ambienti umidi, campi, colture e incolti	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Prezzemolo Bastardo			X		luoghi ombrosi, boschi, praterie, siepi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Primula				X	boschi di latifoglie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Prugnolo Selvatico				X	cresce ai margini dei boschi e dei sentieri, in luoghi soleggiati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pungitopo				X	leccete e nei boschi di caducifoglie termofili	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori

						dall'area di impianto
Radicchiella Capillare			X		incolti, i campi, le zone ruderali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Radichella				X	ghiaioni, macereti, pietraie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Radichella Minore			X		incolti, bordi stradali, ruderi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Ranuncolo				X	giardini e prati alle zone paludose fino agli ambienti rocciosi e alle aree incolte	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ranuncolo Millefoglio				X	luoghi a mezz'ombra, boschi, siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Raperonzolo Selvatico				X	giardini, prati, zone paludose, ambienti rocciosi e aree incolte	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ravanello Selvatico				X	giardini, prati, zone paludose, ambienti rocciosi e aree incolte	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Reseda Comune			X		prati aridi, incolti, lungo le vie e bordi dei campi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Robinia Pseudoacacia				X	boschi cedui puri, lungo scarpate, luoghi incolti, siepi, specie alloctona	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Romice Crespo			X		massicciate ferroviarie, bordi delle strade, incolti, zone ruderali, macerie, su terreni gessosi e calcarei	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Rosa Canina				X	boscaglie di faggio, abete, pino e querce a foglie caduche, gli arbusteti e le siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rosmarino			X		macchia mediterranea	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di

						mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Roverella				X	boschi e arbusteti aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rovo Bluastro				X	boscaglie arbusteti e siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rovo Comune				X	terreni acidi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rovo Selvatico				X	zone molto boscose	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ruchetta				X	boschi ripariali, forre, suoli boschivi umidificati in ambienti umidi ed ombrosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rucola			X		incolti lungo i sentieri fasce ripariali e macerie	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Rucola Selvatica			X		incolti colture cereali e orti	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Saepola Di Buenos Aires			X		lungo le strade, negli incolti aridi, ambienti ruderali, scarpate ma anche nei campi, colture e vigneti.	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Salice Comune				X	vegetazioni ruderali, lungo i margini stradali, alla base di muri in pietra, sulle scarpate, nei coltivi, in giardini e parchi, su suoli superficiali aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salice Rosso				X	paludi di canneti ai margini di laghi e fiumi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salicone				X	boschi umidi e corsi d'acqua	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salsapariglia				X	aree di bosco umido e dal greto di fiumi torrenti e ruscelli	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori

						dall'area di impianto
Salvia Comune				X	macchia mediterranea lecceta e gariga	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salvia Dei Prati				X	pascoli magri, nei prati, nei luoghi sassosi, nelle radure	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Sambuco Commune				X	boschi umidi e terreni abbandonati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Sanguinella				X	margini dei boschi, lungo i sentieri	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Scardaccione			X		terreni calcarei sassosi e drenanti	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Scorzonera Villosa			X		prati aridi e lande, su suoli argillosi aridi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Sedanina D'acqua			X		lungo le strade discariche e coltivi abbandonati	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Senape Bianca			X		i prati aridi, gli incolti e lungo le vie e bordi dei campi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Senape Nera			X		campi e aree ruderali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Senecio Comune				X	prossimità di fonti di acqua, fossi e acquitrini, nei pressi dei fontanili di campagna, sulle rive di fiumi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Serapide Lingua				X	Incolti, pascoli, garighe, arbusteti, macchia, radure, boschi aperti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto


Silene Bianca			X		campi coltivati, incolti, lungo bordi stradali, nei ruderi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Sonaglini Minore			X		macchie, incolti e radure	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Sorbo Domestico				X	pendii montuosi e foreste decidue	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Sorgo Selvatico			X		incolti, di zone ruderali e di coltivi abbandonati	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Spergularia Comune				X	Incolti, sentieri battuti, luoghi sabbiosi,	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Speronella Comune			X		campi a quote comprese tra i 0-600 metri sul livello del mare	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Speronella Consolida			X		margini di campi di cereali e bordi di viottoli	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Stellina Dei Campi				X	sottobosco di faggete e boschi misti di latifoglie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Succiamele Delle Fave			X		margini di sentieri, incolti	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Succiamele Ramoso				X	luoghi erbosi e sassosi dei piani collinare e in parte montano	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Sulla Comune		X			prati erbosi incolti, ma anche ai margini di strade sterrate e fossi	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.

Tamaro			X		colture incolti, parchi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Tamerice				X	ambienti litoranei e sui greti dei torrenti,	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Tarassaco Comune				X	pendii aridi e argillosi	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Terebinto				X	colture incolti, macchia mediterranea	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Tifa Minima				X	bordi di laghetti, stagni e ruscelli	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Trifoglio Irsuto				X	macchie, nelle garighe e in pascoli aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Trifoglio Bianco		X			prati erbosi, campi coltivati	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Trifoglio Campestre			X		boschi termofili pendii di rocce calcaree e aride	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Trifoglio Dei Prati			X		pascoli, incolti e bordi stradali.	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Trifoglio Vulnerario				X	pascoli, prati aridi, pendii sassosi	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Veccia Comune			X		prati sentieri radure pascoli e coltivi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Veccia Montanina		X			prati e ambienti ruderali, lungo scarpate o siepi	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.

Veccia Tentennina			X		Incolti, prati aridi, bordi stradali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Veccia Viola Del Latte			X		prati e ambienti ruderali, lungo scarpate o siepi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Verbasco Coda Grossa		X			terreni incolti, ai margini delle coltivazioni, nei prati e nei pascoli.	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Verbena				X	margini campestri, radure boschive	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Vilucchio Bianco			X		colture erbacee, dei cereali, dei vigneti e degli incolti, sulle siepi, nelle radure dei boschi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Vilucchio Bicchierino			X		incolti, prati aridi bordi stradali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Vilucchio Comune		X			luoghi erbosi, orti, incolti, margini stradali	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Vilucchio Elegantissimo			X		vegetazioni ruderali, discariche, margini stradali, muri, lastricati, aiuole, giardini	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Viola Bianca				X	luoghi aridi, macchia mediterranea, rupi, lungo sentieri, margini delle strade	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Viola Dei Campi			X		luoghi erbosi orti incolti e margini stradali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Viola Mammola				X	luoghi erbosi ed incolti, margini boschivi, siepi,	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Viperina Azzurra				x	prati cespugli e incolti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Vite Comune			x		campi coltivati	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Zafferano Selvatico			x		Prati e pascoli aridi, praterie rase del piano, querceti sub-mediterranei, vigne ed oliveti .	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Zafferanone Selvatico		x			incolti aridi, gli oliveti e le vigne; ma anche in ambienti ruderali, scarpate, garighe e macchie basse.	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Zizzania		x			campi coltivati, colture di cereali	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.

Parco Eolico Fenice fase di Cantiere Impatti Diretti Flora		
<i>Grado di impatto</i>	<i>Specie</i>	<i>Percentuale</i>
Impatto alto	0	0%
Impatto medio	16	5%
Impatto basso	121	40%
Impatto nullo	166	55%



Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Flora e opere di progetto FASE DI CANTIERE						
Flora	Stima degli impatti INDIRETTI				Habitat	Note
	Alto	Medio	Basso	Nulla		
Acero Campestre				X	boschi meso-termofili	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Acero Minore				X	boschi termomesofili di latifoglie	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Aglio Delle Bisce			X		pendii rocciosi, terreni aridi, incolti e vigneti.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Aglio Italiano			X		macchie e i prati aridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Aglio Maggiore			X		boschi e ambienti umidi ombrosi, alla base di rupi ombrose e a volte ai margini di strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Aglio Pelosetto			X		macchie e cespuglieti. habitat di predilezione fuori dall'area di intervento	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Ailanto			X		lungo i bordi delle strade, in ambiente urbano, in prossimità dei fiumi e ai margini del bosco, specie alloctona	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Alaterno			X		macchia mediterranea e garighe.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.

Amaranto Bianco			X		incolti, macerie, ruderi, greti fluviali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Amaranto Comune			X		orti coltivazioni incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Ambretta Annuale			X		prati e pendii piuttosto magri, oppure sui margini dei sentieri.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Ambretta Comune			X		Prati e pascoli, bordi dei sentieri, zone incolte	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Anemone Fior-Stella			X		radure e prati asciutti.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Arabetta Irsuta			X		terreni asciutti, poveri, nei prati aridi, negli ambienti rupestri e sui vecchi muri	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Arisaro Comune				X	luoghi a mezz'ombra, luoghi ombrosi, boschi a quote comprese tra i 0-800 metri sul livello del mare.	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Aristolochia Rotonda			X		campi incolti, prati e boscaglie.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Arrestabue			X		prati aridi, nei luoghi sassosi,	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Asfodelo Fistoloso			X		terreno con vegetazione rada, prati aridi e pascoli	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Asfodelo Mediterraneo			X		incolti garighe pascoli aridi terreni sassosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Asparago				X	macchie	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori

						dall'area di impianto
Asplenio				X	boschi e rupi ombrose fino oltre 2000 metri.	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Aspraggine			X		incolti aridi o umidi, ruderi, aree antropizzate, bordi di strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Assenzio Selvatico			X		prati stabili siepi e cespugli	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Asterisco				X	distese fangose	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Astralago Rosato			X		pendii aridi, pascoli	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Astro Autunnale			X		vegetazioni ruderali discontinue, che tollera anche suoli moderatamente salati, dal livello del mare agli 800 m circa.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Attaccamani			X		cresce lungo i bordi stradali, nei campi incolti, dal livello del mare fino a 2500 metri .	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Avena Altissima			X		prati stabili siepi e cespugli	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Avena Barbata			X		incolti margini campestri e garighe	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Avena Maggiore			X		campi, gli incolti e le stazioni ruderali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Avena Selvatica			X		prati campi di cereali e siepi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.

Bambagione Pubescente				X	prati stabili, a volte anche in ambienti umidi o palustri,	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Berretta Del Prete				X	boschi di latifoglie, siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Biancospino Comune				X	boschi xerofili boscaglie cespuglietti collinari e lungo pendii erbosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Bietola D'acqua				X	incolti e orti	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Bocca Di Lupo				X	boschi di latifoglie pinete e gineprai prati erbosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Boccione Maggiore			X		garighe prati aridi incolti e lungo le vie dei sentieri	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Borragine Comune			X		campi incolti siepi muri e margini di strada	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Borsa Pastore Comune			X		prati campi incolti lungo i muri delle case e sentieri	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Brunella			X		giardini, parchi pubblici, aiuole, bordo delle strade.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Bucaneve				X	boschi di latifoglie, cespuglietti e prati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Buglossa Azzurra			X		luoghi aridi, margini delle strade, suoli basici	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Buglossa Comune			X		incolti, ambienti disturbati, aree antropizzate, vigne e campi coltivati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Bugola			X		prati fertili e concimati, lungo siepi e margini dei sentieri, boschi di latifoglie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i

						lavori.
Caglio Lucido			X		prati secchi, nei cespuglieti radi, nelle pinete	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Caglio Zolfino			X		Prati aridi e magri, lungo i sentieri, ai margini dei boschi, nelle zone antropizzate, nei luoghi sabbiosi e sassosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Calcatreppola			X		campi, garighe, margini stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Calcatreppola Ametistina			X		Pascoli e prati aridi, magri, sassosi e assolati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Calendula Dei Campi			X		prati incolti oliveti vigneti e bordi stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Camedrio Comune				X	prati aridi, i boschi radi e i pendii rocciosi.	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Camepizio			X		prati aridi, i pascoli e gli incolti; ma anche i campi e le colture.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Camomilla Bastarda			X		campi (culture di cereali), pascoli o luoghi incolti e abbandonati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Camomilla Comune			X		campi di cereali incolti e bordi di strada	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Camomilla Dei Tintori				X	conglomerati e affioramenti rocciosi assolati e aridi, nell' ambiente di boscaglia e macchia subcostiera.	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Camomilla Mezzana			X		aree incolte, le zone ruderali e i campi di cereali; ma anche le scarpate, le strade rurali e depositi di immondizie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.

Canna Comune				X	ambiente umido, vicini a fiumi e torrenti.	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Canna Di Palude				X	margini di laghi, fiumi, in ambienti paludosi e acquitrinosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cannuccia Di Palude				X	stagni rive dei laghi torbiere e lungo i fossati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cappellini Comuni			X		prati e campi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Caprifoglio				X	margini dei boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Caprifoglio Comune				X	boschi, nelle radure boschive o in aree boschive perturbate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Carciofo Selvatico			X		pascoli aridi incolti margini delle strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cardo Asinino			X		radure margini di boschi lungo sentieri pascoli luoghi rocciosi e cespugliosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cardo Campestre			X		campi e praterie incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cardo Mariano			X		incolti bordi delle vie ambienti ruderali e scarpate	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cardo Rosso			X		pascoli margini dei sentieri e macerie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cardo Saettone		X			incolti, i bordi delle vie; ma anche gli ambienti ruderali e le scarpate	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Carice Villosa				X	rive e alvei, prati, ambienti umidi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Carlina Raggio D'oro			X		prati aridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Carota			X		incolti, prati aridi, margini stradali e di fossi, ambienti ruderali, zone aperte e soleggiate.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cascellore Comune				X	cresce nel bosco a mezz'ombra, lungo i margini boschivi soleggiate e le rive di corsi d'acqua.	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Centauro Minore		X			prati e pascoli pedemontani	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Centauro Giallo				X	terreni umidi e argillosi, si trova lungo bordi di viottoli e vicino a fossati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Centocchio Comune			X		coltivazioni ruderi e strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Centonchio Azzurro				X	terreni umidi e argillosi, si trova lungo bordi di viottoli e vicino a fossati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cerfoglio Inebriante			X		Luoghi incolti, siepi, macerie, bordi stradali boschivi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cerro				X	boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cicerchia Bastarda			X		incolti e campi di frumento	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cicerchia Dei Prati			X		prati aridi siepi e margini dei boschi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cicerchia Selvatica				X	scarpate in ombra o ai margini del bosco	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cicerchiella			X		prati aridi siepi e margini dei boschi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i

						lavori.
Ciclamino				X	boschi ombrosi di leccio e dalla macchia di cespugli	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cicoria Comune			X		margini di sentieri campi coltivati terreni incolti zone a macerie ambienti ruderali praterie e aree antropizzate	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cicuta Maggiore				X	vicino a rigagnoli o siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cicutaria			X		incolti, bordi di strade, prati asciutti, vigne, suoli sabbiosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Ciliegio				X	boschi di latifoglie	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cinquefoglia Comune			X		zone incolte prati erbosi e ruderi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cinquefoglia Primaticcia				X	prati aridi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cipresso Sempreverde				X	coltivato per ornamento e rimboschimento, diffuso nei parchi, giardini e cimiteri	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cisto Di Creta				X	macchie mediterranee, nei prati aridi e nelle zone calcaree delle aree vicine al mare	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cisto Rosso				X	macchie e garighe dune costiere stabilizzate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Clematide Fiammella				X	luoghi a mezz'ombra, boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Clematide Vitalba				X	siepi macchia e boscaglia	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cocomero Asinino			X		terreni sassosi e sabbiosi incolti aridi e macerie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.

Coda Di Cane			X		pascoli	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Coda Di Topo Comune			X		ambienti semi aridi boscaglie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Codolina Meridionale				X	prati stabili	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Corniolo				X	sponde dei torrenti, ai margini dei boschi di latifoglie, negli arbusteti	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Crescione D'acqua				X	corsi d'acqua	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Crisantemo Campestre			X		campi incolti vigne e uliveti bordo strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Crisantemo Giallo			X		luoghi incolti e le strade abbandonate e, di solito, si ritrova in prossimità di pozze d'acqua poco profonde	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Damigella Scapigliata			X		incolti asciutti, vigneti, campi e prati aridi, bordo sentieri	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Dente Di Leone			X		prati luoghi erbosi margini delle strade e boschi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Edera				X	sottoboschi ombrosi lungo i tronchi degli alberi e a ridosso di vecchi edifici	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Eliotropio			X		discariche, maggese e stoppie lungo strade e rocce.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Elleboro Puzzolente				X	margini dei boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Equiseto				X	terreni incolti umidi fossi scarpate ambienti ruderali terreni sabbiosi e	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori

					argillosi	dall'area di impianto
Erba Di San Guglielmo				X	margine dei boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Erba Falsa		X			orti, vigneti, colture sarchiate, bordi stradali	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Erba Marzolina Comune			X		prati falciabili bordi stradali incolti siepi e margini di bosco	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Erba Medica			X		prati aridi, incolti, luoghi erbosi e al bordo dei campi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Erba Medica Lupulina			X		margini di sentieri campi coltivati e incolti aridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Erba Perla Minore			X		incolti, pascoli aridi, garighe, dal livello del mare alla fascia montana.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Erba Ruchetta				X	incolti, luoghi sabbiosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Erba Storna Perfogliata			X		campi di cereali, gli orti e le zone ruderali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Erba Vajola			X		campi incolti prati e fossati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Eucalipto				X	aree paludose, bonifiche specie alloctona	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Euforbia Calenzuola			X		incolti, coltivi, giardini, terreni degradati, aree antropiche	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Euforbia Falcata			X		incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i

						lavori.
Falsa Ortica			X		orti vigneti colture sarchiate e bordi stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Farinello Comune			X		zone incolte e ruderali; ma anche le colture tipo uliveti e vigneti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Festuca Mediterranea			X		Radure e margini di boschi mediterranei Prati da freschi a secchi, anche sassosi, macereti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Fico D'india			X		terreni misti e drenati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Fienarola			X		prati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Fienarola Annuale			X		praterie, prati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Finocchiaccio			X		terreni aridi e calcarei delle zone collinari	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Finocchio Selvatico			X		angoli aridi sassosi assolati zone rocciose e vecchi muri a secco	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Fior Di Vespa				X	praterie ed incolti aridi, garighe e margini di macchia mediterranea	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Fiorrancio			X		incolti vigne uliveti campi e bordi delle strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Forasacco Eretto			X		habitat aperti, prati e praterie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.

Forasacco Peloso				X	prati, siepi e terreni abbandonati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Forasacco Pendolino			X		incolti, i prati aridi e le siepi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Frassino				X	boschi umidi, valloni freschi su terreni profondi e freschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Fumaria Comune		X			campi, prati, lungo le strade	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Gallinella Comune			X		orti, giardini, coltivi; anche nei prati aridi steppici,	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Geranio Volgare			X		incolti, pascoli aridi.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Geranio Malvaccino			X		vegetazioni ruderali e terreni incolti, giardini, orti e vigneti, su suoli argillosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Giacinto Romano			X		luoghi erbosi, prati, campi, vigneti.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Gigaro Chiaro			X		fossi boschi vigneti oliveti e siepi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Ginepro				X	macchia mediterranea e della gariga	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ginestra Dei Carbonai				X	boschi, brughiere, lungo le scarpate rocciose o sabbiose	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ginestra Odorosa				X	radure, terreni aridi ben adattabile a tutti i terreni	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ginestrella Comune				X	radure garighe pinete e leccete	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Ginestrino				X	prati umidi pascoli e margini stradali	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Girasole Comune		X			campi coltivati, orti zone abbandonate ambienti ruderali strade rurali e scarpate	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Giunco Nodoso				X	paludi, fossi e prati umidi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Giunco Tenace				X	laghi, fiumi, paludi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Gladiolo Dei Campi				X	aree ripariali anche marittime, fiumi e fossati, paludi, prati o pascoli con ristagni d'acqua	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Gramigna			X		campi coltivati a cereali, degli oliveti e degli incolti erbosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Grano Duro		X			campi coltivati, terreni argillosi e umidi	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Grano Villosa		X			incolti, i pascoli aridi, i bordi delle vie e i cumuli di macerie	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Grespino Comune		X			campi coltivati.	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Grespino Spinoso		X			colture concimate, i muri, i bordi delle strade	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Ilatro Comune				X	Macchie e leccete lungo le colline aride e le vallate rocciose in ambiente di macchia mediterranea	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Incensaria Comune				X	macchie, margini boschivi, prati incolti ..	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Inula Vischiosa			X		tutti i tipi di suolo, nei terreni incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Iperico				X	luoghi erbosi e umidi, altre nei boschi ombrosi, altre ancora in località aride, argillose e <u>calcaree</u>	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Lampascione			X		campi abbandonati, bordi strade, incolti aridi.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Lassana Comune			X		campi incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Latte Di Gallina			X		Vigne, prati, oliveti, margini di viottoli e di boschi, aree antropizzate	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Leccio				X	boschi di latifoglie cedui orti campi coltivati zone ruderali e arbusteti	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lentisco				X	adatto a tutti i substrati geologici	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ligustro Comune				X	macchia mediterranea	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lino Delle Fate				X	rupi, ghiaie, prati magri steppici	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lino Spinato				X	boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lisca Maggiore				X	paludi, stagni, fossi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lupinella Comune			X		colture di cereali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Malva Selvatica			X		bordi di sentieri e strade prati asciutti scarpate rupi e pietraie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Malvone Punteggiato			X		terreni coltivati incolti ruderi e margini di strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Marrubio Comune			X		campi siepi e incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i

						lavori.
Marruca				X	boschi termofili,	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Masticogna Latticifera			X		garighe, luoghi aridi e rocciosi, bordi stradali,	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Meliloto Bianco				X	ambienti ruderali e umidi, nei campi e nei prati, lungo i sentieri e lungo le rive dei corsi d'acqua	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Meliloto Comune				X	margini di stagni, fossati, acquitrini, in terreni umidi, freschi, in zone ombreggiate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Menta Campestre			X		campi e incolti aridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Mercorella Comune				X	fossi, corsi d'acqua, luoghi ombrosi e umidi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Miglio Multifloro			X		luoghi erbosi, incolti, al margine dei coltivi, lungo le vie e i sentieri, ruderi, muri a secco	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Mordigallina			X		aree aride e semidesertiche e incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Morella Comune			X		incolti e ruderi, bordi dei sentieri e strade.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Muscari Atlantico			X		terreni incolti e semiaridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Nappola Spinosa			X		incolti aridi e le aree ruderali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Narciso Italiano			X		terreni incolti e semiaridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i

						lavori.
Nontiscordardimè Minore			X		Incolti, pascoli aridi, colture, giardini	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Ofride Verde Bruna				X	praterie ed incolti aridi, garighe e margini di macchia mediterranea	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Olivo				X	climi secchi su terreni poco rocciosi campi coltivati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Olmo Campestre				X	terreni asciutti e poco rocciosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ombrellini Maggiori			X		terreni incolti e lungo le strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Ombrellino Pugliese			X		boscaglie di depressioni, alberature su bordi stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Orchide Italica				X	incolti macchia	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Orchidea Piramidale				X	pascoli garighe macchie e boschi radi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Orchidea purpurea				X	boschi mesofili e xerofili, cespuglieti, radure, praterie, pascoli, bordi di vie e sentieri, argini di corsi d'acqua	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Orniello				X	boscaglie degradate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ortica			X		luoghi erbosi, boscaglie, garighe	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Orzo Bulboso				X	vicino ad abitazioni sentieri zone ombra e umide e boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Orzo Selvatico				X	vicino ad abitazioni sentieri zone ombra e umide e boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Pabbio Verticillato				X	zone fresche argillose vicino ad abitazioni sentieri zone ombra e umide e boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Paleo Comune			X		prati aridi, le boscaglie e le scarpate	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Paleo Dei Montoni				X	Prati umidi e paludosi,	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Paleo Delle Garighe				X	garighe, le macchie degradate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Paleo Odroso			X		lungo strade alla base dei muri in scarpate discariche e suoli sabbiosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Paleo Rupestre				X	prati aridi, le boscaglie e le scarpate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Paleo Splendente			X		Prati aridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Papavero Comune			X		negli orti, nelle vigne, nei campi di mais, a volte lungo i sentieri, spesso anche in ambienti urbanizzati, in ambienti piuttosto caldi e umidi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Pastinaca				X	prati aridi boscaglie e scarpate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Perastro			X		campi e bordi di strade pascoli e gli incolti su terreni umidi; ma anche gli ambienti ruderali (sempre umidi)	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Perlina Gialla			X		prati aridi di tipo steppico	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Perlina Maggiore			X		prati, bordo strada, coltivi, scarpate ferroviarie, terreni limosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Perlina Minore			X		luoghi incolti, garighe e campi coltivati a grano	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile

						interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Perpetuini D'italia				X	pascoli, incolti, garighe, luoghi sabbiosi e aridi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Peperina Dei Campi				X	bosco umido e semi-ombreggiato	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Piantaggine				X	boschi, siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pimpinella			X		pascoli aridi e sassosi e ambienti ruderali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Pino D'aleppo				X	prati giardini campi e lungo le strade	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pino Domestico				X	prati margini boscaglie e siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pino Silvestre				X	si adatta a diversi tipi di substrato	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pioppo Bianco				X	terreni freschi e profondi e substrati poveri e asciutti	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pioppo Tremulo				X	boschi montani e di collina	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pisello Selvatico				X	suoli incoerenti limosi-argillosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Piumino Nano				X	riva dei fiumi con un terreno sabbioso o calcareo	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Poligala			X		luoghi soleggiati erbosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Poligono Nodoso			X		cresce negli incolti, tra i muri a secco di campagna, nei prati, ai bordi delle strade, in terreni difficili con condizioni di siccità.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.

Polmonaria				X	boschi di latifoglie eliofile, nelle siepi e nei cespugli	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Portulaca			X		incolti e terreni di risulta nei pressi delle pietraie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Pratolina Comune			X		ambienti umidi, campi, colture e incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Prezzemolo Bastardo			X		luoghi ombrosi, boschi, praterie, siep	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Primula				X	boschi di latifoglie	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Prugnolo Selvatico				X	cresce ai margini dei boschi e dei sentieri, in luoghi soleggiati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pungitopo				X	leccete e nei boschi di caducifoglie termofili	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Radicchiella Capillare			X		incolti, i campi, le zone ruderali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Radichella				X	ghiaioni, macereti, pietraie	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Radichella Minore			X		incolti, bordi stradali, ruderi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Ranuncolo				X	giardini e prati alle zone paludose fino agli ambienti rocciosi e alle aree incolte	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ranuncolo Millefoglio				X	luoghi a mezz'ombra, boschi, siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Raperonzolo Selvatico				X	giardini, prati, zone paludose, ambienti rocciosi e aree incolte	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Ravanello Selvatico				X	giardini, prati, zone paludose, ambienti rocciosi e aree incolte	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Reseda Comune			X		prati aridi , incolti ,lungo le vie e bordi dei campi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Robinia Pseudoacacia				X	boschi cedui puri, lungo scarpate, luoghi incolti, siepi, specie alloctona	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Romice Crespo			X		massicciate ferroviarie, bordi delle strade, incolti, zone ruderali, macerie, su terreni gessosi e calcarei	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Rosa Canina				X	boscaglie di faggio, abete, pino e querce a foglie caduche, gli arbusteti e le siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rosmarino			X		macchia mediterranea	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Roverella				X	boschi e arbusteti aridi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rovo Bluastro				X	boscaglie arbusteti e siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rovo Comune				X	terreni acidi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rovo Selvatico				X	zone molto boschive	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ruchetta				X	boschi ripariali, forre, suoli boschivi umidificati in ambienti umidi ed ombrosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rucola			X		incolti lungo i sentieri fasce ripariali e macerie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Rucola Selvatica			X		incolti colture cereali e orti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.

Saeppola Di Buenos Aires			X		lungo le strade, negli incolti aridi, ambienti ruderali, scarpate ma anche nei campi, colture e vigneti.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Salice Comune				X	vegetazioni ruderali, lungo i margini stradali, alla base di muri in pietra, sulle scarpate, nei coltivi, in giardini e parchi, su suoli superficiali aridi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salice Rosso				X	paludi di canneti ai margini di laghi e fiumi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salicone				X	boschi umidi e corsi d'acqua	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salsapariglia				X	aree di bosco umido e dal greto di fiumi torrenti e ruscelli	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salvia Comune				X	macchia mediterranea lecceta e gariga	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salvia Dei Prati				X	pascoli magri, nei prati, nei luoghi sassosi, nelle radure	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Sambuco Commune				X	boschi umidi e terreni abbandonati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Sanguinella				X	margini dei boschi, lungo i sentieri	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Scardaccione			X		terreni calcarei sassosi e drenanti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Scorzonera Villosa			X		prati aridi e lande, su suoli argillosi aridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Sedanina D'acqua			X		lungo le strade discariche e coltivi abbandonati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Senape Bianca			X		i prati aridi, gli incolti e lungo le vie e bordi dei campi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.


Senape Nera			X		campi e aree ruderali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Senecio Comune				X	prossimità di fonti di acqua, fossi e acquitrini, nei pressi dei fontanili di campagna, sulle rive di fiumi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Serapide Lingua				X	Incolti, pascoli, garighe, arbusteti, macchia, radure, boschi aperti	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Silene Bianca			X		campi coltivati, incolti, lungo bordi stradali, nei ruderi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Sonaglini Minore			X		macchie, incolti e radure	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Sorbo Domestico				X	pendii montuosi e foreste decidue	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Sorgo Selvatico			X		incolti, di zone ruderali e di coltivi abbandonati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Spergularia Comune			X		Incolti, sentieri battuti, luoghi sabbiosi,	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Speronella Comune			X		campi a quote comprese tra i 0-600 metri sul livello del mare	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Speronella Consolida			X		margini di campi di cereali e bordi di viottoli	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Stellina Dei Campi				X	sottobosco di faggete e boschi misti di latifoglie	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Succiamele Delle Fave			X		margini di sentieri, incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.

Succiamele Ramoso			X	luoghi erbosi e sassosi dei piani collinare e in parte montano	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Sulla Comune		X		prati erbosi incolti, ma anche ai margini di strade sterrate e fossi	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Tamaro			X	colture incolti, parchi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Tamerice			X	ambienti litoranei e sui greti dei torrenti,	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Tarassaco Comune			X	pendii aridi e argillosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Terebinto			X	colture incolti, macchia mediterranea	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Tifa Minima			X	bordi di laghetti, stagni e ruscelli	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Trifogliano Irsuto			X	macchie, nelle garighe e in pascoli aridi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Trifoglio Bianco		X		prati erbosi, campi coltivati	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Trifoglio Campestre			X	boschi termofili pendii di rocce calcaree e aride	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Trifoglio Dei Prati			X	pascoli, incolti e bordi stradali.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Trifoglio Vulnerario			X	pascoli, prati aridi, pendii sassosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Veccia Comune			X	prati sentieri radure pascoli e coltivi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.

Veccia Montanina		x			prati e ambienti ruderali, lungo scarpate o siepi	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Veccia Tentennina			x		Incolti, prati aridi, bordi stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Veccia Viola Del Latte			x		prati e ambienti ruderali, lungo scarpate o siepi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Verbasco Coda Grossa		x			terreni incolti, ai margini delle coltivazioni, nei prati e nei pascoli.	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Verbena				x	margini campestri, radure boschive	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Vilucchio Bianco			x		colture erbacee, dei cereali, dei vigneti e degli incolti, sulle siepi, nelle radure dei boschi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Vilucchio Bicchierino			x		incolti, prati aridi bordi stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Vilucchio Comune		x			luoghi erbosi, orti, incolti, margini stradali	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Vilucchio Elegantissimo			x		vegetazioni ruderali, discariche, margini stradali, muri, lastricati, aiuole, giardini	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Viola Bianca				x	luoghi aridi, macchia mediterranea, rupi, lungo sentieri, margini delle strade	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Viola Dei Campi			x		luoghi erbosi orti incolti e margini stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Viola Mammola				x	luoghi erbosi ed incolti, margini boschivi, siepi,	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Viperina Azzurra				x	prati cespugli e incolti	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Vite Comune			X		campi coltivati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Zafferano Selvatico			X		Prati e pascoli aridi, praterie rase del piano, querceti sub-mediterranei, vigne ed oliveti .	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Zafferanone Selvatico		X			incolti aridi, gli oliveti e le vigne; ma anche in ambienti ruderali, scarpate, garighe e macchie basse.	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Zizzania		X			campi coltivati, colture di cereali	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.

Parco Eolico Fenice fase di Cantiere Impatti Indiretti Flora		
<i>Grado di impatto</i>	<i>Specie</i>	<i>Percentuale</i>
<i>Impatto alto</i>	0	0%
<i>Impatto medio</i>	16	5%
<i>Impatto basso</i>	158	52%
<i>Impatto nullo</i>	128	128%



Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Flora e opere di progetto FASE DI ESERCIZIO						
Flora	Stima degli impatti DIRETTI				Habitat	Note
	Alto	Medio	Basso	Nulla		
Acero Campestre				X	boschi meso-termofili	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Acero Minore				X	boschi termomesofili di latifoglie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Aglione Delle Bische				X	pendii rocciosi, terreni aridi, incolti e vigneti.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Aglione Italiano				X	macchie e i prati aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Aglione Maggiore				X	boschi e ambienti umidi ombrosi, alla base di rupi ombrose e a volte ai margini di strade	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Aglione Pelosetto				X	macchie e cespuglieti. habitat di predilezione fuori dall'area di intervento	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Ailanto				X	lungo i bordi delle strade, in ambiente urbano, in prossimità dei fiumi e ai margini del bosco, specie alloctona	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Alaterno				X	macchia mediterranea e garighe.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Amaranto Bianco				X	incolti, macerie, ruderi, greti fluviali	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Amaranto Comune				X	orti coltivazioni incolti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi

						totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Ambretta Annuale				X	prati e pendii piuttosto magri, oppure sui margini dei sentieri.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Ambretta Comune				X	Prati e pascoli, bordi dei sentieri, zone incolte	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Anemone Fior-Stella				X	radure e prati asciutti.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Arabetta Irsuta				X	terreni asciutti, poveri, nei prati aridi, negli ambienti rupestri e sui vecchi muri	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Arisaro Comune				X	luoghi a mezz'ombra, luoghi ombrosi, boschi a quote comprese tra i 0-800 metri sul livello del mare.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Aristolochia Rotonda				X	campi incolti, prati e boscaglie.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Arrestabue				X	prati aridi, nei luoghi sassosi,	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Asfodelo Fistoloso				X	terreno con vegetazione rada, prati aridi e pascoli	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Asfodelo Mediterraneo				X	incolti garighe pascoli aridi terreni sassosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Asparago				X	macchie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Asplenio				X	boschi e rupi ombrose fino oltre 2000 metri.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Aspraggine				X	incolti aridi o umidi, ruderi, aree antropizzate, bordi di strade	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Assenzio Selvatico				X	prati stabili siepi e cespugli	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi

						totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Asterisco				X	distese fangose	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Astralago Rosato				X	pendii aridi, pascoli	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Astro Autunnale				X	vegetazioni ruderali discontinue, che tollera anche suoli moderatamente salati, dal livello del mare agli 800 m circa.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Attaccamani				X	cresce lungo i bordi stradali, nei campi incolti, dal livello del mare fino a 2500 metri .	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Avena Altissima				X	prati stabili siepi e cespugli	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Avena Barbata				X	incolti margini campestri e garighe	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Avena Maggiore				X	campi, gli incolti e le stazioni ruderali	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Avena Selvatica				X	prati campi di cereali e siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Bambagione Pubescente				X	prati stabili, a volte anche in ambienti umidi o palustri,	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Berretta Del Prete				X	boschi di latifoglie, siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Biancospino Comune				X	boschi xerofili boscaglie cespuglietti collinari e lungo pendii erbosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Bietola D'acqua				X	incolti e orti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.

Bocca Di Lupo				X	boschi di latifoglie pinete e gineprai prati erbosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Boccione Maggiore				X	garighe prati aridi incolti e lungo le vie dei sentieri	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Borragine Comune				X	campi incolti siepi muri e margini di strada	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Borsa Pastore Comune				X	prati campi incolti lungo i muri delle case e sentieri	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Brunella				X	giardini, parchi pubblici, aiuole, bordo delle strade.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Bucaneve				X	boschi di latifoglie, cespuglieti e prati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Buglossa Azzurra				X	luoghi aridi, margini delle strade, suoli basici	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Buglossa Comune				X	incolti, ambienti disturbati, aree antropizzate, vigne e campi coltivati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Bugola				X	prati fertili e concimati, lungo siepi e margini dei sentieri, boschi di latifoglie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Caglio Lucido				X	prati secchi, nei cespuglieti radi, nelle pinete	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Caglio Zolfino				X	Prati aridi e magri, lungo i sentieri, ai margini dei boschi, nelle zone antropizzate, nei luoghi sabbiosi e sassosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Calcatreppola				X	campi, garighe, margini stradali	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Calcatreppola Ametistina				X	Pascoli e prati aridi, magri, sassosi e assolati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.

Calendula Dei Campi				X	prati incolti oliveti vigneti e bordi stradali	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Camedrio Comune				X	prati aridi, i boschi radi e i pendii rocciosi.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Camepizio				X	prati aridi, i pascoli e gli incolti; ma anche i campi e le colture.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Camomilla Bastarda				X	campi (culture di cereali), pascoli o luoghi incolti e abbandonati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Camomilla Comune				X	campi di cereali incolti e bordi di strada	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Camomilla Dei Tintori				X	conglomerati e affioramenti rocciosi assolati e aridi, nell' ambiente di boscaglia e macchia subcostiera.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Camomilla Mezzana				X	aree incolte, le zone ruderali e i campi di cereali; ma anche le scarpate, le strade rurali e depositi di immondizie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Canna Comune				X	ambiente umido, vicini a fiumi e torrenti.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Canna Di Palude				X	margini di laghi, fiumi, in ambienti paludosi e acquitrinosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Cannuccia Di Palude				X	stagni rive dei laghi torbiere e lungo i fossati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Cappellini Comuni				X	prati e campi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Caprifoglio				X	margini dei boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Caprifoglio Comune				X	boschi, nelle radure boschive o in aree boschive perturbate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.

Carciofo Selvatico				X	pascoli aridi incolti margini delle strade	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Cardo Asinino				X	radure margini di boschi lungo sentieri pascoli luoghi rocciosi e cespugliosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Cardo Campestre				X	campi e praterie incolti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Cardo Mariano				X	incolti bordi delle vie ambienti ruderali e scarpate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Cardo Rosso				X	pascoli margini dei sentieri e macerie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Cardo Saettone			X		incolti, i bordi delle vie; ma anche gli ambienti ruderali e le scarpate	Impatto diretto basso. Probabile interferenza tra esercizio dell'impianto (rotazione delle pale) e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente anche all'interno dell'area di impianto.
Carice Villosa				X	rive e alvei, prati, ambienti umidi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Carlina Raggio D'oro				X	prati aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Carota				X	incolti, prati aridi, margini stradali e di fossi, ambienti ruderali, zone aperte e soleggiate.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Cascellore Comune				X	cresce nel bosco a mezz'ombra, lungo i margini boschivi soleggiate e le rive di corsi d'acqua.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Centauro Minore			X		prati e pascoli pedemontani	Impatto diretto basso. Probabile interferenza tra esercizio dell'impianto (rotazione delle pale) e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente anche all'interno dell'area di impianto.
Centauro Giallo				X	terreni umidi e argillosi, si trova lungo bordi di viottoli e vicino a fossati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Centocchio Comune				X	coltivazioni ruderi e strade	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno

						dell'area di impianto.
Centonchio Azzurro				X	terreni umidi e argillosi, si trova lungo bordi di viottoli e vicino a fossati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Cerfoglio Inebriante				X	Luoghi incolti, siepi, macerie, bordi stradali boschivi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Cerro				X	boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Cicerchia Bastarda				X	incolti e campi di frumento	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Cicerchia Dei Prati				X	prati aridi siepi e margini dei boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Cicerchia Selvatica				X	scarpate in ombra o ai margini del bosco	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Cicerchiella				X	prati aridi siepi e margini dei boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Ciclamino				X	boschi ombrosi di leccio e dalla macchia di cespugli	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Cicoria Comune				X	margini di sentieri campi coltivati terreni incolti zone a macerie ambienti ruderali praterie e aree antropizzate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Cicuta Maggiore				X	vicino a rigagnoli o siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Cicutaria				X	incolti, bordi di strade, prati asciutti, vigne, suoli sabbiosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Ciliegio				X	boschi di latifoglie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Cinquefoglia Comune				X	zone incolte prati erbosi e ruderi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi

						totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Cinquefoglia Primaticcia				X	prati aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Cipresso Sempreverde				X	cultivato per ornamento e rimboscimento, diffuso nei parchi, giardini e cimiteri	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Cisto Di Creta				X	macchie mediterranee, nei prati aridi e nelle zone calcaree delle aree vicine al mare	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Cisto Rosso				X	macchie e garighe dune costiere stabilizzate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Clematide Fiammella				X	luoghi a mezz'ombra, boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Clematide Vitalba				X	siepi macchia e boscaglia	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Cocomero Asinino				X	terreni sassosi e sabbiosi incolti aridi e macerie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Coda Di Cane				X	pascoli	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Coda Di Topo Comune				X	ambienti semi aridi boscaglie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Codolina Meridionale				X	prati stabili	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Corniolo				X	sponde dei torrenti, ai margini dei boschi di latifoglie, negli arbusteti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Crescione D'acqua				X	corsi d'acqua	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Crisantemo Campestre				X	campi incolti vigne e uliveti bordo strade	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Crisantemo Giallo				X	luoghi incolti e le strade abbandonate e, di solito, si ritrova in prossimità di	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi

					pozze d'acqua poco profonde	totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Damigella Scapigliata				X	incolti asciutti, vigneti, campi e prati aridi, bordo sentieri	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Dente Di Leone				X	prati luoghi erbosi margini delle strade e boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Edera				X	sottoboschi ombrosi lungo i tronchi degli alberi e a ridosso di vecchi edifici	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Eliotropio				X	discariche, maggese e stoppie lungo strade e rocce.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Elleboro Puzzolente				X	margini dei boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Equiseto				X	terreni incolti umidi fossi scarpate ambienti ruderali terreni sabbiosi e argillosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Erba Di San Guglielmo				X	marginie dei boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Erba Falsa			X		orti, vigneti, colture sarchiate, bordi stradali	Impatto diretto basso. Probabile interferenza tra esercizio dell'impianto (rotazione delle pale) e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente anche all'interno dell'area di impianto.
Erba Marzolina Comune				X	prati falciabili bordi stradali incolti siepi e margini di bosco	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Erba Medica				X	prati aridi, incolti, luoghi erbosi e al bordo dei campi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Erba Medica Lupulina				X	margini di sentieri campi coltivati e incolti aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Erba Perla Minore				X	incolti, pascoli aridi, garighe, dal livello del mare alla fascia montana.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.

Erba Ruchetta				X	incolti, luoghi sabbiosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Erba Storna Perfogliata				X	campi di cereali, gli orti e le zone ruderali	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Erba Vajola				X	campi incolti prati e fossati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Eucalipto				X	aree paludose, bonifiche specie alloctona	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Euforbia Calenzuola				X	incolti, coltivi, giardini, terreni degradati, aree antropiche	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Euforbia Falcata				X	incolti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Falsa Ortica				X	orti vigneti colture sarchiate e bordi stradali	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Farinello Comune				X	zone incolte e ruderali; ma anche le colture tipo uliveti e vigneti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Festuca Mediterranea				X	Radure e margini di boschi mediterranei Prati da freschi a secchi, anche sassosi, macereti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Fico D'india				X	terreni misti e drenati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Fienarola				X	prati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Fienarola Annuale				X	praterie, prati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Finocchiaccio				X	terreni aridi e calcarei delle zone collinari	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi

						totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Finocchio Selvatico				X	angoli aridi sassosi assolati zone rocciose e vecchi muri a secco	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Fior Di Vespa				X	praterie ed incolti aridi, garighe e margini di macchia mediterranea	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Fiorrancio				X	incolti vigne oliveti campi e bordi delle strade	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Forasacco Eretto				X	habitat aperti, prati e praterie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Forasacco Peloso				X	prati, siepi e terreni abbandonati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Forasacco Pendolino				X	incolti, i prati aridi e le siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Frassino				X	boschi umidi, valloni freschi su terreni profondi e freschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Fumaria Comune			X		campi, prati, lungo le strade	Impatto diretto basso. Probabile interferenza tra esercizio dell'impianto (rotazione delle pale) e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente anche all'interno dell'area di impianto.
Gallinella Comune				X	orti, giardini, coltivi; anche nei prati aridi steppici,	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Geranio Volgare				X	incolti, pascoli aridi.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Geranio Malvaccino				X	vegetazioni ruderali e terreni incolti, giardini, orti e vigneti, su suoli argillosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Giacinto Romano				X	luoghi erbosi, prati, campi, vigneti.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.

Gigaro Chiaro				X	fossi boschi vigneti oliveti e siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Ginepro				X	macchia mediterranea e della gariga	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Ginestra Dei Carbonai				X	boschi, brughiere, lungo le scarpate rocciose o sabbiose	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Ginestra Odorosa				X	radure, terreni aridi ben adattabile a tutti i terreni	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Ginestrella Commune				X	radure garighe pinete e leccete	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Ginestrino				X	prati umidi pascoli e margini stradali	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Girasole Comune			X		campi coltivati, orti zone abbandonate ambienti ruderali strade rurali e scarpate	Impatto diretto basso. Probabile interferenza tra esercizio dell'impianto (rotazione delle pale) e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente anche all'interno dell'area di impianto.
Giunco Nodoso				X	paludi, fossi e prati umidi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Giunco Tenace				X	laghi, fiumi, paludi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Gladiolo Dei Campi				X	aree ripariali anche marittime, fiumi e fossati, paludi, prati o pascoli con ristagni d'acqua	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Gramigna				X	campi coltivati a cereali, degli oliveti e degli incolti erbosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Grano Duro			X		campi coltivati, terreni argillosi e umidi	Impatto diretto basso. Probabile interferenza tra esercizio dell'impianto (rotazione delle pale) e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente anche all'interno dell'area di impianto.
Grano Villoso			X		incolti, i pascoli aridi, i bordi delle vie e i cumuli di macerie	Impatto diretto basso. Probabile interferenza tra esercizio dell'impianto (rotazione delle pale) e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente anche all'interno dell'area di impianto.
Grespino Comune			X		campi coltivati.	Impatto diretto basso. Probabile interferenza tra esercizio dell'impianto (rotazione delle pale) e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente anche all'interno dell'area di impianto.

Grespino Spinoso			X		colture concimate, i muri, i bordi delle strade	Impatto diretto basso. Probabile interferenza tra esercizio dell'impianto (rotazione delle pale) e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente anche all'interno dell'area di impianto.
Ilatro Comune				X	Macchie e leccete lungo le colline aride e le vallate rocciose in ambiente di macchia mediterranea	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Incensaria Comune				X	macchie, margini boschivi, prati incolti ..	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Inula Vischiosa				X	tutti i tipi di suolo, nei terreni incolti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Iperico				X	luoghi erbosi e umidi, altre nei boschi ombrosi, altre ancora in località aride, argillose e <u>calcaree</u>	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Lampascione				X	campi abbandonati, bordi strade, incolti aridi.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Lassana Comune				X	campi incolti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Latte Di Gallina				X	Vigne, prati, oliveti, margini di viottoli e di boschi, aree antropizzate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Leccio				X	boschi di latifoglie cedui orti campi coltivati zone ruderali e arbusteti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Lentisco				X	adatto a tutti i substrati geologici	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Ligustro Commune				X	macchia mediterranea	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Lino Delle Fate				X	rupi, ghiaie, prati magri steppici	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Lino Spinato				X	boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Lisca Maggiore				X	paludi, stagni, fossi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.

Lupinella Comune				X	colture di cereali	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Malva Selvatica				X	bordi di sentieri e strade prati asciutti scarpate rupi e pietraie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Malvone Punteggiato				X	terreni coltivati incolti ruderi e margini di strade	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Marrubio Comune				X	campi siepi e incolti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Marruca				X	boschi termofili,	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Masticogna Latticifera				X	garighe, luoghi aridi e rocciosi, bordi stradali,	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Meliloto Bianco				X	ambienti ruderali e umidi, nei campi e nei prati, lungo i sentieri e lungo le rive dei corsi d'acqua	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Meliloto Comune				X	margini di stagni, fossati, acquitrini, in terreni umidi, freschi, in zone ombreggiate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Menta Campestre				X	campi e incolti aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Mercorella Comune				X	fossi, corsi d'acqua, luoghi ombrosi e umidi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Miglio Multifloro				X	luoghi erbosi, incolti, al margine dei coltivi, lungo le vie e i sentieri, ruderi, muri a secco	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Mordigallina				X	aree aride e semidesertiche e incolti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Morella Comune				X	incolti e ruderi, bordi dei sentieri e strade.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi

						totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Muscari Atlantico				X	terreni incolti e semiaridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Nappola Spinosa				X	incolti aridi e le aree ruderali	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Narciso Italiano				X	terreni incolti e semiaridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Nontiscordardimè Minore				X	Incolti, pascoli aridi, colture, giardini	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Ofride Verde Bruna				X	praterie ed incolti aridi, garighe e margini di macchia mediterranea	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Olivo				X	climi secchi su terreni poco rocciosi campi coltivati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Olmo Campestre				X	terreni asciutti e poco rocciosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Ombrellini Maggiori				X	terreni incolti e lungo le strade	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Ombrellino Pugliese				X	boscaglie di depressioni, alberature su bordi stradali	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Orchide Italica				X	incolti macchia	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Orchidea Piramidale				X	pascoli garighe macchie e boschi radi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Orchidea purpurea				X	boschi mesofili e xerofili, cespuglieti, radure, praterie, pascoli, bordi di vie e sentieri, argini di corsi d'acqua	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Orniello				X	boscaglie degradate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno

						dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Ortica				X	luoghi erbosi, boscaglie, garighe	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Orzo Bulboso				X	vicino ad abitazioni sentieri zone ombra e umide e boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Orzo Selvatico				X	vicino ad abitazioni sentieri zone ombra e umide e boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Pabbio Verticillato				X	zone fresche argillose vicino ad abitazioni sentieri zone ombra e umide e boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Paleo Comune				X	prati aridi, le boscaglie e le scarpate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Paleo Dei Montoni				X	Prati umidi e paludosi,	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Paleo Delle Garighe				X	garighe, le macchie degradate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Paleo Odoroso				X	lungo strade alla base dei muri in scarpate discariche e suoli sabbiosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Paleo Rupestre				X	prati aridi, le boscaglie e le scarpate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Paleo Splendente				X	Prati aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Papavero Comune				X	negli orti, nelle vigne, nei campi di mais, a volte lungo i sentieri, spesso anche in ambienti urbanizzati, in ambienti piuttosto caldi e umidi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Pastinaca				X	prati aridi boscaglie e scarpate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Perastro				X	campi e bordi di strade pascoli e gli incolti su terreni umidi; ma anche gli ambienti ruderali (sempre umidi)	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.

Perlina Gialla				X	prati aridi di tipo steppico	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Perlina Maggiore				X	prati, bordo strada, coltivi, scarpate ferroviarie, terreni limosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Perlina Minore				X	luoghi incolti, garighe e campi coltivati a grano	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Perpetuini D'italia				X	pascoli, incolti, garighe, luoghi sabbiosi e aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Peverina Dei Campi				X	bosco umido e semi-ombreggiato	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Piantaggine				X	boschi, siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Pimpinella				X	pascoli aridi e sassosi e ambienti ruderali	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Pino D'aleppo				X	prati giardini campi e lungo le strade	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Pino Domestico				X	prati margini boscaglie e siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Pino Silvestre				X	si adatta a diversi tipi di substrato	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Pioppo Bianco				X	terreni freschi e profondi e substrati poveri e asciutti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Pioppo Tremulo				X	boschi montani e di collina	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Pisello Selvatico				X	suoli incoerenti limosi-argillosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Piumino Nano				X	riva dei fiumi con un terreno sabbioso o calcareo	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.

Poligala				X	luoghi soleggiati erbosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Poligono Nodoso				X	cresce negli incolti, tra i muri a secco di campagna, nei prati, ai bordi delle strade, in terreni difficili con condizioni di siccità.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Polmonaria				X	boschi di latifoglie eliofile, nelle siepi e nei cespugli	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Portulaca				X	incolti e terreni di risulta nei pressi delle pietraie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Pratolina Comune				X	ambienti umidi, campi, colture e incolti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Prezzemolo Bastardo				X	luoghi ombrosi, boschi, praterie, siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Primula				X	boschi di latifoglie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Prugnolo Selvatico				X	cresce ai margini dei boschi e dei sentieri, in luoghi soleggiati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Pungitopo				X	leccete e nei boschi di caducifoglie termofili	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Radicchiella Capillare				X	incolti, i campi, le zone ruderali	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Radichella				X	ghiaioni, macereti, pietraie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Radichella Minore				X	incolti, bordi stradali, ruderi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Ranuncolo				X	giardini e prati alle zone paludose fino agli ambienti rocciosi e alle aree	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno

					incolte	dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Ranuncolo Millefoglio				X	luoghi a mezz'ombra, boschi, siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Raperonzolo Selvatico				X	giardini, prati, zone paludose, ambienti rocciosi e aree incolte	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Ravanello Selvatico				X	giardini, prati, zone paludose, ambienti rocciosi e aree incolte	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Reseda Comune				X	prati aridi , incolti ,lungo le vie e bordi dei campi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Robinia Pseudoacacia				X	boschi cedui puri, lungo scarpate, luoghi incolti, siepi, specie alloctona	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Romice Crespo				X	massicciate ferroviarie, bordi delle strade, incolti, zone ruderali, macerie, su terreni gessosi e calcarei	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Rosa Canina				X	boscaglie di faggio, abete, pino e querce a foglie caduche, gli arbusteti e le siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Rosmarino				X	macchia mediterranea	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Roverella				X	boschi e arbusteti aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Rovo Bluastro				X	boscaglie arbusteti e siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Rovo Comune				X	terreni acidi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Rovo Selvatico				X	zone molto boscose	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Ruchetta				X	boschi ripariali, forre, suoli boschivi umidificati in ambienti umidi ed ombrosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.

Rucola				X	incolti lungo i sentieri fasce ripariali e macerie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Rucola Selvatica				X	incolti colture cereali e orti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Saeppola Di Buenos Aires				X	lungo le strade, negli incolti aridi, ambienti ruderali, scarpate ma anche nei campi, colture e vigneti.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Salice Comune				X	vegetazioni ruderali, lungo i margini stradali, alla base di muri in pietra, sulle scarpate, nei coltivi, in giardini e parchi, su suoli superficiali aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Salice Rosso				X	paludi di canneti ai margini di laghi e fiumi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Salicone				X	boschi umidi e corsi d'acqua	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Salsapariglia				X	aree di bosco umido e dal greto di fiumi torrenti e ruscelli	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Salvia Comune				X	macchia mediterranea lecceta e gariga	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Salvia Dei Prati				X	pascoli magri, nei prati, nei luoghi sassosi, nelle radure	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Sambuco Commune				X	boschi umidi e terreni abbandonati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Sanguinella				X	margini dei boschi, lungo i sentieri	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Scardaccione				X	terreni calcarei sassosi e drenanti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Scorzonera Villosa				X	prati aridi e lande, su suoli argillosi aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.


Sedanina D'acqua				X	lungo le strade discariche e coltivi abbandonati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Senape Bianca				X	i prati aridi, gli incolti e lungo le vie e bordi dei campi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Senape Nera				X	campi e aree ruderali	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Senecio Comune				X	prossimità di fonti di acqua, fossi e acquitrini, nei pressi dei fontanili di campagna, sulle rive di fiumi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Serapide Lingua				X	Incolti, pascoli, garighe, arbusteti, macchia, radure, boschi aperti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Silene Bianca				X	campi coltivati, incolti, lungo bordi stradali, nei ruderi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Sonaglini Minore				X	macchie, incolti e radure	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Sorbo Domestico				X	pendii montuosi e foreste decidue	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Sorgo Selvatico				X	incolti, di zone ruderali e di coltivi abbandonati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Spergularia Comune				X	Incolti, sentieri battuti, luoghi sabbiosi,	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Speronella Comune				X	campi a quote comprese tra i 0-600 metri sul livello del mare	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Speronella Consolida				X	margini di campi di cereali e bordi di viottoli	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.

Stellina Dei Campi				X	sottobosco di faggete e boschi misti di latifoglie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Succiamele Delle Fave				X	margini di sentieri, incolti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Succiamele Ramoso				X	luoghi erbosi e sassosi dei piani collinare e in parte montano	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Sulla Comune			X		prati erbosi incolti, ma anche ai margini di strade sterrate e fossi	Impatto diretto basso. Probabile interferenza tra esercizio dell'impianto (rotazione delle pale) e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente anche all'interno dell'area di impianto.
Tamaro				X	colture incolti, parchi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Tamerice				X	ambienti litoranei e sui greti dei torrenti,	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Tarassaco Comune				X	pendii aridi e argillosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Terebinto				X	colture incolti, macchia mediterranea	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Tifa Minima				X	bordi di laghetti, stagni e ruscelli	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Trifoglio Irsuto				X	macchie, nelle garighe e in pascoli aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Trifoglio Bianco			X		prati erbosi, campi coltivati	Impatto diretto basso. Probabile interferenza tra esercizio dell'impianto (rotazione delle pale) e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente anche all'interno dell'area di impianto.
Trifoglio Campestre				X	boschi termofili pendii di rocce calcaree e aride	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Trifoglio Dei Prati				X	pascoli, incolti e bordi stradali.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Trifoglio Vulnerario				X	pascoli, prati aridi, pendii sassosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno

						dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Veccia Comune				X	prati sentieri radure pascoli e coltivi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Veccia Montanina			X		prati e ambienti ruderali, lungo scarpate o siepi	Impatto diretto basso. Probabile interferenza tra esercizio dell'impianto (rotazione delle pale) e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente anche all'interno dell'area di impianto.
Veccia Tentennina				X	Incolti, prati aridi, bordi stradali	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Veccia Viola Del Latte				X	prati e ambienti ruderali, lungo scarpate o siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Verbasco Coda Grossa			X		terreni incolti, ai margini delle coltivazioni, nei prati e nei pascoli.	Impatto diretto basso. Probabile interferenza tra esercizio dell'impianto (rotazione delle pale) e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente anche all'interno dell'area di impianto.
Verbena				X	margini campestri, radure boschive	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Vilucchio Bianco				X	colture erbacee, dei cereali, dei vigneti e degli incolti, sulle siepi, nelle radure dei boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Vilucchio Bicchierino				X	incolti, prati aridi bordi stradali	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Vilucchio Comune			X		luoghi erbosi, orti, incolti, margini stradali	Impatto diretto basso. Probabile interferenza tra esercizio dell'impianto (rotazione delle pale) e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente anche all'interno dell'area di impianto.
Vilucchio Elegantissimo				X	vegetazioni ruderali, discariche, margini stradali, muri, lastricati, aiuole, giardini	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Viola Bianca				X	luoghi aridi, macchia mediterranea, rupi, lungo sentieri, margini delle strade	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Viola Dei Campi				X	luoghi erbosi orti incolti e margini stradali	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.

Viola Mammola				X	luoghi erbosi ed incolti, margini boschivi, siepi,	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Viperina Azzurra				X	prati cespugli e incolti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, fuori dall'area di impianto.
Vite Comune				X	campi coltivati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Zafferano Selvatico				X	Prati e pascoli aridi, praterie rase del piano, querceti sub-mediterranei, vigne ed oliveti .	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra esercizio dell'impianto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente quasi totalmente all'interno dell'AVI, alcune piante presenti anche all'interno dell'area di impianto.
Zafferanone Selvatico			X		incolti aridi, gli oliveti e le vigne; ma anche in ambienti ruderali, scarpate, garighe e macchie basse.	Impatto diretto basso. Probabile interferenza tra esercizio dell'impianto (rotazione delle pale) e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente anche all'interno dell'area di impianto.
Zizzania			X		campi coltivati, colture di cereali	Impatto diretto basso. Probabile interferenza tra esercizio dell'impianto (rotazione delle pale) e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente anche all'interno dell'area di impianto.

Parco eolico Fenice fase di Esercizio Impatti diretti Flora		
<i>Grado di impatto</i>	<i>Specie</i>	<i>Percentuale</i>
<i>Impatto alto</i>	0	0%
<i>Impatto medio</i>	0	0%
<i>Impatto basso</i>	16	5%
<i>Impatto nullo</i>	286	95%



Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Flora e opere di progetto FASE DI ESERCIZIO						
Flora	Stima degli impatti INDIRETTI				Habitat	Note
	Alto	Medio	Basso	Nulla		
Acero Campestre				X	boschi meso-termofili	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Acero Minore				X	boschi termomesofili di latifoglie	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Aglio Delle Bisce			X		pendii rocciosi, terreni aridi, incolti e vigneti.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Aglio Italiano			X		macchie e i prati aridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Aglio Maggiore			X		boschi e ambienti umidi ombrosi, alla base di rupi ombrose e a volte ai margini di strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Aglio Pelosetto			X		macchie e cespuglieti. habitat di predilezione fuori dall'area di intervento	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ailanto			X		lungo i bordi delle strade, in ambiente urbano, in prossimità dei fiumi e ai margini del bosco, specie alloctona	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Alaterno			X		macchia mediterranea e garighe.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Amaranto Bianco			X		incolti, macerie, ruderi, grei fluviali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Amaranto Comune			X		orti coltivazioni incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ambretta Annuale			X		prati e pendii piuttosto magri, oppure sui margini dei sentieri.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ambretta Comune			X		Prati e pascoli, bordi dei sentieri, zone incolte	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Anemone Fior-Stella			X		radure e prati asciutti.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Arabetta Irsuta			X		terreni asciutti, poveri, nei prati aridi, negli ambienti rupestri e sui vecchi muri	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Arisaro Comune				X	luoghi a mezz'ombra, luoghi ombrosi, boschi a quote comprese tra i 0-800 metri sul livello del mare.	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Aristolochia Rotonda			X		campi incolti, prati e boscaglie.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Arrestabue			X		prati aridi, nei luoghi sassosi,	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Asfodelo Fistoloso			X		terreno con vegetazione rada, prati aridi e pascoli	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Asfodelo Mediterraneo			X		incolti garighe pascoli aridi terreni sassosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Asparago				X	macchie	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Asplenio				X	boschi e rupi ombrose fino oltre 2000 metri.	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Aspraggine			X		incolti aridi o umidi, ruderi, aree antropizzate, bordi di strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Assenzio Selvatico			X		prati stabili siepi e cespugli	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Asterisco				X	distese fangose	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Astralago Rosato			X		pendii aridi, pascoli	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Astro Autunnale			X		vegetazioni ruderali discontinue, che tollera anche suoli moderatamente salati, dal livello del mare agli 800 m circa.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Attaccamani			X		cresce lungo i bordi stradali, nei campi incolti, dal livello del mare fino a 2500 metri .	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Avena Altissima			X		prati stabili siepi e cespugli	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Avena Barbata			X		incolti margini campestri e garighe	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Avena Maggiore			X		campi, gli incolti e le stazioni ruderali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Avena Selvatica			X		prati campi di cereali e siepi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Bambagione Pubescente				X	prati stabili, a volte anche in ambienti umidi o palustri,	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Berretta Del Prete				X	boschi di latifoglie, siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Biancospino Comune				X	boschi xerofili boscaglie cespuglietti collinari e lungo pendii erbosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Bietola D'acqua				X	incolti e orti	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Bocca Di Lupo				X	boschi di latifoglie pinete e gineprai prati erbosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Boccione Maggiore			X		garighe prati aridi incolti e lungo le vie dei sentieri	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Borragine Comune			X		campi incolti siepi muri e margini di strada	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Borsa Pastore Comune			X		prati campi incolti lungo i muri delle case e sentieri	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Brunella			X		giardini, parchi pubblici, aiuole, bordo delle strade.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Bucaneve				X	boschi di latifoglie, cespuglietti e prati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Buglossa Azzurra			X		luoghi aridi, margini delle strade, suoli basici	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Buglossa Comune			X		incolti, ambienti disturbati, aree antropizzate, vigne e campi coltivati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Bugola			X		prati fertili e concimati, lungo siepi e margini dei sentieri, boschi di latifoglie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di

						manutenzione ordinaria e straordinaria.
Caglio Lucido			X		prati secchi, nei cespuglieti radi, nelle pinete	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Caglio Zolfino			X		Prati aridi e magri, lungo i sentieri, ai margini dei boschi, nelle zone antropizzate, nei luoghi sabbiosi e sassosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Calcatreppola			X		campi, garighe, margini stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Calcatreppola Ametistina			X		Pascoli e prati aridi, magri, sassosi e assolati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Calendula Dei Campi			X		prati incolti oliveti vigneti e bordi stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Camedrio Comune				X	prati aridi, i boschi radi e i pendii rocciosi.	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Camepizio			X		prati aridi, i pascoli e gli incolti; ma anche i campi e le colture.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Camomilla Bastarda			X		campi (culture di cereali), pascoli o luoghi incolti e abbandonati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Camomilla Comune			X		campi di cereali incolti e bordi di strada	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Camomilla Dei Tintori				X	conglomerati e affioramenti rocciosi assolati e aridi, nell'ambiente di boscaglia e macchia subcostiera.	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Camomilla Mezzana			X		aree incolte, le zone ruderali e i campi di cereali; ma anche le scarpate, le strade rurali e depositi di immondizie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Canna Comune				X	ambiente umido, vicini a fiumi e torrenti.	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Canna Di Palude				X	margini di laghi, fiumi, in ambienti paludosi e acquitrinosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cannuccia Di Palude				X	stagni rive dei laghi torbiere e lungo i fossati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cappellini Comuni			X		prati e campi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Caprifoglio				X	margini dei boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Caprifoglio Comune				X	boschi, nelle radure boschive o in aree boschive perturbate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Carciofo Selvatico			X		pascoli aridi incolti margini delle strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Cardo Asinino			X		radure margini di boschi lungo sentieri pascoli luoghi rocciosi e cespugliosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Cardo Campestre			X		campi e praterie incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Cardo Mariano			X		incolti bordi delle vie ambienti ruderali e scarpate	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Cardo Rosso			X		pascoli margini dei sentieri e macerie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Cardo Saettone			X		incolti, i bordi delle vie; ma anche gli ambienti ruderali e le scarpate	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Carice Villosa				X	rive e alvei, prati, ambienti umidi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di

						impianto
Carlina Raggio D'oro			X		prati aridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Carota			X		incolti, prati aridi, margini stradali e di fossi, ambienti ruderali, zone aperte e soleggiate.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Cascellore Comune				X	cresce nel bosco a mezz'ombra, lungo i margini boschivi soleggiate e le rive di corsi d'acqua.	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Centauro Minore			X		prati e pascoli pedemontani	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Centauro Giallo				X	terreni umidi e argillosi, si trova lungo bordi di viottoli e vicino a fossati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Centocchio Comune			X		coltivazioni ruderi e strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Centonchio Azzurro				X	terreni umidi e argillosi, si trova lungo bordi di viottoli e vicino a fossati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cerfoglio Inebriante			X		Luoghi incolti, siepi, macerie, bordi stradali boschivi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Cerro				X	boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cicerchia Bastarda			X		incolti e campi di frumento	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Cicerchia Dei Prati			X		prati aridi siepi e margini dei boschi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Cicerchia Selvatica				X	scarpate in ombra o ai margini del bosco	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di

						impianto
Cicerchiella			X		prati aridi siepi e margini dei boschi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ciclamino				X	boschi ombrosi di leccio e dalla macchia di cespugli	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cicoria Comune			X		margini di sentieri campi coltivati terreni incolti zone a macerie ambienti ruderali praterie e aree antropizzate	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Cicuta Maggiore				X	vicino a rigagnoli o siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cicutaria			X		incolti, bordi di strade, prati asciutti, vigne, suoli sabbiosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ciliegio				X	boschi di latifoglie	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cinquefoglia Comune			X		zone incolte prati erbosi e ruderi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Cinquefoglia Primaticcia				X	prati aridi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cipresso Sempreverde				X	coltivato per ornamento e rimboschimento, diffuso nei parchi, giardini e cimiteri	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cisto Di Creta				X	macchie mediterranee, nei prati aridi e nelle zone calcaree delle aree vicine al mare	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cisto Rosso				X	macchie e garighe dune costiere stabilizzate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Clematide Fiammella				X	luoghi a mezz'ombra, boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Clematide Vitalba				X	siepi macchia e boscaglia	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto

Cocomero Asinino			X		terreni sassosi e sabbiosi incolti aridi e macerie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Coda Di Cane			X		pascoli	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Coda Di Topo Comune			X		ambienti semi aridi boscaglie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Codolina Meridionale				X	prati stabili	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Corniolo				X	sponde dei torrenti, ai margini dei boschi di latifoglie, negli arbusteti	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Crescione D'acqua				X	corsi d'acqua	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Crisantemo Campestre			X		campi incolti vigne e uliveti bordo strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Crisantemo Giallo			X		luoghi incolti e le strade abbandonate e, di solito, si ritrova in prossimità di pozze d'acqua poco profonde	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Damigella Scapigliata			X		incolti asciutti, vigneti, campi e prati aridi, bordo sentieri	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Dente Di Leone			X		prati luoghi erbosi margini delle strade e boschi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Edera				X	sottoboschi ombrosi lungo i tronchi degli alberi e a ridosso di vecchi edifici	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Eliotropio			X		discariche, maggese e stoppie lungo strade e rocce.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Elleboro Puzzolente				X	margini dei boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Equiseto				X	terreni incolti umidi fossi scarpate ambienti ruderali terreni sabbiosi e argillosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Erba Di San Guglielmo				X	marginie dei boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Erba Falsa			X		orti, vigneti, colture sarchiate, bordi stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Erba Marzolina Comune			X		prati falciabili bordi stradali incolti siepi e margini di bosco	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Erba Medica			X		prati aridi, incolti, luoghi erbosi e al bordo dei campi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Erba Medica Lupulina			X		margini di sentieri campi coltivati e incolti aridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Erba Perla Minore			X		incolti, pascoli aridi, garighe, dal livello del mare alla fascia montana.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Erba Ruchetta				X	incolti, luoghi sabbiosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Erba Storna Perfogliata			X		campi di cereali, gli orti e le zone ruderali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Erba Vajola			X		campi incolti prati e fossati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Eucalipto				X	aree paludose, bonifiche specie alloctona	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Euforbia Calenzuola			X		incolti, coltivi, giardini, terreni degradati, aree antropiche	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile

						interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Euforbia Falcata			X		incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Falsa Ortica			X		orti vigneti colture sarchiate e bordi stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Farinello Comune			X		zone incolte e ruderali; ma anche le colture tipo uliveti e vigneti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Festuca Mediterranea			X		Radure e margini di boschi mediterranei Prati da freschi a secchi, anche sassosi, macereti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Fico D'india			X		terreni misti e drenati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Fienarola			X		prati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Fienarola Annuale			X		praterie, prati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Finocchiaccio			X		terreni aridi e calcarei delle zone collinari	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Finocchio Selvatico			X		angoli aridi sassosi assolati zone rocciose e vecchi muri a secco	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Fior Di Vespa				X	praterie ed incolti aridi, garighe e margini di macchia mediterranea	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Fiorrancio			X		incolti vigne uliveti campi e bordi delle strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Forasacco Eretto			X		habitat aperti, prati e praterie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Forasacco Peloso				X	prati, siepi e terreni abbandonati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Forasacco Pendolino			X		incolti, i prati aridi e le siepi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Frassino				X	boschi umidi, valloni freschi su terreni profondi e freschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Fumaria Comune			X		campi, prati, lungo le strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Gallinella Comune			X		orti, giardini, coltivi; anche nei prati aridi steppici,	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Geranio Volgare			X		incolti, pascoli aridi.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Geranio Malvaccino			X		vegetazioni ruderali e terreni incolti, giardini, orti e vigneti, su suoli argillosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Giacinto Romano			X		luoghi erbosi, prati, campi, vigneti.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Gigaro Chiaro			X		fossi boschi vigneti oliveti e siepi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ginepro				X	macchia mediterranea e della gariga	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ginestra Dei Carbonai				X	boschi, brughiere, lungo le scarpate rocciose o sabbiose	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto

Ginestra Odorosa				X	radure, terreni aridi ben adattabile a tutti i terreni	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ginestrella Comune				X	radure garighe pinete e leccete	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ginestrino				X	prati umidi pascoli e margini stradali	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Girasole Comune			X		campi coltivati, orti zone abbandonate ambienti ruderali strade rurali e scarpate	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Giunco Nodoso				X	paludi, fossi e prati umidi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Giunco Tenace				X	laghi, fiumi, paludi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Gladiolo Dei Campi				X	aree ripariali anche marittime, fiumi e fossati, paludi, prati o pascoli con ristagni d'acqua	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Gramigna			X		campi coltivati a cereali, degli oliveti e degli incolti erbosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Grano Duro			X		campi coltivati, terreni argillosi e umidi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Grano Villoso			X		incolti, i pascoli aridi, i bordi delle vie e i cumuli di macerie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Grespino Comune			X		campi coltivati.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Grespino Spinoso			X		colture concimate, i muri, i bordi delle strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ilatro Comune				X	Macchie e leccete lungo le colline aride e le vallate rocciose in ambiente di macchia	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto

					mediterranea	
Incensaria Comune				X	macchie, margini boschivi, prati incolti ..	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Inula Vischiosa			X		tutti i tipi di suolo, nei terreni incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Iperico				X	luoghi erbosi e umidi, altre nei boschi ombrosi, altre ancora in località aride, argillose e calcaree	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lampascione			X		campi abbandonati, bordi strade, incolti aridi.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Lassana Comune			X		campi incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Latte Di Gallina			X		Vigne, prati, oliveti, margini di viottoli e di boschi, aree antropizzate	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Leccio				X	boschi di latifoglie cedui orti campi coltivati zone ruderali e arbusteti	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lentisco				X	adatto a tutti i substrati geologici	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ligustro Commune				X	macchia mediterranea	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lino Delle Fate				X	rupi, ghiaie, prati magri steppici	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lino Spinato				X	boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lisca Maggiore				X	paludi, stagni, fossi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lupinella Comune			X		colture di cereali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile

						interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Malva Selvatica			X		bordi di sentieri e strade prati asciutti scarpate rupi e pietraie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Malvone Punteggiato			X		terreni coltivati incolti ruderi e margini di strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Marrubio Comune			X		campi siepi e incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Marruca				X	boschi termofili,	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Masticogna Latticifera			X		garighe, luoghi aridi e rocciosi, bordi stradali,	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Meliloto Bianco				X	ambienti ruderali e umidi, nei campi e nei prati, lungo i sentieri e lungo le rive dei corsi d'acqua	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Meliloto Comune				X	margini di stagni, fossati, acquitrini, in terreni umidi, freschi, in zone ombreggiate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Menta Campestre			X		campi e incolti aridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Mercorella Comune				X	fossi, corsi d'acqua, luoghi ombrosi e umidi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Miglio Multifloro			X		luoghi erbosi, incolti, al margine dei coltivi, lungo le vie e i sentieri, ruderi, muri a secco	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Mordigallina			X		aree aride e semidesertiche e incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Morella Comune			X		incolti e ruderi, bordi dei sentieri e strade.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile

						interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Muscari Atlantico			X		terreni incolti e semiaridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Nappola Spinosa			X		incolti aridi e le aree ruderali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Narciso Italiano			X		terreni incolti e semiaridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Nontiscordardimè Minore			X		Incolti, pascoli aridi, colture, giardini	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ofride Verde Bruna				X	praterie ed incolti aridi, garighe e margini di macchia mediterranea	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Olivo				X	climi secchi su terreni poco rocciosi campi coltivati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Olmo Campestre				X	terreni asciutti e poco rocciosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ombrellini Maggiori			X		terreni incolti e lungo le strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ombrellino Pugliese			X		boscaglie di depressioni, alberature su bordi stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Orchide Italica				X	incolti macchia	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Orchidea Piramidale				X	pascoli garighe macchie e boschi radi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Orchidea purpurea				X	boschi mesofili e xerofili, cespuglieti, radure, praterie, pascoli, bordi di vie e sentieri, argini di corsi d'acqua	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto

Orniello				X	boscaglie degradate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ortica			X		luoghi erbosi, boscaglie, garighe	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Orzo Bulboso				X	vicino ad abitazioni sentieri zone ombra e umide e boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Orzo Selvatico				X	vicino ad abitazioni sentieri zone ombra e umide e boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pabbio Verticillato				X	zone fresche argillose vicino ad abitazioni sentieri zone ombra e umide e boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Paleo Comune			X		prati aridi, le boscaglie e le scarpate	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Paleo Dei Montoni				X	Prati umidi e paludosi,	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Paleo Delle Garighe				X	garighe, le macchie degradate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Paleo Odoroso			X		lungo strade alla base dei muri in scarpate discariche e suoli sabbiosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Paleo Rupestre				X	prati aridi, le boscaglie e le scarpate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Paleo Splendente			X		Prati aridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Papavero Comune			X		negli orti, nelle vigne, nei campi di mais, a volte lungo i sentieri, spesso anche in ambienti urbanizzati, in ambienti piuttosto caldi e umidi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Pastinaca				X	prati aridi boscaglie e scarpate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto

Perastro			X		campi e bordi di strade pascoli e gli incolti su terreni umidi; ma anche gli ambienti ruderali (sempre umidi)	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Perlina Gialla			X		prati aridi di tipo steppico	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Perlina Maggiore			X		prati, bordo strada, coltivi, scarpate ferroviarie, terreni limosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Perlina Minore			X		luoghi incolti, garighe e campi coltivati a grano	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Perpetuini D'italia				X	pascoli, incolti, garighe, luoghi sabbiosi e aridi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Peverina Dei Campi				X	bosco umido e semi-ombreggiato	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Piantaggine				X	boschi, siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pimpinella			X		pascoli aridi e sassosi e ambienti ruderali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Pino D'aleppo				X	prati giardini campi e lungo le strade	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pino Domestico				X	prati margini boscaglie e siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pino Silvestre				X	si adatta a diversi tipi di substrato	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pioppo Bianco				X	terreni freschi e profondi e substrati poveri e asciutti	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pioppo Tremulo				X	boschi montani e di collina	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto

Pisello Selvatico				X	suoli incoerenti limosi-argillosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Piumino Nano				X	riva dei fiumi con un terreno sabbioso o calcareo	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Poligala			X		luoghi soleggiati erbosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Poligono Nodoso			X		cresce negli incolti, tra i muri a secco di campagna, nei prati, ai bordi delle strade, in terreni difficili con condizioni di siccità.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Polmonaria				X	boschi di latifoglie eliofile, nelle siepi e nei cespugli	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Portulaca			X		incolti e terreni di risulta nei pressi delle pietraie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Pratolina Comune			X		ambienti umidi, campi, colture e incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Prezzemolo Bastardo			X		luoghi ombrosi, boschi, praterie, siepi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Primula				X	boschi di latifoglie	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Prugnolo Selvatico				X	cresce ai margini dei boschi e dei sentieri, in luoghi soleggiati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pungitopo				X	leccete e nei boschi di caducifoglie termofili	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Radicchiella Capillare			X		incolti, i campi, le zone ruderali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Radichella				X	ghiaioni, macereti, pietraie	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di

						impianto
Radichella Minore			X		incolti, bordi stradali, ruderi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ranuncolo				X	giardini e prati alle zone paludose fino agli ambienti rocciosi e alle aree incolte	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ranuncolo Millefoglio				X	luoghi a mezz'ombra, boschi, siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Raperonzolo Selvatico				X	giardini, prati, zone paludose, ambienti rocciosi e aree incolte	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ravanello Selvatico				X	giardini, prati, zone paludose, ambienti rocciosi e aree incolte	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Reseda Comune			X		prati aridi , incolti ,lungo le vie e bordi dei campi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Robinia Pseudoacacia				X	boschi cedui puri, lungo scarpate, luoghi incolti, siepi, specie alloctona	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Romice Crespo			X		massicciate ferroviarie, bordi delle strade, incolti, zone ruderali, macerie, su terreni gessosi e calcarei	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Rosa Canina				X	boscaglie di faggio, abete, pino e querce a foglie caduche, gli arbusteti e le siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rosmarino			X		macchia mediterranea	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Roverella				X	boschi e arbusteti aridi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rovo Bluastro				X	boscaglie arbusteti e siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rovo Comune				X	terreni acidi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto

Rovo Selvatico				X	zone molto boschive	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ruchetta				X	boschi ripariali, forre, suoli boschivi umidificati in ambienti umidi ed ombrosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rucola			X		incolti lungo i sentieri fasce ripariali e macerie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Rucola Selvatica			X		incolti colture cereali e orti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Saepola Di Buenos Aires			X		lungo le strade, negli incolti aridi, ambienti ruderali, scarpate ma anche nei campi, colture e vigneti.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Salice Comune				X	vegetazioni ruderali, lungo i margini stradali, alla base di muri in pietra, sulle scarpate, nei coltivi, in giardini e parchi, su suoli superficiali aridi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salice Rosso				X	paludi di canneti ai margini di laghi e fiumi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salicone				X	boschi umidi e corsi d'acqua	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salsapariglia				X	aree di bosco umido e dal greto di fiumi torrenti e ruscelli	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salvia Comune				X	macchia mediterranea lecceta e gariga	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salvia Dei Prati				X	pascoli magri, nei prati, nei luoghi sassosi, nelle radure	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Sambuco Comune				X	boschi umidi e terreni abbandonati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Sanguinella				X	margini dei boschi, lungo i sentieri	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto


Scardaccione			X		terreni calcarei sassosi e drenanti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Scorzonera Villosa			X		prati aridi e lande, su suoli argillosi aridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Sedanina D'acqua			X		lungo le strade discariche e coltivi abbandonati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Senape Bianca			X		i prati aridi, gli incolti e lungo le vie e bordi dei campi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Senape Nera			X		campi e aree ruderali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Senecio Comune				X	prossimità di fonti di acqua, fossi e acquitrini, nei pressi dei fontanili di campagna, sulle rive di fiumi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Serapide Lingua				X	Incolti, pascoli, garighe, arbusteti, macchia, radure, boschi aperti	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Silene Bianca			X		campi coltivati, incolti, lungo bordi stradali, nei ruderi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Sonaglini Minore			X		macchie, incolti e radure	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Sorbo Domestico				X	pendii montuosi e foreste decidue	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Sorgo Selvatico			X		incolti, di zone ruderali e di coltivi abbandonati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Spergularia Comune			X		Incolti, sentieri battuti, luoghi sabbiosi,	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di

						manutenzione ordinaria e straordinaria.
Speronella Comune			X		campi a quote comprese tra i 0-600 metri sul livello del mare	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Speronella Consolida			X		marginie di campi di cereali e bordi di viottoli	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Stellina Dei Campi				X	sottobosco di faggete e boschi misti di latifoglie	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Succiamele Delle Fave			X		margini di sentieri, incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Succiamele Ramoso				X	luoghi erbosi e sassosi dei piani collinare e in parte montano	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Sulla Comune			X		prati erbosi incolti, ma anche ai margini di strade sterrate e fossi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Tamaro			X		colture incolti, parchi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Tamerice				X	ambienti litoranei e sui greti dei torrenti,	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Tarassaco Comune			X		pendii aridi e argillosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Terebinto				X	colture incolti, macchia mediterranea	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Tifa Minima				X	bordi di laghetti, stagni e ruscelli	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Trifoglino Irsuto				X	macchie, nelle garighe e in pascoli aridi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto

Trifoglio Bianco			X		prati erbosi, campi coltivati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Trifoglio Campestre			X		boschi termofili pendii di rocce calcaree e aride	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Trifoglio Dei Prati			X		pascoli, incolti e bordi stradali.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Trifoglio Vulnerario			X		pascoli, prati aridi, pendii sassosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Veccia Comune			X		prati sentieri radure pascoli e coltivi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Veccia Montanina			X		prati e ambienti ruderali, lungo scarpate o siepi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Veccia Tentennina			X		Incolti, prati aridi, bordi stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Veccia Viola Del Latte			X		prati e ambienti ruderali, lungo scarpate o siepi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Verbasco Coda Grossa			X		terreni incolti, ai margini delle coltivazioni, nei prati e nei pascoli.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Verbena				X	margini campestri, radure boschive	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Vilucchio Bianco			X		colture erbacee, dei cereali, dei vigneti e degli incolti, sulle siepi, nelle radure dei boschi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Vilucchio Bicchierino			X		incolti, prati aridi bordi stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile

						interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Vilucchio Comune			X		luoghi erbosi, orti, incolti, margini stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Vilucchio Elegantissimo			X		vegetazioni ruderali, discariche, margini stradali, muri, lastricati, aiuole, giardini	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Viola Bianca				X	luoghi aridi, macchia mediterranea, rupi, lungo sentieri, margini delle strade	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Viola Dei Campi			X		luoghi erbosi orti incolti e margini stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Viola Mammola				X	luoghi erbosi ed incolti, margini boschivi, siepi,	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Viperina Azzurra				X	prati cespugli e incolti	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra rotazione delle pale e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto
Vite Comune			X		campi coltivati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Zafferano Selvatico			X		Prati e pascoli aridi, praterie rase del piano, querceti sub-mediterranei, vigne ed oliveti .	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Zafferanone Selvatico			X		incolti aridi, gli oliveti e le vigne; ma anche in ambienti ruderali, scarpate, garighe e macchie basse.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Zizzania			X		campi coltivati, colture di cereali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Parco eolico Fenice fase di Esercizio Impatti Indiretti Flora		
<i>Grado di impatto</i>	<i>Specie</i>	<i>Percentuale</i>
<i>Impatto alto</i>	0	0%
<i>Impatto medio</i>	0	0%
<i>Impatto basso</i>	174	58%
<i>Impatto nullo</i>	128	42%



Nb: la fase di cantiere e di dismissioni per le loro tipologie di interventi ed azioni, nelle fasi operative, impegnano gli stessi mezzi ed attrezzature ed agiscono sullo stesso suolo. Di conseguenza la stima dei probabili impatti sia diretti che indiretti risultano simili.

Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Flora e opere di progetto FASE DI DISMISSIONE						
Flora	Stima degli impatti DIRETTI				Habitat	Note
	Alto	Medio	Basso	Nulla		
Acero Campestre				X	boschi meso-termofili	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Acero Minore				X	boschi termomesofili di latifoglie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Aglione Delle Bisce				X	pendii rocciosi, terreni aridi, incolti e vigneti.	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Aglione Italiano				X	macchie e i prati aridi	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Aglione Maggiore				X	boschi e ambienti umidi ombrosi, alla base di rupi ombrose e a volte ai margini di strade	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Aglione Pelosetto				X	macchie e cespuglieti. habitat di predilezione fuori dall'area di intervento	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Ailanto			X		lungo i bordi delle strade, in ambiente urbano, in prossimità dei fiumi e ai margini del bosco, specie alloctona	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Alaterno				X	macchia mediterranea e garighe.	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto

Amaranto Bianco				X	incolti, macerie, rudere, gri fluviali	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Amaranto Comune			X		orti coltivazioni incolti	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Ambretta Annuale				X	prati e pendii piuttosto magri, oppure sui margini dei sentieri.	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Ambretta Comune				X	Prati e pascoli, bordi dei sentieri, zone incolte	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Anemone Fior-Stella			X		radure e prati asciutti.	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Arabetta Irsuta				X	terreni asciutti, poveri, nei prati aridi, negli ambienti rupestri e sui vecchi muri	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Arisaro Comune				X	luoghi a mezz'ombra, luoghi ombrosi, boschi a quote comprese tra i 0-800 metri sul livello del mare.	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Aristolochia Rotonda				X	campi incolti, prati e boscaglie.	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Arrestabue			X		prati aridi, nei luoghi sassosi,	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Asfodelo Fistoloso			X		terreno con vegetazione rada, prati aridi e pascoli	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Asfodelo Mediterraneo			X		incolti garighe pascoli aridi terreni sassosi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Asparago				X	macchie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori

						dall'area di impianto
Asplenio				X	boschi e rupi ombrose fino oltre 2000 metri.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Aspraggine			X		incolti aridi o umidi, ruderi, aree antropizzate, bordi di strade	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Assenzio Selvatico			X		prati stabili siepi e cespugli	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Asterisco				X	distese fangose	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Astralago Rosato				X	pendii aridi, pascoli	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Astro Autunnale				X	vegetazioni ruderali discontinue, che tollera anche suoli moderatamente salati, dal livello del mare agli 800 m circa.	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Attaccamani			X		cresce lungo i bordi stradali, nei campi incolti, dal livello del mare fino a 2500 metri .	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Avena Altissima			X		prati stabili siepi e cespugli	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Avena Barbata			X		incolti margini campestri e garighe	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Avena Maggiore			X		campi, gli incolti e le stazioni ruderali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Avena Selvatica			X		prati campi di cereali e siepi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i

						lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Bambagione Pubescente				X	prati stabili, a volte anche in ambienti umidi o palustri,	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Berretta Del Prete				X	boschi di latifoglie, siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Biancospino Comune				X	boschi xerofili boscaglie cespuglietti collinari e lungo pendii erbosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Bietola D'acqua				X	incolti e orti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Bocca Di Lupo				X	boschi di latifoglie pinete e gineprai prati erbosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Boccione Maggiore			X		garighe prati aridi incolti e lungo le vie dei sentieri	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Borragine Comune			X		campi incolti siepi muri e margini di strada	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Borsa Pastore Comune			X		prati campi incolti lungo i muri delle case e sentieri	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Brunella				X	giardini, parchi pubblici, aiuole, bordo delle strade.	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Bucaneve				X	boschi di latifoglie, cespuglietti e prati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Buglossa Azzurra			X		luoghi aridi, margini delle strade, suoli basici	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto

Buglossa Comune			X		incolti, ambienti disturbati, aree antropizzate, vigne e campi coltivati	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Bugola				X	prati fertili e concimati, lungo siepi e margini dei sentieri, boschi di latifoglie	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Caglio Lucido				X	prati secchi, nei cespuglieti radi, nelle pinete	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Caglio Zolfino				X	Prati aridi e magri, lungo i sentieri, ai margini dei boschi, nelle zone antropizzate, nei luoghi sabbiosi e sassosi	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Calcatreppola				X	campi, garighe, margini stradali	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Calcatreppola Ametistina				X	Pascoli e prati aridi, magri, sassosi e assolati	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Calendula Dei Campi			X		prati incolti oliveti vigneti e bordi stradali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Camedrio Comune				X	prati aridi, i boschi radi e i pendii rocciosi.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Camepizio			X		prati aridi, i pascoli e gli incolti; ma anche i campi e le colture.	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Camomilla Bastarda			X		campi (culture di cereali), pascoli o luoghi incolti e abbandonati	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Camomilla Comune			X		campi di cereali incolti e bordi di strada	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Camomilla Dei				X	conglomerati e affioramenti rocciosi assolati e aridi, nell' ambiente di	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori

Tintori					boscaglia e macchia subcostiera.	dall'area di impianto
Camomilla Mezzana				X	aree incolte, le zone ruderali e i campi di cereali; ma anche le scarpate, le strade rurali e depositi di immondizie	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Canna Comune				X	ambiente umido, vicini a fiumi e torrenti.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Canna Di Palude				X	margini di laghi, fiumi, in ambienti paludosi e acquitrinosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cannuccia Di Palude				X	stagni rive dei laghi torbiere e lungo i fossati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cappellini Comuni			X		prati e campi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Caprifoglio				X	margini dei boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Caprifoglio Comune				X	boschi, nelle radure boschive o in aree boschive perturbate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Carciofo Selvatico			X		pascoli aridi incolti margini delle strade	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Cardo Asinino			X		radure margini di boschi lungo sentieri pascoli luoghi rocciosi e cespugliosi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Cardo Campestre			X		campi e praterie incolti	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Cardo Mariano			X		incolti bordi delle vie ambienti ruderali e scarpate	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto

Cardo Rosso			X		pascoli margini dei sentieri e macerie	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Cardo Saettone		X			incolti, i bordi delle vie; ma anche gli ambienti ruderali e le scarpate	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Carice Villosa				X	rive e alvei, prati, ambienti umidi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Carlina Raggio D'oro			X		prati aridi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Carota				X	incolti, prati aridi, margini stradali e di fossi, ambienti ruderali, zone aperte e soleggiate.	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Cascellore Comune				X	cresce nel bosco a mezz'ombra, lungo i margini boschivi soleggiate e le rive di corsi d'acqua.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Centauro Minore		X			prati e pascoli pedemontani	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Centauro Giallo				X	terreni umidi e argillosi, si trova lungo bordi di viottoli e vicino a fossati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Centocchio Comune			X		coltivazioni ruderi e strade	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Centonchio Azzurro				X	terreni umidi e argillosi, si trova lungo bordi di viottoli e vicino a fossati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cerfoglio Inebriante				X	Luoghi incolti, siepi, macerie, bordi stradali boschivi	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Cerro				X	boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cicerchia Bastarda			X		incolti e campi di frumento	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione

						della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Cicerchia Dei Prati			X		prati aridi siepi e margini dei boschi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Cicerchia Selvatica				X	scarpate in ombra o ai margini del bosco	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cicerchiella			X		prati aridi siepi e margini dei boschi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Ciclamino				X	boschi ombrosi di leccio e dalla macchia di cespugli	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cicoria Comune			X		margini di sentieri campi coltivati terreni incolti zone a macerie ambienti ruderali praterie e aree antropizzate	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Cicuta Maggiore				X	vicino a rigagnoli o siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cicutaria			X		incolti, bordi di strade, prati asciutti, vigne, suoli sabbiosi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Ciliegio				X	boschi di latifoglie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cinquefoglia Comune			X		zone incolte prati erbosi e ruderi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Cinquefoglia Primaticcia				X	prati aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cipresso Sempreverde				X	coltivato per ornamento e rimboschimento, diffuso nei parchi, giardini e cimiteri	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Cisto Di Creta				X	macchie mediterranee, nei prati aridi e nelle zone calcaree delle aree vicine al mare	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cisto Rosso				X	macchie e garighe dune costiere stabilizzate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Clematide Fiammella				X	luoghi a mezz'ombra, boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Clematide Vitalba				X	siepi macchia e boscaglia	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cocomero Asinino			X		terreni sassosi e sabbiosi incolti aridi e macerie	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Coda Di Cane				X	pascoli	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Coda Di Topo Comune				X	ambienti semi aridi boscaglie	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Codolina Meridionale				X	prati stabili	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Corniolo				X	sponde dei torrenti, ai margini dei boschi di latifoglie, negli arbusteti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Crescione D'acqua				X	corsi d'acqua	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Crisantemo Campestre			X		campi incolti vigne e uliveti bordo strade	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Crisantemo Giallo			X		luoghi incolti e le strade abbandonate e, di solito, si ritrova in prossimità di pozze d'acqua poco profonde	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Damigella Scapigliata			X		incolti asciutti, vigneti, campi e prati aridi, bordo sentieri	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione

						della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Dente Di Leone			X		prati luoghi erbosi margini delle strade e boschi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Edera				X	sottoboschi ombrosi lungo i tronchi degli alberi e a ridosso di vecchi edifici	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Eliotropio			X		discariche, maggese e stoppie lungo strade e rocce.	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Elleboro Puzzolente				X	margini dei boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Equiseto				X	terreni incolti umidi fossi scarpate ambienti ruderali terreni sabbiosi e argillosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Erba Di San Guglielmo				X	marginie dei boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Erba Falsa		X			orti, vigneti, colture sarchiate, bordi stradali	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Erba Marzolina Comune			X		prati falciabili bordi stradali incolti siepi e margini di bosco	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Erba Medica			X		prati aridi, incolti, luoghi erbosi e al bordo dei campi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Erba Medica Lupulina			X		margini di sentieri campi coltivati e incolti aridi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Erba Perla Minore				X	incolti, pascoli aridi, garighe, dal livello del mare alla fascia montana.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Erba Ruchetta				X	incolti, luoghi sabbiosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Erba Storna Perfogliata			X		campi di cereali, gli orti e le zone ruderali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Erba Vajola			X		campi incolti prati e fossati	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Eucalipto				X	aree paludose, bonifiche specie alloctona	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Euforbia Calenzuola			X		incolti, coltivi, giardini, terreni degradati, aree antropiche	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Euforbia Falcata				X	incolti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Falsa Ortica			X		orti vigneti colture sarchiate e bordi stradali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Farinello Comune			X		zone incolte e ruderali; ma anche le colture tipo uliveti e vigneti	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Festuca Mediterranea				X	Radure e margini di boschi mediterranei Prati da freschi a secchi, anche sassosi, macereti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Fico D'india				X	terreni misti e drenati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Fienarola			X		prati	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto

Fienarola Annuale			X		praterie, prati	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Finocchiaccio			X		terreni aridi e calcarei delle zone collinari	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Finocchio Selvatico			X		angoli aridi sassosi assolati zone rocciose e vecchi muri a secco	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Fior Di Vespa				X	praterie ed incolti aridi, garighe e margini di macchia mediterranea	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Fiorrancio			X		incolti vigne oliveti campi e bordi delle strade	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Forasacco Eretto			X		habitat aperti, prati e praterie	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Forasacco Peloso				X	prati, siepi e terreni abbandonati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Forasacco Pendolino			X		incolti, i prati aridi e le siepi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Frassino				X	boschi umidi, valloni freschi su terreni profondi e freschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Fumaria Comune		X			campi, prati, lungo le strade	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Gallinella Comune			X		orti, giardini, coltivi; anche nei prati aridi steppici,	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione

						della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Geranio Volgare				X	incolti, pascoli aridi.	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Geranio Malvaccino			X		vegetazioni ruderali e terreni incolti, giardini, orti e vigneti, su suoli argillosi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Giacinto Romano			X		luoghi erbosi, prati, campi, vigneti.	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Gigaro Chiaro			X		fossi boschi vigneti oliveti e siepi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Ginepro				X	macchia mediterranea e della gariga	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ginestra Dei Carbonai				X	boschi, brughiere, lungo le scarpate rocciose o sabbiose	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ginestra Odorosa				X	radure, terreni aridi ben adattabile a tutti i terreni	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ginestrella Comune				X	radure garighe pinete e leccete	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ginestrino				X	prati umidi pascoli e margini stradali	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Girasole Comune		X			campi coltivati, orti zone abbandonate ambienti ruderali strade rurali e scarpate	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Giunco Nodoso				X	paludi, fossi e prati umidi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Giunco Tenace				X	laghi, fiumi, paludi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Gladiolo Dei Campi				X	aree ripariali anche marittime, fiumi e fossati, paludi, prati o pascoli con ristagni d'acqua	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Gramigna			X		campi coltivati a cereali, degli oliveti e degli incolti erbosi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Grano Duro		X			campi coltivati, terreni argillosi e umidi	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Grano Villoso		X			incolti, i pascoli aridi, i bordi delle vie e i cumuli di macerie	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Grespino Comune		X			campi coltivati.	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Grespino Spinoso		X			colture concimate, i muri, i bordi delle strade	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Ilatro Comune				X	Macchie e leccete lungo le colline aride e le vallate rocciose in ambiente di macchia mediterranea	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Incensaria Comune				X	macchie, margini boschivi, prati incolti ..	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Inula Vischiosa			X		tutti i tipi di suolo, nei terreni incolti	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Iperico				X	luoghi erbosi e umidi, altre nei boschi ombrosi, altre ancora in località aride, argillose e <u>calcaree</u>	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lampascione			X		campi abbandonati, bordi strade, incolti aridi.	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Lassana Comune				X	campi incolti	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Latte Di Gallina			X		Vigne, prati, oliveti, margini di viottoli e di boschi, aree antropizzate	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione

						della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Leccio				X	boschi di latifoglie cedui orti campi coltivati zone ruderali e arbusteti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lentisco				X	adatto a tutti i substrati geologici	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ligustro Comune				X	macchia mediterranea	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lino Delle Fate				X	rupi, ghiaie, prati magri steppici	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lino Spinato				X	boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lisca Maggiore				X	paludi, stagni, fossi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Loglio Comune				X	rive di stagni e canneti, acque ferme o lentamente correnti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lupinella Comune			X		colture di cereali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Malva Selvatica			X		bordi di sentieri e strade prati asciutti scarpate rupi e pietraie	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Malvone Punteggiato			X		terreni coltivati incolti ruderi e margini di strade	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Marrubio Comune			X		campi siepi e incolti	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Marruca				X	boschi termofili,	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori

						dall'area di impianto
Masticogna Latticifera			X		garighe, luoghi aridi e rocciosi, bordi stradali,	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Meliloto Bianco				X	ambienti ruderali e umidi, nei campi e nei prati, lungo i sentieri e lungo le rive dei corsi d'acqua	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Meliloto Comune				X	margini di stagni, fossati, acquitrini, in terreni umidi, freschi, in zone ombreggiate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Menta Campestre			X		campi e incolti aridi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Mercorella Comune				X	fossi, corsi d'acqua, luoghi ombrosi e umidi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Miglio Multifloro			X		luoghi erbosi, incolti, al margine dei coltivi, lungo le vie e i sentieri, ruderi, muri a secco	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Mordigallina				X	aree aride e semidesertiche e incolti	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Morella Comune			X		incolti e ruderi, bordi dei sentieri e strade.	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Muscari Atlantico			X		terreni incolti e semiaridi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Nappola Spinosa			X		incolti aridi e le aree ruderali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Narciso Italiano			X		terreni incolti e semiaridi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i

						lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Nontiscordardimè Minore				X	Incolti, pascoli aridi, colture, giardini	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Ofride Verde Bruna				X	praterie ed incolti aridi, garighe e margini di macchia mediterranea	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Olivo				X	climi secchi su terreni poco rocciosi campi coltivati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Olmo Campestre				X	terreni asciutti e poco rocciosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ombrellini Maggiori			X		terreni incolti e lungo le strade	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Ombrellino Pugliese			X		boscaglie di depressioni, alberature su bordi stradali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Orchide Italica				X	incolti macchia	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Orchidea Piramidale				X	pascoli garighe macchie e boschi radi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Orchidea purpurea				X	boschi mesofili e xerofili, cespuglieti, radure, praterie, pascoli, bordi di vie e sentieri, argini di corsi d'acqua	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Orniello				X	boscaglie degradate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ortica			X		luoghi erbosi, boscaglie, garighe	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Orzo Bulboso				X	vicino ad abitazioni sentieri zone ombra e umide e boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori

						dall'area di impianto
Orzo Selvatico				X	vicino ad abitazioni sentieri zone ombra e umide e boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pabbio Verticillato				X	zone fresche argillose vicino ad abitazioni sentieri zone ombra e umide e boschi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Paleo Comune				X	prati aridi, le boscaglie e le scarpate	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Paleo Dei Montoni				X	Prati umidi e paludosi,	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Paleo Delle Garighe				X	garighe, le macchie degradate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Paleo Odoroso			X		lungo strade alla base dei muri in scarpate discariche e suoli sabbiosi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Paleo Rupestre				X	prati aridi, le boscaglie e le scarpate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Paleo Splendente			X		Prati aridi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Papavero Comune			X		negli orti, nelle vigne, nei campi di mais, a volte lungo i sentieri, spesso anche in ambienti urbanizzati, in ambienti piuttosto caldi e umidi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Pastinaca				X	prati aridi boscaglie e scarpate	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Perastro				X	campi e bordi di strade pascoli e gli incolti su terreni umidi; ma anche gli ambienti ruderali (sempre umidi)	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Perlina Gialla				X	prati aridi di tipo steppico	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto

Perlina Maggiore			X		prati, bordo strada, coltivi, scarpate ferroviarie, terreni limosi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Perlina Minore			X		luoghi incolti, garighe e campi coltivati a grano	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Perpetuini D'italia				X	pascoli, incolti, garighe, luoghi sabbiosi e aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Peverina Dei Campi				X	bosco umido e semi-ombreggiato	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Piantaggine				X	boschi, siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pimpinella			X		pascoli aridi e sassosi e ambienti ruderali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Pino D'aleppo				X	prati giardini campi e lungo le strade	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pino Domestico				X	prati margini boscaglie e siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pino Silvestre				X	si adatta a diversi tipi di substrato	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pioppo Bianco				X	terreni freschi e profondi e substrati poveri e asciutti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pioppo Tremulo				X	boschi montani e di collina	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pisello Selvatico				X	suoli incoerenti limosi-argillosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Piumino Nano				X	riva dei fiumi con un terreno sabbioso o calcareo	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Poligala			X		luoghi soleggiati erbosi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Poligono Nodoso			X		cresce negli incolti, tra i muri a secco di campagna, nei prati, ai bordi delle strade, in terreni difficili con condizioni di siccità.	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Polmonaria				X	boschi di latifoglie eliofile, nelle siepi e nei cespugli	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Portulaca			X		incolti e terreni di risulta nei pressi delle pietraie	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Pratolina Comune			X		ambienti umidi, campi, colture e incolti	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Prezzemolo Bastardo			X		luoghi ombrosi, boschi, praterie, siepi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Primula				X	boschi di latifoglie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Prugnolo Selvatico				X	cresce ai margini dei boschi e dei sentieri, in luoghi soleggiati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pungitopo				X	leccete e nei boschi di caducifoglie termofili	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Radicchiella Capillare			X		incolti, i campi, le zone ruderali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Radichella				X	ghiaioni, macereti, pietraie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Radichella Minore			X		incolti, bordi stradali, ruderi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Ranuncolo				X	giardini e prati alle zone paludose fino agli ambienti rocciosi e alle aree incolte	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ranuncolo Millefoglio				X	luoghi a mezz'ombra, boschi, siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Raperonzolo Selvatico				X	giardini, prati, zone paludose, ambienti rocciosi e aree incolte	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ravanello Selvatico				X	giardini, prati, zone paludose, ambienti rocciosi e aree incolte	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Reseda Comune			X		prati aridi, incolti, lungo le vie e bordi dei campi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Robinia Pseudoacacia				X	boschi cedui puri, lungo scarpate, luoghi incolti, siepi, specie alloctona	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Romice Crespo			X		massicciate ferroviarie, bordi delle strade, incolti, zone ruderali, macerie, su terreni gessosi e calcarei	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Rosa Canina				X	boscaglie di faggio, abete, pino e querce a foglie caduche, gli arbusteti e le siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rosmarino			X		macchia mediterranea	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Roverella				X	boschi e arbusteti aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rovo Bluastro				X	boscaglie arbusteti e siepi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Rovo Comune				X	terreni acidi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rovo Selvatico				X	zone molto boschive	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ruchetta				X	boschi ripariali, forre, suoli boschivi umidificati in ambienti umidi ed ombrosi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rucola			X		incolti lungo i sentieri fasce ripariali e macerie	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Rucola Selvatica			X		incolti colture cereali e orti	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Saepola Di Buenos Aires			X		lungo le strade, negli incolti aridi, ambienti ruderali, scarpate ma anche nei campi, colture e vigneti.	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Salice Comune				X	vegetazioni ruderali, lungo i margini stradali, alla base di muri in pietra, sulle scarpate, nei coltivi, in giardini e parchi, su suoli superficiali aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salice Rosso				X	paludi di canneti ai margini di laghi e fiumi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salicone				X	boschi umidi e corsi d'acqua	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salsapariglia				X	aree di bosco umido e dal greto di fiumi torrenti e ruscelli	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salvia Comune				X	macchia mediterranea lecceta e gariga	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salvia Dei Prati				X	pascoli magri, nei prati, nei luoghi sassosi, nelle radure	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Sambuco Commune				X	boschi umidi e terreni abbandonati	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori

						dall'area di impianto
Sanguinella				X	margini dei boschi, lungo i sentieri	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Scardaccione			X		terreni calcarei sassosi e drenanti	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Scorzonera Villosa			X		prati aridi e lande, su suoli argillosi aridi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Sedanina D'acqua			X		lungo le strade discariche e coltivi abbandonati	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Senape Bianca			X		i prati aridi, gli incolti e lungo le vie e bordi dei campi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Senape Nera			X		campi e aree ruderali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Senecio Comune				X	prossimità di fonti di acqua, fossi e acquitrini, nei pressi dei fontanili di campagna, sulle rive di fiumi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Serapide Lingua				X	Incolti, pascoli, garighe, arbusteti, macchia, radure, boschi aperti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Silene Bianca			X		campi coltivati, incolti, lungo bordi stradali, nei ruderi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Sonaglini Minore			X		macchie, incolti e radure	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area


						di impianto
Sorbo Domestico				X	pendii montuosi e foreste decidue	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Sorgo Selvatico			X		incolti, di zone ruderali e di coltivi abbandonati	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Spergularia Comune				X	Inculti, sentieri battuti, luoghi sabbiosi,	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Speronella Comune			X		campi a quote comprese tra i 0-600 metri sul livello del mare	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Speronella Consolida			X		margini di campi di cereali e bordi di viottoli	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Stellina Dei Campi				X	sottobosco di faggete e boschi misti di latifoglie	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Succiamele Delle Fave			X		margini di sentieri, incolti	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Succiamele Ramoso				X	luoghi erbosi e sassosi dei piani collinare e in parte montano	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Sulla Comune		X			prati erbosi incolti, ma anche ai margini di strade sterrate e fossi	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Tamaro			X		colture incolti, parchi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Tamerice				X	ambienti litoranei e sui greti dei torrenti,	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Tarassaco Comune				X	pendii aridi e argillosi	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Terebinto				X	colture incolti, macchia mediterranea	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Tifa Minima				X	bordi di laghetti, stagni e ruscelli	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Trifoglio Irsuto				X	macchie, nelle garighe e in pascoli aridi	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Trifoglio Bianco		X			prati erbosi, campi coltivati	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Trifoglio Campestre			X		boschi termofili pendii di rocce calcaree e aride	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Trifoglio Dei Prati			X		pascoli, incolti e bordi stradali.	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Trifoglio Vulnerario				X	pascoli, prati aridi, pendii sassosi	Impatto diretto nullo. Probabile remota interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, qualche pianta anche all'interno dell'area di impianto
Veccia Comune			X		prati sentieri radure pascoli e coltivati	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Veccia Montanina		X			prati e ambienti ruderali, lungo scarpate o siepi	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Veccia Tentennina			X		Incolti, prati aridi, bordi stradali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Veccia Viola Del Latte			X		prati e ambienti ruderali, lungo scarpate o siepi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area

						di impianto
Verbasco Coda Grossa		x			terreni incolti, ai margini delle coltivazioni, nei prati e nei pascoli.	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Verbena				x	margini campestri, radure boschive	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Vilucchio Bianco			x		colture erbacee, dei cereali, dei vigneti e degli incolti, sulle siepi, nelle radure dei boschi	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Vilucchio Bicchierino			x		incolti, prati aridi bordi stradali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Vilucchio Comune		x			luoghi erbosi, orti, incolti, margini stradali	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Vilucchio Elegantissimo			x		vegetazioni ruderali, discariche, margini stradali, muri, lastricati, aiuole, giardini	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Viola Bianca				x	luoghi aridi, macchia mediterranea, rupi, lungo sentieri, margini delle strade	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Viola Dei Campi			x		luoghi erbosi orti incolti e margini stradali	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Viola Mammola				x	luoghi erbosi ed incolti, margini boschivi, siepi,	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Viperina Azzurra				x	prati cespugli e incolti	Impatto diretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Vite Comune			x		campi coltivati	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto

Zafferano Selvatico			X		Prati e pascoli aridi, praterie rase del piano, querceti sub-mediterranei, vigne ed oliveti .	Impatto diretto basso. Possibile estirpazione di qualche pianta, durante i lavori impianto delle turbine e opere accessorie, generate dall'utilizzo di mezzi meccanici all'interno delle aree di cantiere. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, con piccole popolazioni all'interno dell'area di impianto
Zafferanone Selvatico		X			incolti aridi, gli oliveti e le vigne; ma anche in ambienti ruderali, scarpate, garighe e macchie basse.	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.
Zizzania		X			campi coltivati, colture di cereali	Impatto diretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante. Habitat di predilezione della specie presente in AVI ed in area di impianto.

Parco Eolico Fenice fase di Dismissione Impatti Diretti Flora		
<i>Grado di impatto</i>	<i>Specie</i>	<i>Percentuale</i>
Impatto alto	0	0%
Impatto medio	16	5%
Impatto basso	121	40%
Impatto nullo	166	55%



Parco Eolico Fenice Stima degli impatti tra Flora e opere di progetto FASE DI DISMISSIONE						
Flora	Stima degli impatti INDIRETTI				Habitat	Note
	Alto	Medio	Basso	Nulla		
Acero Campestre				X	boschi meso-termofili	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Acero Minore				X	boschi termomesofili di latifoglie	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Aglio Delle Bisce			X		pendii rocciosi, terreni aridi, incolti e vigneti.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Aglio Italiano			X		macchie e i prati aridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Aglio Maggiore			X		boschi e ambienti umidi ombrosi, alla base di rupi ombrose e a volte ai margini di strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Aglio Pelosetto			X		macchie e cespuglieti. habitat di predilezione fuori dall'area di intervento	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Ailanto			X		lungo i bordi delle strade, in ambiente urbano, in prossimità dei fiumi e ai margini del bosco, specie alloctona	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Alaterno			X		macchia mediterranea e garighe.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile

						interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Amaranto Bianco			X		incolti, macerie, ruderi, greti fluviali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Amaranto Comune			X		orti coltivazioni incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Ambretta Annuale			X		prati e pendii piuttosto magri, oppure sui margini dei sentieri.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Ambretta Comune			X		Prati e pascoli, bordi dei sentieri, zone incolte	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Anemone Fior-Stella			X		radure e prati asciutti.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Arabetta Irsuta			X		terreni asciutti, poveri, nei prati aridi, negli ambienti rupestri e sui vecchi muri	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Arisaro Comune				X	luoghi a mezz'ombra, luoghi ombrosi, boschi a quote comprese tra i 0-800 metri sul livello del mare.	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Aristolochia Rotonda			X		campi incolti, prati e boscaglie.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Arrestabue			X		prati aridi, nei luoghi sassosi,	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Asfodelo Fistoloso			X		terreno con vegetazione rada, prati aridi e pascoli	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Asfodelo Mediterraneo			X		incolti garighe pascoli aridi terreni sassosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.

Asparago				X	macchie	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Asplenio				X	boschi e rupi ombrose fino oltre 2000 metri.	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Aspraggine			X		incolti aridi o umidi, ruderi, aree antropizzate, bordi di strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Assenzio Selvatico			X		prati stabili siepi e cespugli	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Asterisco				X	distese fangose	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Astralago Rosato			X		pendii aridi, pascoli	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Astro Autunnale			X		vegetazioni ruderali discontinue, che tollera anche suoli moderatamente salati, dal livello del mare agli 800 m circa.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Attaccamani			X		cresce lungo i bordi stradali, nei campi incolti, dal livello del mare fino a 2500 metri .	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Avena Altissima			X		prati stabili siepi e cespugli	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Avena Barbata			X		incolti margini campestri e garighe	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Avena Maggiore			X		campi, gli incolti e le stazioni ruderali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Avena Selvatica			X		prati campi di cereali e siepi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.

Bambagione Pubescente				X	prati stabili, a volte anche in ambienti umidi o palustri,	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Berretta Del Prete				X	boschi di latifoglie, siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Biancospino Comune				X	boschi xerofili boscaglie cespuglietti collinari e lungo pendii erbosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Bietola D'acqua				X	incolti e orti	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Bocca Di Lupo				X	boschi di latifoglie pinete e gineprai prati erbosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Boccione Maggiore			X		garighe prati aridi incolti e lungo le vie dei sentieri	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Borragine Comune			X		campi incolti siepi muri e margini di strada	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Borsa Pastore Comune			X		prati campi incolti lungo i muri delle case e sentieri	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Brunella			X		giardini, parchi pubblici, aiuole, bordo delle strade.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Bucaneve				X	boschi di latifoglie, cespuglietti e prati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Buglossa Azzurra			X		luoghi aridi, margini delle strade, suoli basici	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Buglossa Comune			X		incolti, ambienti disturbati, aree antropizzate, vigne e campi coltivati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Bugola			X		prati fertili e concimati, lungo siepi e margini dei sentieri, boschi di latifoglie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i

						lavori.
Caglio Lucido			X		prati secchi, nei cespuglieti radi, nelle pinete	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Caglio Zolfino			X		Prati aridi e magri, lungo i sentieri, ai margini dei boschi, nelle zone antropizzate, nei luoghi sabbiosi e sassosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Calcatreppola			X		campi, garighe, margini stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Calcatreppola Ametistina			X		Pascoli e prati aridi, magri, sassosi e assolati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Calendula Dei Campi			X		prati incolti oliveti vigneti e bordi stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Camedrio Comune				X	prati aridi, i boschi radi e i pendii rocciosi.	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Camepizio			X		prati aridi, i pascoli e gli incolti; ma anche i campi e le colture.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Camomilla Bastarda			X		campi (culture di cereali), pascoli o luoghi incolti e abbandonati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Camomilla Comune			X		campi di cereali incolti e bordi di strada	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Camomilla Dei Tintori				X	conglomerati e affioramenti rocciosi assolati e aridi, nell' ambiente di boscaglia e macchia subcostiera.	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Camomilla Mezzana			X		aree incolte, le zone ruderali e i campi di cereali; ma anche le scarpate, le strade rurali e depositi di immondizie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.

Canna Comune				X	ambiente umido, vicini a fiumi e torrenti.	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Canna Di Palude				X	margini di laghi, fiumi, in ambienti paludosi e acquitrinosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cannuccia Di Palude				X	stagni rive dei laghi torbiere e lungo i fossati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cappellini Comuni			X		prati e campi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Caprifoglio				X	margini dei boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Caprifoglio Comune				X	boschi, nelle radure boschive o in aree boschive perturbate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Carciofo Selvatico			X		pascoli aridi incolti margini delle strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cardo Asinino			X		radure margini di boschi lungo sentieri pascoli luoghi rocciosi e cespugliosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cardo Campestre			X		campi e praterie incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cardo Mariano			X		incolti bordi delle vie ambienti ruderali e scarpate	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cardo Rosso			X		pascoli margini dei sentieri e macerie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cardo Saettone		X			incolti, i bordi delle vie; ma anche gli ambienti ruderali e le scarpate	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Carice Villosa				X	rive e alvei, prati, ambienti umidi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Carlina Raggio D'oro			X		prati aridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Carota			X		incolti, prati aridi, margini stradali e di fossi, ambienti ruderali, zone aperte e soleggiate.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cascellore Comune				X	cresce nel bosco a mezz'ombra, lungo i margini boschivi soleggiate e le rive di corsi d'acqua.	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Centauro Minore		X			prati e pascoli pedemontani	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Centauro Giallo				X	terreni umidi e argillosi, si trova lungo bordi di viottoli e vicino a fossati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Centocchio Comune			X		coltivazioni ruderi e strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Centonchio Azzurro				X	terreni umidi e argillosi, si trova lungo bordi di viottoli e vicino a fossati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cerfoglio Inebriante			X		Luoghi incolti, siepi, macerie, bordi stradali boschivi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cerro				X	boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cicerchia Bastarda			X		incolti e campi di frumento	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cicerchia Dei Prati			X		prati aridi siepi e margini dei boschi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cicerchia Selvatica				X	scarpate in ombra o ai margini del bosco	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cicerchiella			X		prati aridi siepi e margini dei boschi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i

						lavori.
Ciclamino				X	boschi ombrosi di leccio e dalla macchia di cespugli	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cicoria Comune			X		margini di sentieri campi coltivati terreni incolti zone a macerie ambienti ruderali praterie e aree antropizzate	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cicuta Maggiore				X	vicino a rigagnoli o siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cicutaria			X		incolti, bordi di strade, prati asciutti, vigne, suoli sabbiosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Ciliegio				X	boschi di latifoglie	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cinquefoglia Comune			X		zone incolte prati erbosi e ruderi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Cinquefoglia Primaticcia				X	prati aridi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cipresso Sempreverde				X	coltivato per ornamento e rimboschimento, diffuso nei parchi, giardini e cimiteri	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cisto Di Creta				X	macchie mediterranee, nei prati aridi e nelle zone calcaree delle aree vicine al mare	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cisto Rosso				X	macchie e garighe dune costiere stabilizzate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Clematide Fiammella				X	luoghi a mezz'ombra, boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Clematide Vitalba				X	siepi macchia e boscaglia	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Cocomero Asinino			X		terreni sassosi e sabbiosi incolti aridi e macerie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.

Coda Di Cane			X		pascoli	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Coda Di Topo Comune			X		ambienti semi aridi boscaglie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Codolina Meridionale				X	prati stabili	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Corniolo				X	sponde dei torrenti, ai margini dei boschi di latifoglie, negli arbusteti	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Crescione D'acqua				X	corsi d'acqua	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Crisantemo Campestre			X		campi incolti vigne e uliveti bordo strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Crisantemo Giallo			X		luoghi incolti e le strade abbandonate e, di solito, si ritrova in prossimità di pozze d'acqua poco profonde	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Damigella Scapigliata			X		incolti asciutti, vigneti, campi e prati aridi, bordo sentieri	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Dente Di Leone			X		prati luoghi erbosi margini delle strade e boschi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Edera				X	sottoboschi ombrosi lungo i tronchi degli alberi e a ridosso di vecchi edifici	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Eliotropio			X		discariche, maggese e stoppie lungo strade e rocce.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Elleboro Puzzolente				X	margini dei boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Equiseto				X	terreni incolti umidi fossi scarpate ambienti ruderali terreni sabbiosi e	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori

					argillosi	dall'area di impianto
Erba Di San Guglielmo				X	margine dei boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Erba Falsa		X			orti, vigneti, colture sarchiate, bordi stradali	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Erba Marzolina Comune			X		prati falciabili bordi stradali incolti siepi e margini di bosco	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Erba Medica			X		prati aridi, incolti, luoghi erbosi e al bordo dei campi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Erba Medica Lupulina			X		margini di sentieri campi coltivati e incolti aridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Erba Perla Minore			X		incolti, pascoli aridi, garighe, dal livello del mare alla fascia montana.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Erba Ruchetta				X	incolti, luoghi sabbiosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Erba Storna Perfogliata			X		campi di cereali, gli orti e le zone ruderali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Erba Vajola			X		campi incolti prati e fossati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Eucalipto				X	aree paludose, bonifiche specie alloctona	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Euforbia Calenzuola			X		incolti, coltivi, giardini, terreni degradati, aree antropiche	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Euforbia Falcata			X		incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i

						lavori.
Falsa Ortica			X		orti vigneti colture sarchiate e bordi stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Farinello Comune			X		zone incolte e ruderali; ma anche le colture tipo uliveti e vigneti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Festuca Mediterranea			X		Radure e margini di boschi mediterranei Prati da freschi a secchi, anche sassosi, macereti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Fico D'india			X		terreni misti e drenati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Fienarola			X		prati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Fienarola Annuale			X		praterie, prati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Finocchiaccio			X		terreni aridi e calcarei delle zone collinari	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Finocchio Selvatico			X		angoli aridi sassosi assolati zone rocciose e vecchi muri a secco	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Fior Di Vespa				X	praterie ed incolti aridi, garighe e margini di macchia mediterranea	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Fiorrancio			X		incolti vigne uliveti campi e bordi delle strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Forasacco Eretto			X		habitat aperti, prati e praterie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.

Forasacco Peloso				X	prati, siepi e terreni abbandonati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Forasacco Pendolino			X		incolti, i prati aridi e le siepi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Frassino				X	boschi umidi, valloni freschi su terreni profondi e freschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Fumaria Comune		X			campi, prati, lungo le strade	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Gallinella Comune			X		orti, giardini, coltivi; anche nei prati aridi steppici,	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Geranio Volgare			X		incolti, pascoli aridi.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Geranio Malvaccino			X		vegetazioni ruderali e terreni incolti, giardini, orti e vigneti, su suoli argillosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Giacinto Romano			X		luoghi erbosi, prati, campi, vigneti.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Gigaro Chiaro			X		fossi boschi vigneti oliveti e siepi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Ginepro				X	macchia mediterranea e della gariga	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ginestra Dei Carbonai				X	boschi, brughiere, lungo le scarpate rocciose o sabbiose	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ginestra Odorosa				X	radure, terreni aridi ben adattabile a tutti i terreni	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ginestrella Comune				X	radure garighe pinete e leccete	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Ginestrino				X	prati umidi pascoli e margini stradali	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Girasole Comune		X			campi coltivati, orti zone abbandonate ambienti ruderali strade rurali e scarpate	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Giunco Nodoso				X	paludi, fossi e prati umidi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Giunco Tenace				X	laghi, fiumi, paludi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Gladiolo Dei Campi				X	aree ripariali anche marittime, fiumi e fossati, paludi, prati o pascoli con ristagni d'acqua	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Gramigna			X		campi coltivati a cereali, degli oliveti e degli incolti erbosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Grano Duro		X			campi coltivati, terreni argillosi e umidi	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Grano Villosa		X			incolti, i pascoli aridi, i bordi delle vie e i cumuli di macerie	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Grespino Comune		X			campi coltivati.	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Grespino Spinoso		X			colture concimate, i muri, i bordi delle strade	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Ilatro Comune				X	Macchie e leccete lungo le colline aride e le vallate rocciose in ambiente di macchia mediterranea	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Incensaria Comune				X	macchie, margini boschivi, prati incolti ..	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Inula Vischiosa			X		tutti i tipi di suolo, nei terreni incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Iperico				X	luoghi erbosi e umidi, altre nei boschi ombrosi, altre ancora in località aride, argillose e <u>calcaree</u>	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Lampascione			X		campi abbandonati, bordi strade, incolti aridi.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Lassana Comune			X		campi incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Latte Di Gallina			X		Vigne, prati, oliveti, margini di viottoli e di boschi, aree antropizzate	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Leccio				X	boschi di latifoglie cedui orti campi coltivati zone ruderali e arbusteti	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lentisco				X	adatto a tutti i substrati geologici	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ligustro Comune				X	macchia mediterranea	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lino Delle Fate				X	rupi, ghiaie, prati magri steppici	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lino Spinato				X	boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lisca Maggiore				X	paludi, stagni, fossi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Lupinella Comune			X		colture di cereali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Malva Selvatica			X		bordi di sentieri e strade prati asciutti scarpate rupi e pietraie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Malvone Punteggiato			X		terreni coltivati incolti ruderi e margini di strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Marrubio Comune			X		campi siepi e incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i

						lavori.
Marruca				X	boschi termofili,	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Masticogna Latticifera			X		garighe, luoghi aridi e rocciosi, bordi stradali,	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Meliloto Bianco				X	ambienti ruderali e umidi, nei campi e nei prati, lungo i sentieri e lungo le rive dei corsi d'acqua	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Meliloto Comune				X	margini di stagni, fossati, acquitrini, in terreni umidi, freschi, in zone ombreggiate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Menta Campestre			X		campi e incolti aridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Mercorella Comune				X	fossi, corsi d'acqua, luoghi ombrosi e umidi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Miglio Multifloro			X		luoghi erbosi, incolti, al margine dei coltivi, lungo le vie e i sentieri, ruderi, muri a secco	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Mordigallina			X		aree aride e semidesertiche e incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Morella Comune			X		incolti e ruderi, bordi dei sentieri e strade.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Muscari Atlantico			X		terreni incolti e semiaridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Nappola Spinosa			X		incolti aridi e le aree ruderali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Narciso Italiano			X		terreni incolti e semiaridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i

						lavori.
Nontiscordardimè Minore			X		Incolti, pascoli aridi, colture, giardini	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Ofride Verde Bruna				X	praterie ed incolti aridi, garighe e margini di macchia mediterranea	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Olivo				X	climi secchi su terreni poco rocciosi campi coltivati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Olmo Campestre				X	terreni asciutti e poco rocciosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ombrellini Maggiori			X		terreni incolti e lungo le strade	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Ombrellino Pugliese			X		boscaglie di depressioni, alberature su bordi stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Orchide Italica				X	incolti macchia	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Orchidea Piramidale				X	pascoli garighe macchie e boschi radi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Orchidea purpurea				X	boschi mesofili e xerofili, cespuglieti, radure, praterie, pascoli, bordi di vie e sentieri, argini di corsi d'acqua	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Orniello				X	boscaglie degradate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ortica			X		luoghi erbosi, boscaglie, garighe	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Orzo Bulboso				X	vicino ad abitazioni sentieri zone ombra e umide e boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Orzo Selvatico				X	vicino ad abitazioni sentieri zone ombra e umide e boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Pabbio Verticillato				X	zone fresche argillose vicino ad abitazioni sentieri zone ombra e umide e boschi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Paleo Comune			X		prati aridi, le boscaglie e le scarpate	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Paleo Dei Montoni				X	Prati umidi e paludosi,	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Paleo Delle Garighe				X	garighe, le macchie degradate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Paleo Odroso			X		lungo strade alla base dei muri in scarpate discariche e suoli sabbiosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Paleo Rupestre				X	prati aridi, le boscaglie e le scarpate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Paleo Splendente			X		Prati aridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Papavero Comune			X		negli orti, nelle vigne, nei campi di mais, a volte lungo i sentieri, spesso anche in ambienti urbanizzati, in ambienti piuttosto caldi e umidi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Pastinaca				X	prati aridi boscaglie e scarpate	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Perastro			X		campi e bordi di strade pascoli e gli incolti su terreni umidi; ma anche gli ambienti ruderali (sempre umidi)	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Perlina Gialla			X		prati aridi di tipo steppico	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Perlina Maggiore			X		prati, bordo strada, coltivi, scarpate ferroviarie, terreni limosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Perlina Minore			X		luoghi incolti, garighe e campi coltivati a grano	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile

						interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Perpetuini D'italia				X	pascoli, incolti, garighe, luoghi sabbiosi e aridi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Peverina Dei Campi				X	bosco umido e semi-ombreggiato	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Piantaggine				X	boschi, siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pimpinella			X		pascoli aridi e sassosi e ambienti ruderali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Pino D'aleppo				X	prati giardini campi e lungo le strade	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pino Domestico				X	prati margini boscaglie e siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pino Silvestre				X	si adatta a diversi tipi di substrato	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pioppo Bianco				X	terreni freschi e profondi e substrati poveri e asciutti	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pioppo Tremulo				X	boschi montani e di collina	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pisello Selvatico				X	suoli incoerenti limosi-argillosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Piumino Nano				X	riva dei fiumi con un terreno sabbioso o calcareo	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Poligala			X		luoghi soleggiati erbosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Poligono Nodoso			X		cresce negli incolti, tra i muri a secco di campagna, nei prati, ai bordi delle strade, in terreni difficili con condizioni di siccità.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.

Polmonaria				X	boschi di latifoglie eliofile, nelle siepi e nei cespugli	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Portulaca			X		incolti e terreni di risulta nei pressi delle pietraie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Pratolina Comune			X		ambienti umidi, campi, colture e incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Prezzemolo Bastardo			X		luoghi ombrosi, boschi, praterie, siep	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Primula				X	boschi di latifoglie	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Prugnolo Selvatico				X	cresce ai margini dei boschi e dei sentieri, in luoghi soleggiati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Pungitopo				X	leccete e nei boschi di caducifoglie termofili	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Radicchiella Capillare			X		incolti, i campi, le zone ruderali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Radichella				X	ghiaioni, macereti, pietraie	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Radichella Minore			X		incolti, bordi stradali, ruderi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Ranuncolo				X	giardini e prati alle zone paludose fino agli ambienti rocciosi e alle aree incolte	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ranuncolo Millefoglio				X	luoghi a mezz'ombra, boschi, siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Raperonzolo Selvatico				X	giardini, prati, zone paludose, ambienti rocciosi e aree incolte	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Ravanello Selvatico				X	giardini, prati, zone paludose, ambienti rocciosi e aree incolte	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Reseda Comune			X		prati aridi , incolti ,lungo le vie e bordi dei campi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Robinia Pseudoacacia				X	boschi cedui puri, lungo scarpate, luoghi incolti, siepi, specie alloctona	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Romice Crespo			X		massicciate ferroviarie, bordi delle strade, incolti, zone ruderali, macerie, su terreni gessosi e calcarei	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Rosa Canina				X	boscaglie di faggio, abete, pino e querce a foglie caduche, gli arbusteti e le siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rosmarino			X		macchia mediterranea	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Roverella				X	boschi e arbusteti aridi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rovo Bluastro				X	boscaglie arbusteti e siepi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rovo Comune				X	terreni acidi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rovo Selvatico				X	zone molto boschive	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Ruchetta				X	boschi ripariali, forre, suoli boschivi umidificati in ambienti umidi ed ombrosi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Rucola			X		incolti lungo i sentieri fasce ripariali e macerie	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Rucola Selvatica			X		incolti colture cereali e orti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.

Saeppola Di Buenos Aires			X		lungo le strade, negli incolti aridi, ambienti ruderali, scarpate ma anche nei campi, colture e vigneti.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Salice Comune				X	vegetazioni ruderali, lungo i margini stradali, alla base di muri in pietra, sulle scarpate, nei coltivi, in giardini e parchi, su suoli superficiali aridi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salice Rosso				X	paludi di canneti ai margini di laghi e fiumi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salicone				X	boschi umidi e corsi d'acqua	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salsapariglia				X	aree di bosco umido e dal greto di fiumi torrenti e ruscelli	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salvia Comune				X	macchia mediterranea lecceta e gariga	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Salvia Dei Prati				X	pascoli magri, nei prati, nei luoghi sassosi, nelle radure	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Sambuco Commune				X	boschi umidi e terreni abbandonati	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Sanguinella				X	margini dei boschi, lungo i sentieri	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Scardaccione			X		terreni calcarei sassosi e drenanti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Scorzonera Villosa			X		prati aridi e lande, su suoli argillosi aridi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Sedanina D'acqua			X		lungo le strade discariche e coltivi abbandonati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Senape Bianca			X		i prati aridi, gli incolti e lungo le vie e bordi dei campi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.

Senape Nera			X		campi e aree ruderali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Senecio Comune				X	prossimità di fonti di acqua, fossi e acquitrini, nei pressi dei fontanili di campagna, sulle rive di fiumi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Serapide Lingua				X	Incolti, pascoli, garighe, arbusteti, macchia, radure, boschi aperti	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Silene Bianca			X		campi coltivati, incolti, lungo bordi stradali, nei ruderi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Sonaglini Minore			X		macchie, incolti e radure	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Sorbo Domestico				X	pendii montuosi e foreste decidue	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Sorgo Selvatico			X		incolti, di zone ruderali e di coltivi abbandonati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Spergularia Comune			X		Incolti, sentieri battuti, luoghi sabbiosi,	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Speronella Comune			X		campi a quote comprese tra i 0-600 metri sul livello del mare	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Speronella Consolida			X		margini di campi di cereali e bordi di viottoli	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Stellina Dei Campi				X	sottobosco di faggete e boschi misti di latifoglie	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Succiamelle Delle Fave			X		margini di sentieri, incolti	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.

Succiamele Ramoso			X	luoghi erbosi e sassosi dei piani collinare e in parte montano	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Sulla Comune		X		prati erbosi incolti, ma anche ai margini di strade sterrate e fossi	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Tamaro			X	colture incolti, parchi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Tamerice			X	ambienti litoranei e sui greti dei torrenti,	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Tarassaco Comune			X	pendii aridi e argillosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Terebinto			X	colture incolti, macchia mediterranea	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Tifa Minima			X	bordi di laghetti, stagni e ruscelli	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Trifogliano Irsuto			X	macchie, nelle garighe e in pascoli aridi	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Trifoglio Bianco		X		prati erbosi, campi coltivati	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Trifoglio Campestre			X	boschi termofili pendii di rocce calcaree e aride	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Trifoglio Dei Prati			X	pascoli, incolti e bordi stradali.	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Trifoglio Vulnerario			X	pascoli, prati aridi, pendii sassosi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Veccia Comune			X	prati sentieri radure pascoli e coltivi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.

Veccia Montanina		x			prati e ambienti ruderali, lungo scarpate o siepi	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Veccia Tentennina			x		Incolti, prati aridi, bordi stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Veccia Viola Del Latte			x		prati e ambienti ruderali, lungo scarpate o siepi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Verbasco Coda Grossa		x			terreni incolti, ai margini delle coltivazioni, nei prati e nei pascoli.	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Verbena				x	margini campestri, radure boschive	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Vilucchio Bianco			x		colture erbacee, dei cereali, dei vigneti e degli incolti, sulle siepi, nelle radure dei boschi	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Vilucchio Bicchierino			x		incolti, prati aridi bordi stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Vilucchio Comune		x			luoghi erbosi, orti, incolti, margini stradali	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Vilucchio Elegantissimo			x		vegetazioni ruderali, discariche, margini stradali, muri, lastricati, aiuole, giardini	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Viola Bianca				x	luoghi aridi, macchia mediterranea, rupi, lungo sentieri, margini delle strade	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Viola Dei Campi			x		luoghi erbosi orti incolti e margini stradali	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Viola Mammola				x	luoghi erbosi ed incolti, margini boschivi, siepi,	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto
Viperina Azzurra				x	prati cespugli e incolti	Impatto indiretto nullo. Nessuna interferenza tra azioni di progetto e specie floristica. Habitat di predilezione della specie presente in AVI, ma fuori dall'area di impianto

Vite Comune			X		campi coltivati	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Zafferano Selvatico			X		Prati e pascoli aridi, praterie rase del piano, querceti sub-mediterranei, vigne ed oliveti .	Impatto indiretto basso. Habitat di predilezione della specie presente all'interno dell'AVI; presenza di piante anche all'interno dell'area di impianto. probabile interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori.
Zafferanone Selvatico		X			incolti aridi, gli oliveti e le vigne; ma anche in ambienti ruderali, scarpate, garighe e macchie basse.	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.
Zizzania		X			campi coltivati, colture di cereali	Impatto indiretto medio. Sottrazione e riduzione di habitat, probabile estirpazione di alcune piante, interferenza con aumento di polveri generate dai mezzi meccanici durante i lavori di cantiere.


Parco Eolico Fenice fase di Dismissione Impatti Indiretti Flora		
Grado di impatto	Specie	Percentuale
Impatto alto	0	0%
Impatto medio	16	5%
Impatto basso	158	52%
Impatto nullo	128	43%



Parco Eolico Fenice
Stima degli impatti complessivi sulla Flora diretti ed indiretti per tutte le fasi

Parco Eolico Fenice Flora Legenda Impatti Complessivi	
<i>Sigla</i>	<i>Riferimento</i>
FCD A	Fase cantiere impatto diretto alto
FCD M	Fase cantiere impatto diretto medio
FCD B	Fase cantiere impatto diretto basso
FCD N	Fase cantiere impatto diretto nullo
FCI A	Fase cantiere impatto indiretto alto
FCI M	Fase cantiere impatto indiretto medio
FCI B	Fase cantiere impatto indiretto basso
FCI N	Fase cantiere impatto indiretto nullo
FED A	Fase esercizio impatto diretto alto
FED M	Fase esercizio impatto diretto medio
FED B	Fase esercizio impatto diretto basso
FED N	Fase esercizio impatto diretto nullo
FEI A	Fase esercizio impatto indiretto alto
FEI M	Fase esercizio impatto indiretto medio
FEI B	Fase esercizio impatto indiretto basso
FEI N	Fase esercizio impatto indiretto nullo
FDD A	Fase dismissione impatto diretto alto
FDD M	Fase dismissione impatto diretto medio
FDD B	Fase dismissione impatto diretto basso
FDD N	Fase dismissione impatto diretto nullo
FDI A	Fase dismissione impatto indiretto alto
FDI M	Fase dismissione impatto indiretto medio
FDI B	Fase dismissione impatto indiretto basso
FDI N	Fase dismissione impatto indiretto nullo

Parco Eolico Fenice Flora Impatti Complessivi		
<i>Fase e Grado Di Impatto</i>	<i>N. Specie</i>	<i>Percentuale</i>
FCD A	0	0%
FCD B	121	7%
FCD M	16	1%
FCD N	166	9%
FCI A	0	0%
FCI B	158	9%
FCI M	16	1%
FCI N	128	7%
FED A	0	0%
FED B	16	1%
FED M	0	0%
FED N	286	16%
FEI A	0	0%
FEI B	174	10%
FEI M	0	0%
FEI N	128	7%
FDD A	0	0%
FDD B	121	7%
FDD M	16	1%
FDD N	166	9%
FDI A	0	0%
FDI B	158	9%
FDI M	16	1%
FDI N	128	7%



Si precisa che il grado di impatto diretto ed indiretto assegnato ad ogni singola specie floristica nelle tre fasi, è stato calcolato in considerazione della loro presenza all'interno dell'area di cantiere e di studio, alla loro densità di popolazione, alla capacità di resilienza della specie. L'insieme della valutazione di questi elementi, ha stabilito il grado di impatto per ogni singola specie floristica.

CONSIDERAZIONI SU IMPATTI FLORA

*La stima degli impatti diretti ed indiretti, per la fase di cantiere, di esercizio e di dismissione sulle specie floristiche, risulta con impatto basso o nullo in considerazione del fatto che, tutta l'area di impianto riferita alla installazione ed alle azioni di tutte le opere di progetto, insiste esclusivamente su aree agricole (seminativi/orticole), dove la flora presente oltre ad appartenere a specie molto comuni e sinantropiche, sono riscontrabili su tutto il territorio circostante e oltre. L'inserimento del parco eolico nel suddetto contesto non provoca alcuna sottrazione o alterazione di flora rara o di pregio. All'interno dell'area di progetto (area a seminativi), quella dove fisicamente vengono installate le tipologie di progetto, l'unica specie floristica a risentire direttamente della riduzione di habitat, è il grano o frumento (*Triticum vulgare*), mentre le altre specie agricole, quelle arboree arbustive, non vengono interessate direttamente dall'installazione del parco eolico.*

FAUNA

La fauna presa in considerazione per la valutazione degli impatti tra opere ed azioni di progetto e componente faunistica, è stata quella individuata durante i vari sopralluoghi effettuati sul campo, e quella potenzialmente presente, perché riscontrata negli stessi tipi di ecosistemi presenti sul territorio, anche al di fuori dell'area di studio. Inoltre sono state valutate anche quelle specie presenti con numero ridotto di esemplari.

Per la definizione degli impatti tra opere ed azioni di progetto e fauna, sono state prese in considerazione le specie faunistiche presenti e potenzialmente presenti all'interno dell'area di studio.

Parco Eolico Fenice stima degli impatti tra Fauna e opere di progetto fase di CANTIERE						
Fauna	Stima degli impatti DIRETTI				Habitat di predilezione	Note
	Alto	Medio	Basso	Nulla		
Airone cenerino				X	<i>Palustre</i> frequenta prati umidi e torrenti anche nei pressi di centri urbani e abitati.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Airone guardabuoi				X	<i>Palustre - Incolto</i> frequenta zone umide poco estese, zone palustri, risaie e praterie dove si associa spesso al bestiame al pascolo. meno acquatico degli altri aironi	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Alborella				X	<i>Palustre</i> fiumi a corrente moderata, laghi di ogni estensione, canali di pianura.	Classe Pesci: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Allocco				X	<i>Boschivo</i> frequenta boschi di latifoglie e misti, alternati ad ampie radure che fungono da territori di caccia, zone agricole	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Alzavola				X	<i>Palustre</i> con bassi fondali: paludi, torbiere, risaie, acquitrini, stagni, lagune, saline, aree di mare frequenta zone umide anche di piccole dimensioni	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Beccaccia				X	<i>Boschivo</i> si riproduce in foreste miste di latifoglie, talvolta anche in consociazione con conifere, purchè sia garantita la presenza di sottobosco, radure e suoli ricchi di lettiera.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Beccaccino				X	<i>Palustre</i> si adatta dovunque, anche se predilige paludi, prati umidi, praterie e risaie.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area

						di impianto.
Beccamoschino				X	<i>Palustre - Incolto</i> aree con bassa vegetazione erbosa, spesso vicino all'acqua, paludi, ma anche campi asciutti	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Biscia tassellata				X	habitat acquatici, da cui di solito non si allontana, fiumi, canali, torrenti e ruscelli.	classe Rettili: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Cannaiola				X	<i>Palustre</i> specie strettamente legata agli ambienti umidi e paludosi	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Capinera				X	<i>Incolto –Boschivo</i> vive nell'intrico delle siepi più fitte, nei cespugli e tra i rami degli alberi da frutta, ma non disdegna il sottobosco	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Carpa				X	laghi grandi e piccoli e nei tratti medi ed inferiori dei fiumi	Classe Pesci: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Cavedano				X	acque dolci correnti, limpide e calme. nei laghi si distribuisce lungo le acque litorali, nei fiumi fino agli estuari	Classe Pesci: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Cicogna bianca				X	<i>Palustre</i> ambienti aperti come paludi o pianure erbose, dove può trovare facilmente cibo; per nidificare sceglie punti molto alti e scoperti, come la cima di edifici o di tralicci elettrici	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Cinciallegra				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> boschi di conifere, frutteti, campi, siepi, giardini e parchi urbani.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Cinciarella				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> abita nei boschi misti di bassa collina o pianeggianti, nei frutteti, nei giardini e nei parchi. e' rara nelle foreste di conifere	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Cinghiale				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> boschi folti a prevalenza di latifoglie con sottobosco, alternati a terreni pantanosi, pascoli o terreni coltivati	classe Mammiferi: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI fuori area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica.
Codibugnolo				X	<i>Palustre</i> frequenta i boschi di latifoglie con folto sottobosco, campagne con filari, frutteti e vigneti, parchi e giardini urbani	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Corriere piccolo				X	<i>Palustre</i> frequenta laghi, fiumi, ghiaietti allagati; durante l'inverno si può ritrovare lungo	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.

					<i>le coste marine.</i>	
Cutrettola				X	<i>Palustre - Incolto predilige soprattutto i campi umidi, ma si può riprodurre anche in zone asciutte, come nei campi di cereali</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Folaga				X	<i>Palustre stagni calmi, terreni umidi e acque che scorrono lentamente, con molte piante acquatiche e canne palustri.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Gallinella d'acqua				X	<i>Palustre frequenta zone umide con fitta vegetazione, fiumi a corso lento, risaie e praterie in prossimità dell'acqua</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Geco comune				X	<i>Agricolo- Antropico muri a secco, nelle vecchie abitazioni e nelle rovine, nelle legnaie e sui tetti</i>	<i>classe Rettili: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Germano reale				X	<i>Palustre zone umidi d'acqua dolce quali laghi, fiumi, risorgive, stagni e paludi, e si adatta bene anche in habitat intensamente coltivati</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Ghiandaia				X	<i>Incolto — Boschivo foreste cedue e miste, con predilezione per le aree boschive a prevalenza di querce e carpini</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Gru				X	<i>Palustre frequenta torbiere alberate, zone aperte erbose e paludi. nelle zone di svernamento è presente in lagune, steppe, pascoli, aree coltivate e lungo il corso di grandi fiumi e laghi</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Lucarino				X	<i>Incolto - Boschivo boschi di conifere, prediligendo soprattutto gli alberi di larici e abeti rossi, nonché ontano e betulla</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Lui piccolo				X	<i>Incolto - Boschivo frequenta un'ampia varietà di habitat con alberi e arbusti, quali parchi e boschi misti o decidui</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Marangone				X	<i>Palustre frequenta le zone umide d'acqua dolce o debolmente salmastra, caratterizzate da abbondante vegetazione palustre emergente.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Martin pescatore				X	<i>Palustre strettamente legato alla vita acquatica, frequenta fiumi, torrenti, laghi, stagni, canali, lagune salmastre ed estuari.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Marzaiola				X	<i>Palustre frequenta le zone umide aperte anche di piccole dimensioni, con acque dolci e bassi</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area</i>

					<i>fondali, ed evita quelle troppo chiuse dalla vegetazione</i>	<i>di impianto.</i>
Merlo				X	<i>Incolto - Boschivo</i> il bosco, ma si adatta a vivere in numerosi ambienti e non raramente lo si trova nei frutteti e nei vigneti, in aree urbane a contatto ravvicinato con l'uomo..	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Mestolone				X	<i>Palustre</i> frequenta specchi d'acqua dolce e salmastra con fitta vegetazione e ricche di fango.	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Migliarino di palude				X	<i>Palustre</i> paludi e acquitrini con canneti, carici, erbe alte, e alberi. durante la migrazione frequenta anche habitat più secchi.	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Mignattino				X	<i>Palustre</i> zone paludose d'acqua dolce naturali o artificiali, laghi, fiumi a corso lento, risaie, lagune salmastre, saline, estuari e coste del mare.	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Natrice dal collare				X	<i>Palustre</i> zone umide di ogni tipo corsi d'acqua ricchi di anfibi	<i>classe Rettili: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Oca selvatica				X	<i>Palustre- Incolto</i> nelle aree di riproduzione frequenta preferibilmente le zone umide con acqua dolce ricche di vegetazione palustre, mentre nei quartieri di svernamento è presente nei terreni palustri poco profondi anche di acque salmastre, nei pascoli, nei campi coltivati e, ove è disturbata, in mare	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Occhiocotto				X	<i>Incolto - Boschivo</i> frequenta la macchia mediterranea, i boschi con fitto strato arbustivo, i cespugliati di steppa, i parchi e i giardini urbani	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Passera scopaiola				X	<i>Palustre – Incolto</i> occupa principalmente boschi con sottobosco, giovani piantagioni di conifere, torbiere boscate e arbusteti di ontano che dominano il limite della vegetazione arborea	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Pavoncella				X	<i>Palustre – Incolto</i> è tipica di ambienti aperti; nidifica in prati, campi coltivati e incolti. durante la riproduzione è territoriale	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Pendolino				X	<i>Palustre</i> frequenta le zone umide di pianura con acqua dolce o salmastra, ricche di cespugli, alberi e canneti. di rado si insedia a quote superiori ai 200	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Picchio rosso maggiore				X	<i>Boschivo</i> frequenta le zone collinari e di	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area</i>

					<i>pianura con boschi sia fitti che radi, parchi, giardini, siepi alberate in aperta campagna e coltivazioni di pioppo</i>	<i>di impianto.</i>
Picchio verde				X	<i>Boschivo</i> vive in boschi, boschetti e luoghi alberati, con tutte le esposizioni, in zone umide e secche, appartate e frequentate. preferisce le zone alberate discontinue, alternate da zone coltivate.	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Piro piro boschereccio				X	<i>Palustre</i> zone agricole, laghi, zone umide, corsi d'acqua; comportamento migratorio. prevalentemente migratrice su lunga distanza	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Piro-piro culbianco				X	<i>Palustre</i> cave di argilla e zone umide con boschetti e canneti	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Piro-piro piccolo				X	<i>Palustre</i> in periodo riproduttivo frequenta le rive dei corsi d'acqua, specie a regime torrentizio, e quelle dei laghi, preferendo le sponde sassose o ciottolose anziché quelle sabbiose o fangose; nelle aree di svernamento s'insedia in un'ampia varietà di zone umide, sia dell'entroterra che costiere	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Rana agile				X	boschi e boscaglie, anche xerofili, radure, campi e prati umidi	<i>classe Anfibi: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Rana verde italiana				X	<i>Palustre</i> ambienti umidi, zone costiere. sottobosco di pinete e foreste di latifoglie, in prati e coltivi	<i>classe Anfibi: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Regolo				X	<i>Incolto –Boschivo</i> frequenta boschi misti e di conifere e, in inverno, nel sottobosco e nelle siepi..	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Rospo comune				X	<i>Palustre</i> aree boschive di conifere, latifoglie e boschi misti, soprattutto in luoghi umidi, tanto quanto campagne aperte	<i>Classe Anfibi: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Rospo smeraldino				X	<i>Palustre</i> habitat umidi, orti, coltivi, giardini	<i>classe Anfibi: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Scricciolo				X	<i>Incolto –Boschivo</i> frequenta un'ampia varietà di ambienti: boschi e loro margini, zone fresche e ombrose con cespugli e alberi sparsi, macchia mediterranea	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Sterpazzola				X	<i>Incolto - Boschivo</i> frequenta ambienti soleggiati ove si alternano spazi aperti con folta	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area</i>

					vegetazione erbacea e cespugli, dal livello del mare fino ad altitudini di circa 1.500 metri. nella stagione riproduttiva preferisce i margini dei boschi, le radure, i terreni incolti e le brughiere	di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Tarabusino				X	<i>Palustre</i> zone umide d'acqua dolce, ferma o corrente; predilige canneti fitti come il suo parente di maggiori dimensioni	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Testuggine d'acqua				X	<i>Palustre</i> stagni, laghi, risorgive, fiumi, canali e fossati, paludi, bacini di cave esaurite; in generale, zone umide con ricca vegetazione.	classe Rettili: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Tritone italico				X	<i>Palustre</i> laghi, stagni, maceri, pozze, risorgive. fuori dall'acqua in ambienti del suolo, prati e boschi	classe Anfibi: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Tuffetto				X	<i>Palustre</i> frequenta le zone umide sia d'acqua dolce che debolmente salmastra anche di piccole dimensioni, purché sia presente un'abbondante vegetazione	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Usignolo di fiume				X	<i>Palustre</i> frequenta la fitta vegetazione ripariale erbacea e arbustiva delle zone paludose, delle rive di fiumi, laghi e stagni, e delle torbiere.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Vipera comune				X	luoghi aridi e caldi arbusti, siepi, margini dei boschi.	classe Rettili: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Albanella minore			X		<i>Palustre – Incolto - Agricolo</i> brughiere, praterie, pascoli, steppe cerealicole a zone umide. generalmente alle basse quote. fino ai 1500 m in asia. anche nelle praterie d'altitudine durante le migrazioni.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Albanella reale			X		<i>Palustre – Incolto - Agricolo</i> brughiere, praterie, coltivi erbacei, pascoli e zone umide, generalmente al di sotto dei 500 m in Europa. localmente, quote più elevate in asia. anche in praterie d'altitudine durante le migrazioni	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Allodola		X			<i>Incolto</i> frequenta campagne più o meno coltivate, steppe, prati, pascoli e dune sabbiose, sia in pianura che in quota.	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat.
Arvicola terrestre		X			<i>Incolto - Agricolo</i> fossi, canali irrigui, fiumi, stagni delle pianure e dei fondovalle, rive dei laghi, specchi d'acqua dolce e salmastra	classe Mammiferi: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la

						ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Assiolo			X		<i>Incolto – Agricolo – Antropico</i> ambienti aperti in genere, anche di tipo rurale o suburbano. fino ai 1500 m.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Averla capirossa			X		<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta campagne alberate con siepi, aree incolte ricche di cespugli e alberi sparsi, macchia mediterranea, oliveti, frutteti, vigneti,	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Averla cenerina			X		<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta margini di boschi, campi coltivati e strade campestri con vegetazione ad alberi sparsi e cespugli sia in pianura che sui rilievi a pendii dolci. nelle zone di svernamento è presente nelle savane e nelle secche boschiglie di acacie.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Averla piccola			X		<i>Incolto - Agricolo</i> ambienti aperti cespugliosi, campagne percorse da siepi, macchie rade, radure, lande incolte, ambienti ecotonali fra pascoli e bosco. dal fondovalle a quasi 2000 m s.l.m. nidifica fra i cespugli e piccoli alberi tra i 70 cm e i 2 metri.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Balestruccio			X		<i>Incolto - Agricolo</i> costruiscono il loro nido sotto grondaie, tettoie, entrate delle porte, raramente anche sotto rupi, ponti in cemento armato o affini	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Ballerina bianca			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta un'ampia tipologia di habitat, preferendo le zone aperte, presso stagni, laghi, corsi d'acqua, rive marine. localmente può vivere su terreni secchi o addirittura semidesertici. si è pure adattata agli ambienti coltivati e a quelli urbani, dove trova abbondanza di cibo e di siti di nidificazione	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Barbagianni			X		<i>Incolto – Agricolo – Antropico</i> ambienti aperti di vario genere, comprese zone umide, rurali e suburbane. generalmente al di sotto dei 600 metri in Europa; anche a quote più elevate altrove	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Barbastello comune			X		<i>Incolto – Agricolo – Antropico - Palustre</i> aree boscate collinari e di bassa e media montagna	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AvI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne

Biacco		X			<i>Incolto - Agricolo</i> macchie, margini di boschi, radure, zone rocciose, muri a secco e pietraie; anche siepi, coltivi e aree antropizzate	classe Rettili: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Calandra		X			<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta zone aperte a clima secco, incolte o parzialmente coltivate, pianeggianti o collinari, con vegetazione bassa e assenza di alberi e cespugli	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Calandrella		X			<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta ambienti aridi aperti con scarsa vegetazione erbacea, greti ciottolosi e sabbiosi di corsi d'acqua, incolti, steppe cerealicole.	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Cappellaccia		X			<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta gli ambienti steppici: terreni incolti, aridi, pietrosi, zone semidesertiche, lande coltivate preferibilmente a foraggiare, campi arati	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Cardellino			X		<i>Incolto - Agricolo</i> da prati fioriti, praterie con erba alta, boschi aperti, piantagioni, frutteti, parchi e giardini	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Cervone		X			<i>Incolto – Agricolo</i> macchia mediterranea, il limitare di boschi, i boschi radi e soleggiati o in genere i luoghi con vegetazione sparsa, le sassaie, i muretti a secco e gli edifici abbandonati	classe Rettili: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Cesena			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> frequenta boschi, parchi, frutteti in prossimità di praterie e pianure coltivate.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Civetta			X		<i>Incolto – Agricolo – Antropico</i> zone aperte, pianeggianti, collinari, montane, boschive e alberate, coltivate e incolte, secche e umide, appartate e frequentate. predilige gli ambienti urbanizzati, soprattutto quelli rurali	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Codiroso			X		<i>Incolto - Agricolo</i> predilige boschi non troppo chiusi di larici e cembri, o boschi ai margini di torrenti. si concentra principalmente a quote medio-basse, ma arriva a raggiungere anche i 2000 metri di altitudine sulle alpi, mantenendosi generalmente nelle vicinanze di	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.

					centri abitati.	
Codirosso spazzacamino			X		<i>Incolto – Agricolo zone montane, nelle quali il codirosso spazzacamino va alla ricerca di terreni sassosi o pareti rocciose fino al limite delle nevi perenni. durante la stagione fredda, la specie abbandona queste zone per scendere a quote inferiori</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Colombaccio			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo si è ben adattato alle città, tanto da essere un assiduo frequentatore dei parchi, anche se è molto più timido del piccione; il suo habitat principale, tuttavia, rimane la campagna, dove è molto presente.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cornacchia grigia		X			<i>Incolto - Agricolo campagne coltivate purché disseminate di alberi, siepi e boschetti, pascoli, brughiere, boschi, rive di fiumi e laghi, coste marine, aree urbane e suburbane</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Cuculo			X		<i>frequenta le foreste con radure, campagne alberate, grandi parchi cittadini, pascoli d'alta quota fino a 2.000 m di altitudine sulle alpi.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Donnola			X		<i>Incolto - Agricolo terreni coltivati, boschi, zone cespugliate, sassaie e presso abitazioni abbandonate</i>	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Fagiano			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo frequenta una grande varietà di ambienti, come i margini dei boschi, i parchi, i terreni coltivati, i canneti e le zone cespugliose, dal livello del mare fino a quote di 1500 metri circa.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Faina			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo boschi, margini di boschi, zone rocciose, spesso anche vicino ad abitazioni</i>	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Falco cuculo			X		<i>Palustre - Incolto - Agricolo frequenta gli ambienti aperti con esclusione di quelli desertici o troppo aridi: steppe alberate, terreni coltivati alternati a boschi, foreste</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Falco di palude			X		<i>Palustre - Incolto - Agricolo zone umide interne e di litorale, con sufficienti estensioni di canneti. anche foraggiere e steppe cerealicole, soprattutto se adiacenti ad ambienti allagati</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>

Falco pecchiaiolo			X		<i>Incolto — Boschivo frequenta gli ambienti boscosi d'ogni tipo, possibilmente con spazi aperti sia in pianura che in montagna</i>	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Falco pellegrino			X		<i>Palustre - Incolto - Agricolo predilige gli habitat aperti, come praterie, tundra e campi. sono più diffusi nella tundra e nelle aree costiere</i>	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Fringuello			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo frequenta boschi, siepi, giardini, aree aperte con alberi sparsi</i>	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gabbiano comune			X		<i>Palustre - Agricolo frequenta le zone umide sia d'acqua dolce che salata, naturali o artificiali, costiere o dell'entroterra; è pure presente nei laghetti e lungo i fiumi all'interno delle città.</i>	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gabbiano reale			X		<i>Palustre - Agricolo frequenta le coste e il mare aperto, le zone umide costiere, le aree portuali e le città costiere; di rado si inoltra nell'entroterra. abitualmente si porta nelle discariche di rifiuti urbani</i>	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Garzetta			X		<i>Palustre ambienti acquitrinosi, sponde di fiumi, laghi e stagni</i>	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gazza			X		<i>Incolto - Agricolo prati, cespuglietti, margini dei boschi, frutteti, campi coltivati e in generale da spazi aperti.</i>	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gheppio			X		<i>Incolto - Agricolo campi aperti ed erbosi e terreni agricoli, che forniscono loro sufficienti spazi aperti</i>	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Ghiandaia marina			X		<i>Incolto - Agricolo frequenta praterie steppose, zone incolte, coltivi con alberi sparsi, boschi di querce e pinete con radure sia di pianura che di bassa collina.</i>	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Grillaio			X		<i>Incolto - Agricolo frequenta ambienti aperti con scarsa copertura arborea ed arbustiva: prati, pascoli, praterie, zone stepposo-cerealicole, ambienti rocciosi</i>	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.

Gruccione			X		<i>Palustre - Incolto</i> campagne aperte con vegetazione arborea e arbustiva poco densa e discontinua.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gufo comune			X		<i>Incolto – Agricolo- Antropico</i> ambienti aperti con alberi sparsi, in filari o in macchie. anche zone boschive alternate a zone aperte	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Lepre comune			X		<i>Incolto - Agricolo</i> campi coltivati, incolti, boschi	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Lodolaio			X		<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta colline, pianure, boschi, in prossimità di zone umide. caccia prevalentemente in volo, di mattina presto o di sera tardi.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Lucertola campestre			X		<i>Incolto – Agricolo</i> margini di boschi, boschiglie, radure e prati, coltivi, aree urbane, pietraie, cataste di legna, pinete litoranee, litorali sabbiosi, dune con vegetazione scarsa, alvei di torrenti e fiumi, sponde di laghi e stagni	classe Rettili: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Lupo			X		<i>Incolto – Boschivo - Agricolo</i> zone montane densamente boscate, relativamente ricche di siti rifugio e di prede e con scarsa presenza antropica	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Nibbio bruno		X			<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> vive in zone di pianura o collinari, in zone boschive mature miste di latifoglie, circondate da zone aperte terrestri o acquatiche, pascoli	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Nibbio reale		X			<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> aree collinari in cui sono presenti boschi con alberi sufficientemente grandi da potervi collocare il nido accanto ad ampie aree aperte, sia coltivate che non, in cui si alimenta; evita le zone con agricoltura intensiva.	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Nottola comune			X		<i>Boschivo - Incolto</i> zone boschive e di habitat forestali	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Occhione			X		<i>Incolto – Agricolo</i> occupa ambienti aridi, prati, coltivi, pascoli, spesso in prossimità di zone	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto,

					<i>umide. specie terricola,</i>	<i>durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Passera europea			X		Incolto – Agricolo-Antropico zone agricole, zone urbane; comportamento migratorio. sedentaria; sito di nidificazione. edificio	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Passera mattugia			X		Incolto – Agricolo- Antropico predilige paesaggi agricoli ricchi di siepi, boschetti campestri e alberi. dove siano disponibili cavità adatte alla nidificazione, cova anche nei frutteti, negli edifici delle aziende agricole e nei parchi. la si trova anche lungo i bordi dei boschi, mentre evita agglomerati con poco verde.	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Passero solitario			X		Incolto – Agricolo frequenta pendii aridi e assolati in zone rocciose dalle coste marine alle alte montagne, cave di pietra, ambienti urbani e manufatti	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Pettirosso			X		Incolto – Agricolo- Boschivo i boschi di conifere sono il suo habitat naturale, ma è spesso presente anche in giardini, siepi, boschetti, boschi con sottobosco. nidifica nei buchi o nelle spaccature di alberi, ai piedi delle siepi, nell'edera o anche in vecchi oggetti lasciati dall'uomo.	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Piccione selvatico		X			Incolto – Agricolo frequentano coste rocciose marine e ambienti circostanti, zone rocciose dell'interno. si nutrono principalmente di sostanze vegetali raccolte direttamente sul terreno o posandosi sugli alberi (o sugli arbusti	<i>classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Pipistrello albolimbato			X		Incolto - Antropico boschi e foreste di ogni tipo, agro ecosistemi con coltivi, boschetti e siepi, parchi e giardini, aree urbane comprese le grandi città	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne</i>
Pipistrello di Savi			X		Antropico - Boschivo zone costiere, le aree rocciose, i boschi e le foreste di ogni tipo, nonché i più vari ambienti antropizzati, dalle zone agricole alle grandi città	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne</i>
Pispola			X		Incolto – Agricolo frequenta ambienti erbosi aperti, umidi e freschi, privi di vegetazione arborea o comunque con pochi alberi e di modesta altezza	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Piviere dorato			X		Palustre - Incolto coltivi scarsamente	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area</i>


					<i>alberati, lagune, barene e valli da pesca</i>	<i>di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Poiana		X			<i>Incolto – Agricolo- Boschivo zone boschive alternate a spazi aperti. anche ambienti umidi alberati</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Quaglia		X			<i>Incolto – Agricolo frequenta le campagne, vicino ai campi coltivati di fieno e cereali, nei terreni aperti con bassa vegetazione. generalmente solitaria si ritrova con gli altri per il periodo della migrazione</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Ramarro			X		<i>Incolto – Agricolo margini di boschi, cespuglieti, siepi, radure erbose, prati, coltivi, alvei di fiumi, aree urbane, pinete litoranee, pietraie</i>	<i>classe Rettili: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.</i>
Ratto delle chiaviche			X		<i>Agricolo - Antropico campagna, aree urbanizzate paludi, canali e fiumi, discariche, i porti, fognature, aree verdi, cantine</i>	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.</i>
Riccio			X		<i>Incolto – Agricolo boscaglie e le macchie, lo si trova frequentemente ai margini delle aree coltivate, nei giardini, nei parchi e nei frutteti</i>	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Rigogolo			X		<i>Incolto – Agricolo frequenta boschi di essenze a foglia caduca o misti, frutteti, pioppeti, boschi planiziali, parchi urbani e giardini</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Rinolofo maggiore			X		<i>Incolto - Antropico zone calde e aperte con alberi e cespugli prossime ad acque ferme o correnti, anche in vicinanza di insediamenti umani</i>	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne</i>
Rondine			X		<i>Incolto – Agricolo zone agricole con bestiame e fienili. compiono lunghissime migrazioni sorvolando aree aperte ma anche tratti di mare e creste montuose</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Rondone			X		<i>Incolto – Agricolo - Antropico vive in città e paesi soprattutto con centri storici ricchi di cavità, a volte anche su coste rocciose o altri dirupi naturali, mentre comunemente nella taiga e ormai solo localmente altrove nidifica nelle cavità scavate dai picchi negli alberi.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>

Saltimepalo			X		<i>Incolto – Agricolo</i> la sua residenza invernale è l'Europa meridionale e occidentale. in Europa centrale e orientale il saltimpalo è presente da marzo a novembre. vive su superfici aperte con vegetazione arbustiva, per esempio in brughiere, praterie alte, incolti, prati, campi coltivati.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Serotino comune			X		<i>Incolto – Antropico - Agricolo</i> aree boscate, parchi e giardini, agrosistemi con presenza di siepi.	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Smeriglio			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta ambienti aperti e semi-boscati, tundra, brughiere e zone umide	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Sparviero			X		<i>Incolto –Boschivo</i> boschi di qualsiasi tipo, anche governati a ceduo, e zone alberate in genere, a tutte le altitudini	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Starna			X		frequenta pianure e colline caratterizzate da alternanza di colture arate, medica, prati, pascoli, frutteti, vigneti, incolti, fasce cespugliose	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Stiaccino			X		<i>Incolto – Agricolo</i> nidifica in praterie ampie, ricche di strutture e leggermente concimate. sui pascoli estensivi, nelle torbiere alte e nelle associazioni alpine di arbusti nani gli effettivi sono lievemente inferiori	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Storno		X			<i>Incolto – Agricolo – Antropico</i> frequenta campagne coltivate e incolti di pianura, di collina ed anche di montagna, parchi e giardini, boschi, villaggi e città. in Italia è sedentario e nidificante, erratico, migratore e svernante regolare	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Strillozzo			X		<i>Incolto – Agricolo</i> predilige aree aperte o molto aperte, purché vi sia qualche alto posatoio come punto di controllo e di canto e qualche sito in grado di offrire riparo, ed evita quindi foreste, zone umide – frequentate solo come dormitori – terreni rocciosi e accidentati, alte montagne e aree urbane	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Succiapapre			X		<i>Incolto – Agricolo</i> le strutture dell'habitat	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area

					<i>del succiacapre sono molto varie, tuttavia sono sempre ambienti aperti, asciutti e dal clima temperato</i>	<i>di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Taccola		X			<i>Incolto – Agricolo - Antropico frequenta ambienti rupestri, boschi non troppo fitti, campagne alberate. nei centri urbani si insedia in posizioni dominanti: torri, campanili</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Talpa romana		X			<i>Incolto – Agricolo campi coltivati, prati con terreni prevalentemente freschi, porosi dove può agevolmente scavare le sue gallerie</i>	<i>classe Mammiferi: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.</i>
Tasso			X		<i>Incolto –Boschivo zone boschive con fitto sottobosco, incolti</i>	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Testuggine comune			X		<i>Incolto –Boschivo macchia mediterranea, boschi di querce e di lecci</i>	<i>classe Rettili: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Topo campagnolo			X		<i>Incolto – Agricolo ambienti boschivi e di macchia, sia costieri che di montagna, boschi, campi, giardini e pietraie</i>	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, e in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.</i>
Topo domestico		X			<i>Incolto – Agricolo - Antropico ambienti urbani e suburbani e selvatico</i>	<i>classe Mammiferi: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.</i>
Toporagno nano			X		<i>Incolto – Agricolo aree boschive, zone erbose e nelle siepi, cespuglieti, praterie, zone umide e fresche</i>	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.</i>
Tordela			X		<i>Incolto – Agricolo frequenta boschi puri o misti di conifere e latifoglie con radure e ampie aree erbose, dalle rive del mare alle alte montagne</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Tordo bottaccio			X		<i>Incolto – Agricolo frequenta boschi di conifere miste o di latifoglie ricchi di sottobosco, pianure alberate e cespugliate, vigneti, oliveti, macchia mediterranea, parchi e giardini.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>

Tordo sassello			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta boschi, parchi e, al di fuori del periodo della riproduzione, pascoli, zone coltivate, terreni in prossimità di zone umide	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Tortora			X		<i>Incolto – Agricolo</i> Il suo habitat preferenziale è quello dei campi, nelle zone rurali, nonché i margini delle terre coltivate ove siano presenti grandi alberi su cui nidificare.	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Tortora dal collare			X		<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> frequenta principalmente i parchi urbani e suburbani, nonché i margini delle terre coltivate ove siano presenti alberature	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Upupa			X		<i>Incolto – Agricolo</i> ama i luoghi secchi, semi-alberati, caldi e assolati e per questo la si può incontrare in frutteti, prati e vigneti o lungo strade sterrate tipiche delle nostre campagne, dove può fare i bagni di polvere e trovare il suo cibo preferito	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Verdone			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta campagne alberate, frutteti, boschi, campi coltivati a graminacee, parchi e giardini urbani e suburbani. predilige le zone pianeggianti	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Verzellino			X		<i>Incolto – Agricolo</i> l'habitat di questi uccelli è rappresentato dalle aree di pianura e collina con presenza di aree boschive non eccessivamente fitte, sia decidue che sempreverdi	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Volpe			X		<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> zone boschive e le pinete costiere, coltivi, incolti centri abitati	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Zigolo nero			X		<i>Incolto – Agricolo - Boschivo</i> frequenta praterie, incolti erbosi e cespugliati, coltivi, frutteti, vigneti, boschi anche molto degradati in zone collinari e montane	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.

Parco Eolico Fenice fase di Cantiere Impatti Diretti Fauna		
Grado di impatto	Specie	Percentuale
Impatto alto	0	0%
Impatto medio	22	14%
Impatto basso	72	47%
Impatto nullo	59	39%



Parco Eolico Fenice
stima degli impatti tra Fauna e opere di progetto
fase di CANTIERE

<i>Fauna</i>	<i>Stima degli impatti INDIRETTI</i>				<i>Habitat di predilezione</i>	<i>Note</i>
	<i>Alto</i>	<i>Medio</i>	<i>Basso</i>	<i>Nulla</i>		
Airone cenerino				X	<i>Palustre</i> frequenta prati umidi e torrenti anche nei pressi di centri urbani e abitati.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Airone guardabuoi				X	<i>Palustre - Incolto</i> frequenta zone umide poco estese, zone palustri, risaie e praterie dove si associa spesso al bestiame al pascolo. meno acquatico degli altri aironi	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Albanella minore			X		<i>Palustre – Incolto - Agricolo</i> brughiere, praterie, pascoli, steppe cerealicole a zone umide. generalmente alle basse quote. fino ai 1500 m in asia. anche nelle praterie d'altitudine durante le migrazioni.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Albanella reale			X		<i>Palustre – Incolto - Agricolo</i> brughiere, praterie, coltivi erbacei, pascoli e zone umide, generalmente al di sotto dei 500 m in Europa. localmente, quote più elevate in asia. anche in praterie d'altitudine durante le migrazioni	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Alborella				X	fiumi a corrente moderata, laghi di ogni estensione, canali di pianura.	Classe Pesci: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Allocco				X	<i>Boschivo</i> frequenta boschi di latifoglie e misti, alternati ad ampie radure che fungono da territori di caccia, zone agricole	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Allodola	X				<i>Incolto</i> frequenta campagne più o meno coltivate, steppe, prati, pascoli e dune sabbiose, sia in pianura che in quota	classe Uccelli: alta interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca

						trofica.
Alzavola				X	<i>Palustre con bassi fondali: paludi, torbiere, risaie, acquitrini, stagni, lagune, saline, aree di mare frequenta zone umide anche di piccole dimensioni</i>	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Arvicola terrestre	X				<i>Incolto - Agricolo fossi, canali irrigui, fiumi, stagni delle pianure e dei fondovalle, rive dei laghi, specchi d'acqua dolce e salmastra</i>	classe Mammiferi: alta interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Assiolo				X	<i>Incolto – Agricolo – Antropico ambienti aperti in genere, anche di tipo rurale o suburbano. fino ai 1500 m.</i>	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Averla capirossa				X	<i>Incolto - Agricolo frequenta campagne alberate con siepi, aree incolte ricche di cespugli e alberi sparsi, macchia mediterranea, oliveti, frutteti, vigneti,</i>	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Averla cenerina				X	<i>Incolto - Agricolo frequenta margini di boschi, campi coltivati e strade campestri con vegetazione ad alberi sparsi e cespugli sia in pianura che sui rilievi a pendii dolci. nelle zone di svernamento è presente nelle savane e nelle secche boscaglie di acacie.</i>	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Averla piccola				X	<i>Incolto - Agricolo ambienti aperti cespugliosi, campagne percorse da siepi, macchie rade, radure, lande incolte, ambienti ecotonali fra pascoli e bosco. dal fondovalle a quasi 2000 m s.l.m. nidifica fra i cespugli e piccoli alberi tra i 70 cm e i 2 metri.</i>	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Balestruccio				X	<i>Incolto - Agricolo costruiscono il loro nido sotto grondaie, tettoie, entrate delle porte, raramente anche sotto rupi, ponti in cemento armato o affini</i>	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Ballerina bianca				X	<i>Incolto – Agricolo frequenta un'ampia tipologia di habitat, preferendo le zone aperte, presso stagni, laghi, corsi d'acqua, rive marine. localmente può vivere su terreni secchi o addirittura semidesertici. si è pure adattata agli ambienti coltivati e a quelli urbani, dove trova abbondanza di cibo e di siti di nidificazione</i>	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Barbagianni				X	<i>Incolto – Agricolo – Antropico ambienti</i>	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di

					aperti di vario genere, comprese zone umide, rurali e suburbane. generalmente al di sotto dei 600 metri in Europa; anche a quote più elevate altrove	progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Barbastello comune			X		<i>Incolto – Agricolo – Antropico - Palustre</i> aree boscate collinari e di bassa e media montagna	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Beccaccia				X	<i>Boschivo</i> si riproduce in foreste miste di latifoglie, talvolta anche in consociazione con conifere, purchè sia garantita la presenza di sottobosco, radure e suoli ricchi di lettiera.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Beccaccino				X	<i>Palustre</i> si adatta dovunque, anche se predilige paludi, prati umidi, praterie e risaie.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Beccamoschino				X	<i>Palustre - Incolto</i> aree con bassa vegetazione erbosa, spesso vicino all'acqua, paludi, ma anche campi asciutti	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Biacco	X				<i>Incolto - Agricolo</i> macchie, margini di boschi, radure, zone rocciose, muri a secco e pietraie; anche siepi, coltivi e aree antropizzate	classe Rettili: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Biscia tassellata				X	habitat acquatici, da cui di solito non si allontana, fiumi, canali, torrenti e ruscelli.	classe Rettili: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Calandra		X			<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta zone aperte a clima secco, incolte o parzialmente coltivate, pianeggianti o collinari, con vegetazione bassa e assenza di alberi e cespugli	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Calandrella		X			<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta ambienti aridi aperti con scarsa vegetazione erbacea, greti ciottolosi e sabbiosi di corsi d'acqua, incolti, steppe cerealicole.	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Cannaiola				X	<i>Palustre</i> specie strettamente legata agli ambienti umidi e paludosi	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Capinera				X	<i>Incolto –Boschivo</i> vive nell'intrico delle siepi	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area

					<i>più fitte, nei cespugli e tra i rami degli alberi da frutta, ma non disdegna il sottobosco</i>	<i>di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cappellaccia		X			<i>Incolto - Agricolo frequenta gli ambienti steppici: terreni incolti, aridi, pietrosi, zone semidesertiche, lande coltivate preferibilmente a foraggiere, campi arati</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.</i>
Cardellino			X		<i>Incolto - Agricolo da prati fioriti, praterie con erba alta, boschi aperti, piantagioni, frutteti, parchi e giardini</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Carpa				X	<i>laghi grandi e piccoli e nei tratti medi ed inferiori dei fiumi</i>	<i>Classe Pesci: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Cavedano				X	<i>acque dolci correnti, limpide e calme. nei laghi si distribuisce lungo le acque litorali, nei fiumi fino agli estuari</i>	<i>Classe Pesci: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Cervone		X			<i>Incolto – Agricolo macchia mediterranea, il limitare di boschi, i boschi radi e soleggiati o in genere i luoghi con vegetazione sparsa, le sassaie, i muretti a secco e gli edifici abbandonati</i>	<i>classe Rettili: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.</i>
Cesena			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo frequenta boschi, parchi, frutteti in prossimità di praterie e pianure coltivate.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cicogna bianca				X	<i>Palustre ambienti aperti come paludi o pianure erbose, dove può trovare facilmente cibo; per nidificare sceglie punti molto alti e scoperti, come la cima di edifici o di tralicci elettrici</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cinciallegra				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo boschi di conifere, frutteti, campi, siepi, giardini e parchi urbani.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cinciarella				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo abita nei boschi misti di bassa collina o pianeggianti, nei frutteti, nei giardini e nei parchi. e' rara nelle foreste di conifere</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cinghiale				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo boschi folti a prevalenza di latifoglie con sottobosco, alternati a terreni pantanosi, pascoli o terreni coltivati</i>	<i>classe Mammiferi: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat.</i>
Civetta			X		<i>Incolto – Agricolo – Antropico zone</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area</i>

					<i>aperte, pianeggianti, collinari, montane, boschive e alberate, coltivate e incolte, secche e umide, appartate e frequentate. predilige gli ambienti urbanizzati, soprattutto quelli rurali</i>	<i>di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Codibugnolo				X	<i>Palustre frequenta i boschi di latifoglie con folto sottobosco, campagne con filari, frutteti e vigneti, parchi e giardini urbani</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Codiroso				X	<i>Incolto - Agricolo predilige boschi non troppo chiusi di larici e cembri, o boschi ai margini di torrenti. si concentra principalmente a quote medio-basse, ma arriva a raggiungere anche i 2000 metri di altitudine sulle alpi, mantenendosi generalmente nelle vicinanze di centri abitati.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI., Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Codiroso spazzacamino				X	<i>Incolto – Agricolo zone montane, nelle quali il codiroso spazzacamino va alla ricerca di terreni sassosi o pareti rocciose fino al limite delle nevi perenni. durante la stagione fredda, la specie abbandona queste zone per scendere a quote inferiori</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI., Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Colombaccio				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo si è ben adattato alle città, tanto da essere un assiduo frequentatore dei parchi, anche se è molto più timido del piccione; il suo habitat principale, tuttavia, rimane la campagna, dove è molto presente.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cornacchia grigia			X		<i>Incolto – Agricolo campagne coltivate purché disseminate di alberi, siepi e boschetti, pascoli, brughiere, boschi, rive di fiumi e laghi, coste marine, aree urbane e suburbane</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Corriere piccolo				X	<i>Palustre frequenta laghi, fiumi, ghiaietti allagati; durante l'inverno si può ritrovare lungo le coste marine.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cuculo				X	<i>frequenta le foreste con radure, campagne alberate, grandi parchi cittadini, pascoli d'alta quota fino a 2.000 m di altitudine sulle alpi.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cutrettola				X	<i>Palustre - Incolto predilige soprattutto i campi umidi, ma si può riprodurre anche in zone asciutte, come nei campi di cereali</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>

Donnola			X		<i>Incolto - Agricolo</i> terreni coltivati, boschi, zone cespugliate, sassaie e presso abitazioni abbandonate	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Fagiano			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> frequenta una grande varietà di ambienti, come i margini dei boschi, i parchi, i terreni coltivati, i canneti e le zone cespugliose, dal livello del mare fino a quote di 1500 metri circa.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Faina			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> boschi, margini di boschi, zone rocciose, spesso anche vicino ad abitazioni	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Falco cuculo			X		<i>Palustre - Incolto - Agricolo</i> frequenta gli ambienti aperti con esclusione di quelli desertici o troppo aridi: steppe alberate, terreni coltivati alternati a boschi, foreste	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Falco di palude			X		<i>Palustre - Incolto - Agricolo</i> zone umide interne e di litorale, con sufficienti estensioni di canneti. anche foraggiere e steppe cerealicole, soprattutto se adiacenti ad ambienti allagati	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Falco pecchiaiolo			X		<i>Incolto – Boschivo</i> frequenta gli ambienti boscosi d'ogni tipo, possibilmente con spazi aperti sia in pianura che in montagna	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Falco pellegrino		X			<i>Palustre - Incolto - Agricolo</i> predilige gli habitat aperti, come praterie, tundra e campi. sono più diffusi nella tundra e nelle aree costiere	classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Folaga				X	<i>Palustre</i> stagni calmi, terreni umidi e acque che scorrono lentamente, con molte piante acquatiche e canne palustri.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Fringuello			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> frequenta boschi, siepi, giardini, aree aperte con alberi sparsi	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gabbiano comune			X		<i>Palustre - Agricolo</i> frequenta le zone umide sia d'acqua dolce che salata, naturali o artificiali, costiere o dell'entroterra; è pure presente nei laghetti e lungo i fiumi all'interno delle città.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gabbiano reale			X		<i>Palustre - Agricolo</i> frequenta le coste e il	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area

					<i>mare aperto, le zone umide costiere, le aree portuali e le città costiere; di rado si inoltra nell'entroterra. abitualmente si porta nelle discariche di rifiuti urbani</i>	<i>di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Gallinella d'acqua				X	<i>Palustre frequenta zone umide con fitta vegetazione, fiumi a corso lento, risaie e praterie in prossimità dell'acqua</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Garzetta			X		<i>Palustre ambienti acquitrinosi, sponde di fiumi, laghi e stagni</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Gazza			X		<i>Incolto - Agricolo prati, cespuglietti, margini dei boschi, frutteti, campi coltivati e in generale da spazi aperti.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Geco comune				X	<i>Agricolo- Antropico muri a secco, nelle vecchie abitazioni e nelle rovine, nelle legnaie e sui tetti</i>	<i>classe Rettili: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Germano reale				X	<i>Palustre zone umidi d'acqua dolce quali laghi, fiumi, risorgive, stagni e paludi, e si adatta bene anche in habitat intensamente coltivati</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Gheppio		X			<i>Incolto - Agricolo campi aperti ed erbosi e terreni agricoli, che forniscono loro sufficienti spazi aperti</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Ghiandaia				X	<i>Incolto — Boschivo foreste cedue e miste, con predilezione per le aree boschive a prevalenza di querce e carpini</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Ghiandaia marina			X		<i>Incolto - Agricolo frequenta praterie steppose, zone incolte, coltivi con alberi sparsi, boschi di querce e pinete con radure sia di pianura che di bassa collina.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Grillaio		X			<i>Incolto - Agricolo frequenta ambienti aperti con scarsa copertura arborea ed arbustiva: prati, pascoli, praterie, zone stepposo-cerealicole, ambienti rocciosi</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Gru				X	<i>Palustre frequenta torbiere alberate, zone aperte erbose e paludi. nelle zone di svernamento</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di</i>

					<i>è presente in lagune, steppe, pascoli, aree coltivate e lungo il corso di grandi fiumi e laghi</i>	<i>progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Gruccione			X		<i>Palustre - Incolto campagne aperte con vegetazione arborea e arbustiva poco densa e discontinua.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Gufo comune			X		<i>Incolto – Agricolo- Antropico ambienti aperti con alberi sparsi, in filari o in macchie. anche zone boschive alternate a zone aperte</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Lepre comune			X		<i>Incolto - Agricolo campi coltivati, incolti, boschi</i>	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Lodolaio			X		<i>Incolto - Agricolo frequenta colline, pianure, boschi, in prossimità di zone umide. caccia prevalentemente in volo, di mattina presto o di sera tardi.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Lucarino				X	<i>Incolto - Boschivo boschi di conifere, prediligendo soprattutto gli alberi di larici e abeti rossi, nonché ontano e betulla</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Lucertola campestre		X			<i>Incolto – Agricolo margini di boschi, boscaiglie, radure e prati, coltivi, aree urbane, pietraie, cataste di legna, pinete litoranee, litorali sabbiosi, dune con vegetazione scarsa, alvei di torrenti e fiumi, sponde di laghi e stagni</i>	<i>classe Rettili: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.</i>
Luì piccolo				X	<i>Incolto - Boschivo frequenta un'ampia varietà di habitat con alberi e arbusti, quali parchi e boschi misti o decidui</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Lupo			X		<i>Incolto – Boschivo - Agricolo zone montane densamente boscate, relativamente ricche di siti rifugio e di prede e con scarsa presenza antropica</i>	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Marangone				X	<i>Palustre frequenta le zone umide d'acqua dolce o debolmente salmastra, caratterizzate da abbondante vegetazione palustre emergente.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Martin pescatore				X	<i>Palustre strettamente legato alla vita acquatica, frequenta fiumi, torrenti, laghi, stagni, canali, lagune salmastre ed estuari.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>

Marzaiola				X	<i>Palustre</i> frequenta le zone umide aperte anche di piccole dimensioni, con acque dolci e bassi fondali, ed evita quelle troppo chiuse dalla vegetazione	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Merlo				X	<i>Incolto - Boschivo</i> il bosco, ma si adatta a vivere in numerosi ambienti e non raramente lo si trova nei frutteti e nei vigneti, in aree urbane a contatto ravvicinato con l'uomo..	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Mestolone				X	<i>Palustre</i> frequenta specchi d'acqua dolce e salmastra con fitta vegetazione e ricche di fango.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Migliarino di palude				X	<i>Palustre</i> paludi e acquitrini con canneti, carici, erbe alte, e alberi. durante la migrazione frequenta anche habitat più secchi.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Mignattino				X	<i>Palustre</i> zone paludose d'acqua dolce naturali o artificiali, laghi, fiumi a corso lento, risaie, lagune salmastre, saline, estuari e coste del mare.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Natrice dal collare				X	<i>Palustre</i> zone umide di ogni tipo corsi d'acqua ricchi di anfibi	classe Rettili: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Nibbio bruno		X			<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> vive in zone di pianura o collinari, in zone boschive mature miste di latifoglie, circondate da zone aperte terrestri o acquatiche, pascoli	classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Nibbio reale		X			<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> aree collinari in cui sono presenti boschi con alberi sufficientemente grandi da potervi collocare il nido accanto ad ampie aree aperte, sia coltivate che non, in cui si alimenta; evita le zone con agricoltura intensiva.	classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Nottola comune			X		<i>Boschivo - Incolto</i> zone boschive e di habitat forestali	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Oca selvatica				X	<i>Palustre- Incolto</i> nelle aree di riproduzione frequenta preferibilmente le zone umide con acqua dolce ricche di vegetazione palustre, mentre nei quartieri di svernamento è presente nei terreni palustri poco profondi anche di acque salmastre,	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.

					nei pascoli, nei campi coltivati e, ove è disturbata, in mare	
Occhiocotto				X	<i>Incolto - Boschivo</i> frequenta la macchia mediterranea, i boschi con fitto strato arbustivo, i cespugliati di steppa, i parchi e i giardini urbani	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Occhione			X		<i>Incolto – Agricolo</i> occupa ambienti aridi, prati, coltivi, pascoli, spesso in prossimità di zone umide. specie terricola,	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Passera europea			X		<i>Incolto – Agricolo-Antropico</i> zone agricole, zone urbane; comportamento migratorio. sedentaria; sito di nidificazione. edificio	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Passera mattugia			X		<i>Incolto – Agricolo- Antropico</i> predilige paesaggi agricoli ricchi di siepi, boschetti campestri e alberi. dove siano disponibili cavità adatte alla nidificazione, cova anche nei frutteti, negli edifici delle aziende agricole e nei parchi. la si trova anche lungo i bordi dei boschi, mentre evita agglomerati con poco verde.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Passera scopaiola				X	<i>Palustre – Incolto</i> occupa principalmente boschi con sottobosco, giovani piantagioni di conifere, torbiere boscate e arbusteti di ontano che dominano il limite della vegetazione arborea	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Passero solitario			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta pendii aridi e assolati in zone rocciose dalle coste marine alle alte montagne, cave di pietra, ambienti urbani e manufatti	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Pavoncella				X	<i>Palustre – Incolto</i> è tipica di ambienti aperti; nidifica in prati, campi coltivati e incolti. durante la riproduzione è territoriale	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Pendolino				X	<i>Palustre</i> frequenta le zone umide di pianura con acqua dolce o salmastra, ricche di cespugli, alberi e canneti. di rado si insedia a quote superiori ai 200	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Pettirosso			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> i boschi di conifere sono il suo habitat naturale, ma è spesso presente anche in giardini, siepi, boschetti, boschi con sottobosco. nidifica nei buchi o nelle spaccature di alberi, ai piedi delle siepi, nell'edera o anche in vecchi oggetti lasciati dall'uomo.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.

Picchio rosso maggiore				X	<i>Boschivo</i> frequenta le zone collinari e di pianura con boschi sia fitti che radi, parchi, giardini, siepi alberate in aperta campagna e coltivazioni di pioppo	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Picchio verde				X	<i>Boschivo</i> vive in boschi, boschetti e luoghi alberati, con tutte le esposizioni, in zone umide e secche, appartate e frequentate. preferisce le zone alberate discontinue, alternate da zone coltivate.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Piccione selvatico		X			<i>Incolto – Agricolo</i> frequentano coste rocciose marine e ambienti circostanti, zone rocciose dell'interno. si nutrono principalmente di sostanze vegetali raccolte direttamente sul terreno o posandosi sugli alberi (o sugli arbusti	classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Pipistrello albolimbato			X		<i>Incolto - Antropico</i> boschi e foreste di ogni tipo, agro ecosistemi con coltivi, boschetti e siepi, parchi e giardini, aree urbane comprese le grandi città	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Pipistrello di Savi			X		<i>Antropico - Boschivo</i> zone costiere, le aree rocciose, i boschi e le foreste di ogni tipo, nonché i più vari ambienti antropizzati, dalle zone agricole alle grandi città	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Piro piro boschereccio				X	<i>Palustre</i> zone agricole, laghi, zone umide, corsi d'acqua; comportamento migratorio. prevalentemente migratrice su lunga distanza	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Piro-piro culbianco				X	<i>Palustre</i> cave di argilla e zone umide con boschetti e canneti	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Piro-piro piccolo				X	<i>Palustre</i> in periodo riproduttivo frequenta le rive dei corsi d'acqua, specie a regime torrentizio, e quelle dei laghi, preferendo le sponde sassose o ciottolose anziché quelle sabbiose o fangose; nelle aree di svernamento s'insedia in un'ampia varietà di zone umide, sia dell'entroterra che costiere	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Pispola			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta ambienti erbosi aperti, umidi e freschi, privi di vegetazione arborea o comunque con pochi alberi e di modesta altezza	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Piviere dorato			X		<i>Palustre - Incolto</i> coltivi scarsamente alberati, lagune, barene e valli da pesca	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area

						di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Poiana		X			<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> zone boschive alternate a spazi aperti. anche ambienti umidi alberati	classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Quaglia		X			<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta le campagne, vicino ai campi coltivati di fieno e cereali, nei terreni aperti con bassa vegetazione. generalmente solitaria si ritrova con gli altri per il periodo della migrazione	classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Ramarro		X			<i>Incolto – Agricolo</i> margini di boschi, cespuglieti, siepi, radure erbose, prati, coltivati, alvei di fiumi, aree urbane, pinete litoranee, pietraie	classe Rettili: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Rana agile				X	boschi e boscaglie, anche xerofili, radure, campi e prati umidi	classe Anfibi: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Rana verde italiana				X	<i>Palustre</i> ambienti umidi, zone costiere. sottobosco di pinete e foreste di latifoglie, in prati e coltivati	classe Anfibi: nessuna interferenza in diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Ratto delle chiaviche		X			<i>Agricolo - Antropico</i> campagna, aree urbanizzate paludi, canali e fiumi, discariche, i porti, fognature, aree verdi, cantine	classe Mammiferi: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Regolo				X	<i>Incolto –Boschivo</i> frequenta boschi misti e di conifere e, in inverno, nel sottobosco e nelle siepi..	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Riccio			X		<i>Incolto – Agricolo</i> boscaglie e le macchie, lo si trova frequentemente ai margini delle aree coltivate, nei giardini, nei parchi e nei frutteti	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Rigogolo			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta boschi di essenze a foglia caduca o misti, frutteti, pioppeti, boschi planiziali, parchi urbani e giardini	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Rinolofo maggiore			X		<i>Incolto - Antropico</i> zone calde e aperte con alberi e cespugli prossime ad acque ferme o correnti, anche in vicinanza di insediamenti umani	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne

Rondine			X		<i>Incolto – Agricolo</i> zone agricole con bestiame e fienili. compiono lunghissime migrazioni sorvolando aree aperte ma anche tratti di mare e creste montuose	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Rondone			X		<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> vive in città e paesi soprattutto con centri storici ricchi di cavità, a volte anche su coste rocciose o altri dirupi naturali, mentre comunemente nella taiga e ormai solo localmente altrove nidifica nelle cavità scavate dai picchi negli alberi.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Rospo comune				X	<i>Palustre</i> aree boschive di conifere, latifoglie e boschi misti, soprattutto in luoghi umidi, tanto quanto campagne aperte	Classe Anfibi: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Rospo smeraldino				X	<i>Palustre</i> habitat umidi, orti, coltivi, giardini	classe Anfibi: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Saltimpalo			X		<i>Incolto – Agricolo</i> la sua residenza invernale è l'Europa meridionale e occidentale. in Europa centrale e orientale il saltimpalo è presente da marzo a novembre. vive su superfici aperte con vegetazione arbustiva, per esempio in brughiere, praterie alte, incolti, prati, campi coltivati.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Scricciolo				X	<i>Incolto –Boschivo</i> frequenta un'ampia varietà di ambienti: boschi e loro margini, zone fresche e ombrose con cespugli e alberi sparsi, macchia mediterranea	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Serotino comune			X		<i>Incolto – Antropico . Agricolo</i> aree boscate , parchi e giardini, agrosistemi con presenza di siepi.	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Smeriglio			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta ambienti aperti e semi-boscati, tundra, brughiere e zone umide	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Sparviero			X		<i>Incolto –Boschivo</i> boschi di qualsiasi tipo, anche governati a ceduo, e zone alberate in genere, a tutte le altitudini	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Starna			X		frequenta pianure e colline caratterizzate da alternanza di colture arate, medicaie, prati, pascoli,	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area


					<i>frutteti, vigneti, incolti, fasce cespugliose</i>	<i>di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Sterpazzola				X	<i>Incolto – Boschivo frequenta ambienti soleggiati ove si alternano spazi aperti con folta vegetazione erbacea e cespugli, dal livello del mare fino ad altitudini di circa 1.500 metri. nella stagione riproduttiva preferisce i margini dei boschi, le radure, i terreni incolti e le brughiere</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Stiaccino				X	<i>Incolto – Agricolo nidifica in praterie ampie, ricche di strutture e leggermente concimate. sui pascoli estensivi, nelle torbiere alte e nelle associazioni alpine di arbusti nani gli effettivi sono lievemente inferiori</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Sorno			X		<i>Incolto – Agricolo – Antropico frequenta campagne coltivate e incolti di pianura, di collina ed anche di montagna, parchi e giardini, boschi, villaggi e città. in Italia è sedentario e nidificante, erratico, migratore e svernante regolare</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Strillozzo				X	<i>Incolto – Agricolo predilige aree aperte o molto aperte, purché vi sia qualche alto posatoio come punto di controllo e di canto e qualche sito in grado di offrire riparo, ed evita quindi foreste, zone umide – frequentate solo come dormitori – terreni rocciosi e accidentati, alte montagne e aree urbane</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Succiapapre				X	<i>Incolto – Agricolo le strutture dell'habitat del succiapapre sono molto varie, tuttavia sono sempre ambienti aperti, asciutti e dal clima temperato</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Taccola			X		<i>Incolto – Agricolo - Antropico frequenta ambienti rupestri, boschi non troppo fitti, campagne alberate. nei centri urbani si insedia in posizioni dominanti: torri, campanili</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Talpa romana			X		<i>Incolto – Agricolo campi coltivati, prati con terreni prevalentemente freschi, porosi dove può agevolmente scavare le sue gallerie</i>	<i>classe Mammiferi: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.</i>
Tarabusino				X	<i>Palustre zone umide d'acqua dolce, ferma o corrente; predilige canneti fitti come il suo parente di maggiori dimensioni</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di</i>

						progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Tasso			X		<i>Incolto –Boschivo</i> zone boschive con fitto sottobosco, incolti	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Testuggine comune			X		<i>Incolto –Boschivo</i> macchia mediterranea, boschi di querce e di lecci	classe Rettili: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Testuggine d’acqua				X	<i>Palustre</i> stagni, laghi, risorgive, fiumi, canali e fossati, paludi, bacini di cave esaurite; in generale, zone umide con ricca vegetazione.	classe Rettili: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Topo campagnolo		X			<i>Incolto – Agricolo</i> ambienti boschivi e di macchia, sia costieri che di montagna, boschi, campi, giardini e pietraie	classe Mammiferi: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Topo domestico		X			<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> ambienti urbani e suburbani e selvatico	classe Mammiferi: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall’incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Toporagno nano		X			<i>Incolto – Agricolo</i> aree boschive, zone erbose e nelle siepi, cespuglieti, praterie, zone umide e fresche	classe Mammiferi: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Tordela			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta boschi puri o misti di conifere e latifoglie con radure e ampie aree erbose, dalle rive del mare alle alte montagne	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Tordo bottaccio			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta boschi di conifere miste o di latifoglie ricchi di sottobosco, pianure alberate e cespugliate, vigneti, oliveti, macchia mediterranea, parchi e giardini.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Tordo sassello			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta boschi, parchi e, al di fuori del periodo della riproduzione, pascoli, zone coltivate, terreni in prossimità di zone umide	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Tortora		X			<i>Incolto – Agricolo</i> Il suo habitat preferenziale è quello dei campi, nelle zone rurali, dove siano presenti grandi alberi su cui nidificare.	classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall’incremento di mezzi

						meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Tortora dal collare		X			<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> frequenta principalmente i parchi urbani e suburbani, nonché i margini delle terre coltivate ove siano presenti alberature	classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Tritone italico				X	<i>Palustre</i> laghi, stagni, maceri, pozze, risorgive, fuori dall'acqua in ambienti del suolo, prati e boschi	classe Anfibi: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Tuffetto				X	<i>Palustre</i> frequenta le zone umide sia d'acqua dolce che debolmente salmastra anche di piccole dimensioni, purché sia presente un'abbondante vegetazione	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Upupa			X		<i>Incolto – Agricolo</i> ama i luoghi secchi, semi-alberati, caldi e assolati e per questo la si può incontrare in frutteti, prati e vigneti o lungo strade sterrate tipiche delle nostre campagne, dove può fare i bagni di polvere e trovare il suo cibo preferito	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Usignolo di fiume				X	<i>Palustre</i> frequenta la fitta vegetazione ripariale erbacea e arbustiva delle zone paludose, delle rive di fiumi, laghi e stagni, e delle torbiere.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Verdone			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta campagne alberate, frutteti, boschi, campi coltivati a graminacee, parchi e giardini urbani e suburbani. predilige le zone pianeggianti	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Verzellino			X		<i>Incolto – Agricolo</i> l'habitat di questi uccelli è rappresentato dalle aree di pianura e collina con presenza di aree boschive non eccessivamente fitte, sia decidue che sempreverdi	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Vipera comune				X	<i>Incolti - -Boschivo</i> luoghi aridi e caldi arbusti, siepi, margini dei boschi.	classe Rettili: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Volpe			X		<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> zone boschive e le pinete costiere, coltivi, incolti centri abitati	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Zigolo nero			X		<i>Incolto – Agricolo - Boschivo</i> frequenta praterie, incolti erbosi e cespugliati, coltivi, frutteti, vigneti, boschi anche molto degradati in	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto,

					<i>zone collinari e montane</i>	<i>durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>

Parco Eolico Fenice fase di Cantiere Impatti Indiretti Fauna		
<i>Grado di impatto</i>	<i>Specie</i>	<i>Percentuale</i>
<i>Impatto alto</i>	3	2%
<i>Impatto medio</i>	24	16%
<i>Impatto basso</i>	67	44%
<i>Impatto nullo</i>	59	38%



Parco Eolico Fenice
stima degli impatti tra Fauna e opere di progetto
fase di ESERCIZIO

<i>Fauna</i>	<i>Stima degli impatti DIRETTI</i>				<i>Habitat di predilezione</i>	<i>Note</i>
	<i>Alto</i>	<i>Medio</i>	<i>Basso</i>	<i>Nulla</i>		
Airone cenerino			X		<i>Palustre</i> frequenta prati umidi e torrenti anche nei pressi di centri urbani e abitati.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Airone guardabuoi			X		<i>Palustre - Incolto</i> frequenta zone umide poco estese, zone palustri, risaie e praterie dove si associa spesso al bestiame al pascolo. meno acquatico degli altri aironi	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Albanella minore			X		<i>Palustre – Incolto - Agricolo</i> brughiere, praterie, pascoli, steppe cerealicole a zone umide. generalmente alle basse quote. fino ai 1500 m in asia. anche nelle praterie d'altitudine durante le migrazioni.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Albanella reale			X		<i>Palustre – Incolto - Agricolo</i> brughiere, praterie, coltivi erbacei, pascoli e zone umide, generalmente al di sotto dei 500 m in Europa. localmente, quote più elevate in asia. anche in praterie d'altitudine durante le migrazioni	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Alborella				X	fiumi a corrente moderata, laghi di ogni estensione, canali di pianura.	Classe Pesci: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Allocco				X	<i>Boschivo</i> frequenta boschi di latifoglie e misti, alternati ad ampie radure che fungono da territori di caccia, zone agricole	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Allodola		X			<i>Incolto</i> frequenta campagne più o meno coltivate, steppe, prati, pascoli e dune sabbiose, sia in pianura che in quota.	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per

						la ricerca trofica. Sottrazione di habitat.
Alzavola				X	<i>Palustre con bassi fondali: paludi, torbiere, risaie, acquitrini, stagni, lagune, saline, aree di mare frequenta zone umide anche di piccole dimensioni</i>	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Arvicola terrestre		X			<i>Incolto - Agricolo fossi, canali irrigui, fiumi, stagni delle pianure e dei fondovalle, rive dei laghi, specchi d'acqua dolce e salmastra</i>	classe Mammiferii: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Assiolo				X	<i>Incolto – Agricolo – Antropico ambienti aperti in genere, anche di tipo rurale o suburbano. fino ai 1500 m.</i>	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Averla capirossa			X		<i>Incolto - Agricolo frequenta campagne alberate con siepi, aree incolte ricche di cespugli e alberi sparsi, macchia mediterranea, oliveti, frutteti, vigneti,</i>	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Averla cenerina			X		<i>Incolto - Agricolo frequenta margini di boschi, campi coltivati e strade campestri con vegetazione ad alberi sparsi e cespugli sia in pianura che sui rilievi a pendii dolci. nelle zone di svernamento è presente nelle savane e nelle secche boscaglie di acacie.</i>	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Averla piccola			X		<i>Incolto - Agricolo ambienti aperti cespugliosi, campagne percorse da siepi, macchie rade, radure, lande incolte, ambienti ecotonali fra pascoli e bosco. dal fondovalle a quasi 2000 m s.l.m. nidifica fra i cespugli e piccoli alberi tra i 70 cm e i 2 metri.</i>	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Balestruccio			X		<i>Incolto - Agricolo costruiscono il loro nido sotto grondaie, tettoie, entrate delle porte, raramente anche sotto rupi, ponti in cemento armato o affini</i>	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Ballerina bianca				X	<i>Incolto - Agricolofrequenta un'ampia tipologia di habitat, preferendo le zone aperte, presso stagni, laghi, corsi d'acqua, rive marine. localmente può vivere su terreni secchi o addirittura semidesertici. si è pure adattata agli ambienti coltivati e a quelli urbani, dove trova abbondanza di cibo e di siti di nidificazione</i>	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Barbagianni			X		<i>Incolto – Agricolo – Antropico ambienti</i>	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di

					aperti di vario genere, comprese zone umide, rurali e suburbane. generalmente al di sotto dei 600 metri in europa; anche a quote più elevate altrove	progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Barbastello comune			X		<i>Incolto – Agricolo – Antropico - Palustre</i> aree boscate collinari e di bassa e media montagna	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Beccaccia				X	<i>Boschivo</i> si riproduce in foreste miste di latifoglie, talvolta anche in consociazione con conifere, purchè sia garantita la presenza di sottobosco, radure e suoli ricchi di lettiera.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Beccaccino				X	<i>Palustre</i> si adatta dovunque, anche se predilige paludi, prati umidi, praterie e risaie.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Beccamoschino				X	<i>Palustre - Incolto</i> aree con bassa vegetazione erbosa, spesso vicino all'acqua, paludi, ma anche campi asciutti	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Biacco			X		<i>Incolto - Agricolo</i> macchie, margini di boschi, radure, zone rocciose, muri a secco e pietraie; anche siepi, coltivi e aree antropizzate	classe Rettili: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Biscia tassellata				X	habitat acquatici, da cui di solito non si allontana, fiumi, canali, torrenti e ruscelli.	classe Rettili: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Calandra			X		<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta zone aperte a clima secco, incolte o parzialmente coltivate, pianeggianti o collinari, con vegetazione bassa e assenza di alberi e cespugli	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Calandrella			X		<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta ambienti aridi aperti con scarsa vegetazione erbacea, greti ciottolosi e sabbiosi di corsi d'acqua, incolti, steppe cerealicole.	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Cannaiola				X	<i>Palustre</i> specie strettamente legata agli ambienti umidi e paludosi	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Capinera				X	<i>Incolto –Boschivo</i> vive nell'intrico delle siepi	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area

					<i>più fitte, nei cespugli e tra i rami degli alberi da frutta, ma non disdegna il sottobosco</i>	<i>di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cappellaccia		X			<i>Incolto - Agricolo frequenta gli ambienti steppici: terreni incolti, aridi, pietrosi, zone semidesertiche, lande coltivate preferibilmente a foraggiare, campi arati</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Cardellino				X	<i>Incolto - Agricolo da prati fioriti, praterie con erba alta, boschi aperti, piantagioni, frutteti, parchi e giardini</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Carpa				X	<i>laghi grandi e piccoli e nei tratti medi ed inferiori dei fiumi</i>	<i>Classe Pesci: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Cavedano				X	<i>acque dolci correnti, limpide e calme. nei laghi si distribuisce lungo le acque litorali, nei fiumi fino agli estuari</i>	<i>Classe Pesci: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Cervone		X			<i>Incolto – Agricolo macchia mediterranea, il limitare di boschi, i boschi radi e soleggiati o in genere i luoghi con vegetazione sparsa, le sassaie, i muretti a secco e gli edifici abbandonati</i>	<i>classe Rettili: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.</i>
Cesena				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo frequenta boschi, parchi, frutteti in prossimità di praterie e pianure coltivate.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cicogna bianca				X	<i>Palustre ambienti aperti come paludi o pianure erbose, dove può trovare facilmente cibo; per nidificare sceglie punti molto alti e scoperti, come la cima di edifici o di tralicci elettrici</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cinciallegra				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo boschi di conifere, frutteti, campi, siepi, giardini e parchi urbani.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cinciarella				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo abita nei boschi misti di bassa collina o pianeggianti, nei frutteti, nei giardini e nei parchi. e' rara nelle foreste di conifere</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cinghiale				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo boschi folti a prevalenza di latifoglie con sottobosco, alternati a terreni pantanosi, pascoli o terreni coltivati</i>	<i>classe Mammiferi :nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat.</i>
Civetta				X	<i>Incolto – Agricolo – Antropico zone</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di</i>

					<i>aperte, pianeggianti, collinari, montane, boschive e alberate, coltivate e incolte, secche e umide, appartate e frequentate. predilige gli ambienti urbanizzati, soprattutto quelli rurali</i>	<i>progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Codibugnolo				X	<i>Palustre frequenta i boschi di latifoglie con folto sottobosco, campagne con filari, frutteti e vigneti, parchi e giardini urbani</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Codiroso				X	<i>Incolto - Agricolo predilige boschi non troppo chiusi di larici e cembri, o boschi ai margini di torrenti. si concentra principalmente a quote medio-basse, ma arriva a raggiungere anche i 2000 metri di altitudine sulle alpi, mantenendosi generalmente nelle vicinanze di centri abitati.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Codiroso spazzacamino				X	<i>Incolto - Agricolo zona montane, nelle quali il codiroso spazzacamino va alla ricerca di terreni sassosi o pareti rocciose fino al limite delle nevi perenni. durante la stagione fredda, la specie abbandona queste zone per scendere a quote inferiori</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Colombaccio			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo si è ben adattato alle città, tanto da essere un assiduo frequentatore dei parchi, anche se è molto più timido del piccione; il suo habitat principale, tuttavia, rimane la campagna, dove è molto presente.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cornacchia grigia		X			<i>Incolto - Agricolo campagne coltivate purché disseminate di alberi, siepi e boschetti, pascoli, brughiere, boschi, rive di fiumi e laghi, coste marine, aree urbane e suburbane</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Corriere piccolo				X	<i>Palustre frequenta laghi, fiumi, ghiaietti allagati; durante l'inverno si può ritrovare lungo le coste marine.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cuculo			X		<i>frequenta le foreste con radure, campagne alberate, grandi parchi cittadini, pascoli d'alta quota fino a 2.000 m di altitudine sulle alpi.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cutrettola				X	<i>Palustre - Incolto predilige soprattutto i campi umidi, ma si può riprodurre anche in zone asciutte, come nei campi di cereali</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>

Donnola			X		<i>Incolto - Agricolo</i> terreni coltivati, boschi, zone cespugliate, sassaie e presso abitazioni abbandonate	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Fagiano			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> frequenta una grande varietà di ambienti, come i margini dei boschi, i parchi, i terreni coltivati, i canneti e le zone cespugliose, dal livello del mare fino a quote di 1500 metri circa.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Faina			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> boschi, margini di boschi, zone rocciose, spesso anche vicino ad abitazioni	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Falco cuculo			X		<i>Palustre - Incolto - Agricolo</i> frequenta gli ambienti aperti con esclusione di quelli desertici o troppo aridi: steppe alberate, terreni coltivati alternati a boschi, foreste	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Falco di palude			X		<i>Palustre - Incolto - Agricolo</i> zone umide interne e di litorale, con sufficienti estensioni di canneti. anche foraggiere e steppe cerealicole, soprattutto se adiacenti ad ambienti allagati	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Falco pecchiaiolo			X		<i>Incolto – Boschivo</i> frequenta gli ambienti boscosi d'ogni tipo, possibilmente con spazi aperti sia in pianura che in montagna	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Falco pellegrino		X			<i>Palustre - Incolto - Agricolo</i> predilige gli habitat aperti, come praterie, tundra e campi. sono più diffusi nella tundra e nelle aree costiere	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ma fuori area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Folaga				X	<i>Palustre</i> stagni calmi, terreni umidi e acque che scorrono lentamente, con molte piante acquatiche e canne palustri.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Fringuello			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> frequenta boschi, siepi, giardini, aree aperte con alberi sparsi	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gabbiano comune			X		<i>Palustre - Agricolo</i> frequenta le zone umide sia d'acqua dolce che salata, naturali o artificiali, costiere o dell'entroterra; è pure presente nei laghetti e lungo i fiumi all'interno delle città.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gabbiano reale			X		<i>Palustre - Agricolo</i> frequenta le coste e il	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ma fuori area di

					<i>mare aperto, le zone umide costiere, le aree portuali e le città costiere; di rado si inoltra nell'entroterra. abitualmente si porta nelle discariche di rifiuti urbani</i>	<i>impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Gallinella d'acqua				X	<i>Palustre</i> frequenta zone umide con fitta vegetazione, fiumi a corso lento, risaie e praterie in prossimità dell'acqua	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Garzetta			X		<i>Palustre</i> ambienti acquitrinosi, sponde di fiumi, laghi e stagni	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Gazza			X		<i>Incolto - Agricolo</i> prati, cespuglietti, margini dei boschi, frutteti, campi coltivati e in generale da spazi aperti.	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Geco comune				X	<i>Agricolo- Antropico</i> muri a secco, nelle vecchie abitazioni e nelle rovine, nelle legnaie e sui tetti	<i>classe Rettili: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Germano reale			X		<i>Palustre</i> zone umide d'acqua dolce quali laghi, fiumi, risorgive, stagni e paludi, e si adatta bene anche in habitat intensamente coltivati	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Gheppio		X			<i>Incolto - Agricolo</i> campi aperti ed erbosi e terreni agricoli, che forniscono loro sufficienti spazi aperti	<i>classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Ghiandaia				X	<i>Incolto -- Boschivo</i> foreste cedue e miste, con predilezione per le aree boschive a prevalenza di querce e carpini	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Ghiandaia marina			X		<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta praterie steppose, zone incolte, coltivi con alberi sparsi, boschi di querce e pinete con radure sia di pianura che di bassa collina.	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Grillaio		X			<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta ambienti aperti con scarsa copertura arborea ed arbustiva: prati, pascoli, praterie, zone stepposo-cerealicole, ambienti rocciosi	<i>classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Gru			X		<i>Palustre</i> frequenta torbiere alberate, zone aperte erbose e paludi. nelle zone di svernamento	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto</i>

					<i>è presente in lagune, steppe, pascoli, aree coltivate e lungo il corso di grandi fiumi e laghi</i>	<i>durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Gruccione			X		<i>Palustre - Incolto campagne aperte con vegetazione arborea e arbustiva poco densa e discontinua.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Gufo comune			X		<i>Incolto – Agricolo- Antropico ambienti aperti con alberi sparsi, in filari o in macchie. anche zone boschive alternate a zone aperte</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Lepre comune			X		<i>Incolto - Agricolo campi coltivati, incolti, boschi</i>	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Lodolaio			X		<i>Incolto - Agricolo frequenta colline, pianure, boschi, in prossimità di zone umide. caccia prevalentemente in volo, di mattina presto o di sera tardi.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Lucarino				X	<i>Incolto - Boschivo boschi di conifere, prediligendo soprattutto gli alberi di larici e abeti rossi, nonché ontano e betulla</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Lucertola campestre			X		<i>Incolto – Agricolo margini di boschi, boscaiglie, radure e prati, coltivati, aree urbane, pietraie, cataste di legna, pinete litoranee, litorali sabbiosi, dune con vegetazione scarsa, alvei di torrenti e fiumi, sponde di laghi e stagni</i>	<i>classe Rettili: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.</i>
Luì piccolo				X	<i>Incolto - Boschivo frequenta un'ampia varietà di habitat con alberi e arbusti, quali parchi e boschi misti o decidui</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Lupo			X		<i>Incolto – Boschivo - Agricolo zone montane densamente boscate, relativamente ricche di siti rifugio e di prede e con scarsa presenza antropica</i>	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Marangone				X	<i>Palustre frequenta le zone umide d'acqua dolce o debolmente salmastra, caratterizzate da abbondante vegetazione palustre emergente.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Martin pescatore				X	<i>Palustre strettamente legato alla vita acquatica, frequenta fiumi, torrenti, laghi, stagni, canali, lagune salmastre ed estuari.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>

Marzaiola				X	<i>Palustre</i> frequenta le zone umide aperte anche di piccole dimensioni, con acque dolci e bassi fondali, ed evita quelle troppo chiuse dalla vegetazione	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Merlo				X	<i>Incolto - Boschivo</i> il bosco, ma si adatta a vivere in numerosi ambienti e non raramente lo si trova nei frutteti e nei vigneti, in aree urbane a contatto ravvicinato con l'uomo..	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Mestolone				X	<i>Palustre</i> frequenta specchi d'acqua dolce e salmastra con fitta vegetazione e ricche di fango.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Migliarino di palude				X	<i>Palustre</i> paludi e acquitrini con canneti, carici, erbe alte, e alberi. durante la migrazione frequenta anche habitat più secchi.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Mignattino				X	<i>Palustre</i> zone paludose d'acqua dolce naturali o artificiali, laghi, fiumi a corso lento, risaie, lagune salmastre, saline, estuari e coste del mare.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Natrice dal collare				X	<i>Palustre</i> zone umide di ogni tipo corsi d'acqua ricchi di anfibi	classe Rettili: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Nibbio bruno		X			<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> vive in zone di pianura o collinari, in zone boschive mature miste di latifoglie, circondate da zone aperte terrestri o acquatiche, pascoli	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Nibbio reale		X			<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> aree collinari in cui sono presenti boschi con alberi sufficientemente grandi da potervi collocare il nido accanto ad ampie aree aperte, sia coltivate che non, in cui si alimenta; evita le zone con agricoltura intensiva.	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Nottola comune			X		<i>Boschivo - Incolto</i> zone boschive e di habitat forestali	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Oca selvatica			X		<i>Palustre- Incolto</i> nelle aree di riproduzione frequenta preferibilmente le zone umide con acqua dolce ricche di vegetazione palustre, mentre nei quartieri di svernamento è presente nei terreni palustri poco profondi anche di acque salmastre,	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.

					nei pascoli, nei campi coltivati e, ove è disturbata, in mare	
Occhiocotto				X	<i>Incolto - Boschivo</i> frequenta la macchia mediterranea, i boschi con fitto strato arbustivo, i cespugliati di steppa, i parchi e i giardini urbani	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Occhione			X		<i>Incolto – Agricolo</i> occupa ambienti aridi, prati, coltivi, pascoli, spesso in prossimità di zone umide. specie terricola,	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Passera europea				X	<i>Incolto – Agricolo-Antropico</i> zone agricole, zone urbane; comportamento migratorio. sedentaria; sito di nidificazione. edificio	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Passera mattugia				X	<i>Incolto – Agricolo- Antropico</i> predilige paesaggi agricoli ricchi di siepi, boschetti campestri e alberi. dove siano disponibili cavità adatte alla nidificazione, cova anche nei frutteti, negli edifici delle aziende agricole e nei parchi. la si trova anche lungo i bordi dei boschi, mentre evita agglomerati con poco verde.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Passera scopaiola				X	<i>Palustre – Incolto</i> occupa principalmente boschi con sottobosco, giovani piantagioni di conifere, torbiere boscate e arbusteti di ontano che dominano il limite della vegetazione arborea	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Passero solitario				X	<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta pendii aridi e assolati in zone rocciose dalle coste marine alle alte montagne, cave di pietra, ambienti urbani e manufatti	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Pavoncella			X		<i>Palustre – Incolto</i> è tipica di ambienti aperti; nidifica in prati, campi coltivati e incolti. durante la riproduzione è territoriale	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Pendolino				X	<i>Palustre</i> frequenta le zone umide di pianura con acqua dolce o salmastra, ricche di cespugli, alberi e canneti. di rado si insedia a quote superiori ai 200	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Pettirosso				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> i boschi di conifere sono il suo habitat naturale, ma è spesso presente anche in giardini, siepi, boschetti, boschi con sottobosco. nidifica nei buchi o nelle spaccature di alberi, ai piedi delle siepi, nell'edera o anche in vecchi oggetti lasciati dall'uomo.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.

Picchio rosso maggiore				X	<i>Boschivo</i> frequenta le zone collinari e di pianura con boschi sia fitti che radi, parchi, giardini, siepi alberate in aperta campagna e coltivazioni di pioppo	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Picchio verde				X	<i>Boschivo</i> vive in boschi, boschetti e luoghi alberati, con tutte le esposizioni, in zone umide e secche, appartate e frequentate. preferisce le zone alberate discontinue, alternate da zone coltivate.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Piccione selvatico		X			<i>Incolto – Agricolo</i> frequentano coste rocciose marine e ambienti circostanti, zone rocciose dell'interno. si nutrono principalmente di sostanze vegetali raccolte direttamente sul terreno o posandosi sugli alberi (o sugli arbusti	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Pipistrello albolimbato			X		<i>Incolto - Antropico</i> boschi e foreste di ogni tipo, agro ecosistemi con coltivi, boschetti e siepi, parchi e giardini, aree urbane comprese le grandi città	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Pipistrello di Savi			X		<i>Antropico - Boschivo</i> zone costiere, le aree rocciose, i boschi e le foreste di ogni tipo, nonché i più vari ambienti antropizzati, dalle zone agricole alle grandi città	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Piro piro boschereccio				X	<i>Palustre</i> zone agricole, laghi, zone umide, corsi d'acqua; comportamento migratorio. prevalentemente migratrice su lunga distanza	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Piro-piro culbianco				X	<i>Palustre</i> cave di argilla e zone umide con boschetti e canneti	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Piro-piro piccolo				X	<i>Palustre</i> in periodo riproduttivo frequenta le rive dei corsi d'acqua, specie a regime torrentizio, e quelle dei laghi, preferendo le sponde sassose o ciottolose anziché quelle sabbiose o fangose; nelle aree di svernamento s'insedia in un'ampia varietà di zone umide, sia dell'entroterra che costiere	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Pispola			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta ambienti erbosi aperti, umidi e freschi, privi di vegetazione arborea o comunque con pochi alberi e di modesta altezza	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Piviere dorato			X		<i>Palustre - Incolto</i> coltivi scarsamente alberati, lagune, barene e valli da pesca	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area

						di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Poiana		X			<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> zone boschive alternate a spazi aperti. anche ambienti umidi alberati	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Quaglia		X			<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta le campagne, vicino ai campi coltivati di fieno e cereali, nei terreni aperti con bassa vegetazione. generalmente solitaria si ritrova con gli altri per il periodo della migrazione	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Ramarro			X		<i>Incolto – Agricolo</i> margini di boschi, cespuglieti, siepi, radure erbose, prati, coltivi, alvei di fiumi, aree urbane, pinete litoranee, pietraie	classe Rettili: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Rana agile				X	boschi e boscaglie, anche xerofili, radure, campi e prati umidi	classe Anfibi: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Rana verde italiana				X	<i>Palustre</i> ambienti umidi, zone costiere. sottobosco di pinete e foreste di latifoglie, in prati e coltivi	classe Anfibi: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Ratto delle chiaviche			X		<i>Agricolo - Antropico</i> campagna, aree urbanizzate paludi, canali e fiumi, discariche, i porti, fognature, aree verdi, cantine	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Regolo				X	<i>Incolto –Boschivo</i> frequenta boschi misti e di conifere e, in inverno, nel sottobosco e nelle siepi..	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Riccio			X		<i>Incolto – Agricolo</i> boscaglie e le macchie, lo si trova frequentemente ai margini delle aree coltivate, nei giardini, nei parchi e nei frutteti	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Rigogolo			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta boschi di essenze a foglia caduca o misti, frutteti, pioppeti, boschi planiziali, parchi urbani e giardini	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Rinolofo maggiore			X		<i>Incolto - Antropico</i> zone calde e aperte con alberi e cespugli prossime ad acque ferme o correnti, anche in vicinanza di insediamenti umani	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la

						ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Rondine			X		<i>Incolto – Agricolo</i> zone agricole con bestiame e fienili. compiono lunghissime migrazioni sorvolando aree aperte ma anche tratti di mare e creste montuose	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Rondone			X		<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> vive in città e paesi soprattutto con centri storici ricchi di cavità, a volte anche su coste rocciose o altri dirupi naturali, mentre comunemente nella taiga e ormai solo localmente altrove nidifica nelle cavità scavate dai picchi negli alberi.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Rospo comune				X	<i>Palustre</i> aree boschive di conifere, latifoglie e boschi misti, soprattutto in luoghi umidi, tanto quanto campagne aperte	Classe Anfibi: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Rospo smeraldino				X	<i>Palustre</i> habitat umidi, orti, coltivi, giardini	classe Anfibi: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Saltimpalo				X	<i>Incolto – Agricolo</i> la sua residenza invernale è l'Europa meridionale e occidentale. in Europa centrale e orientale il saltimpalo è presente da marzo a novembre. vive su superfici aperte con vegetazione arbustiva, per esempio in brughiere, praterie alte, incolti, prati, campi coltivati.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Scricciolo				X	<i>Incolto –Boschivo</i> frequenta un'ampia varietà di ambienti: boschi e loro margini, zone fresche e ombrose con cespugli e alberi sparsi, macchia mediterranea	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Serotino comune			X		<i>Incolto – Antropico . Agricolo</i> aree boscate, parchi e giardini, agrosistemi con presenza di siepi.	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Smeriglio			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta ambienti aperti e semi-boscati, tundra, brughiere e zone umide	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Sparviero			X		<i>Incolto –Boschivo</i> boschi di qualsiasi tipo, anche governati a ceduo, e zone alberate in genere, a tutte le altitudini	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.


Starna			X		<i>frequenta pianure e colline caratterizzate da alternanza di colture arate, medicaie, prati, pascoli, frutteti, vigneti, incolti, fasce cespugliose</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Sterpazzola				X	<i>Incolto – Boschivo frequenta ambienti soleggiati ove si alternano spazi aperti con folta vegetazione erbacea e cespugli, dal livello del mare fino ad altitudini di circa 1.500 metri. nella stagione riproduttiva preferisce i margini dei boschi, le radure, i terreni incolti e le brughiere</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Stiaccino				X	<i>Incolto – Agricolo nidifica in praterie ampie, ricche di strutture e leggermente concimate. sui pascoli estensivi, nelle torbiere alte e nelle associazioni alpine di arbusti nani gli effettivi sono lievemente inferiori</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Sturno		X			<i>Incolto – Agricolo - Antropico frequenta campagne coltivate e incolti di pianura, di collina ed anche di montagna, parchi e giardini, boschi, villaggi e città. in italia è sedentario e nidificante, erratico, migratore e svernante regolare</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Strillozzo			X		<i>Incolto – Agricolo predilige aree aperte o molto aperte, purché vi sia qualche alto posatoio come punto di controllo e di canto e qualche sito in grado di offrire riparo, ed evita quindi foreste, zone umide – frequentate solo come dormitori – terreni rocciosi e accidentati, alte montagne e aree urbane</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Succiacapre			X		<i>Incolto – Agricolo le strutture dell'habitat del succiacapre sono molto varie, tuttavia sono sempre ambienti aperti, asciutti e dal clima temperato</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Taccola		X			<i>Incolto – Agricolo - Antropico frequenta ambienti rupestri, boschi non troppo fitti, campagne alberate. nei centri urbani si insedia in posizioni dominanti: torri, campanili</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Talpa romana		X			<i>Incolto – Agricolo campi coltivati, prati con terreni prevalentemente freschi, porosi dove può agevolmente scavare le sue gallerie</i>	<i>classe Mammiferi: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.</i>
Tarabusino				X	<i>Palustre zone umide d'acqua dolce, ferma o corrente; predilige canneti fitti come il suo</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area</i>

					parente di maggiori dimensioni	di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Tasso			X		<i>Incolto –Boschivo</i> zone boschive con fitto sottobosco, incolti	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Testuggine comune			X		<i>Incolto –Boschivo</i> macchia mediterranea, boschi di querce e di lecci	classe Rettili: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Testuggine d'acqua				X	<i>Palustre</i> stagni, laghi, risorgive, fiumi, canali e fossati, paludi, bacini di cave esaurite; in generale, zone umide con ricca vegetazione.	classe Rettili: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Topo campagnolo			X		<i>Incolto – Agricolo</i> ambienti boschivi e di macchia, sia costieri che di montagna, boschi, campi, giardini e pietraie	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Topo domestico		X			<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> ambienti urbani e suburbani e selvatico	classe Mammiferi: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Toporagno nano			X		<i>Incolto – Agricolo</i> aree boschive, zone erbose e nelle siepi, cespuglieti, praterie, zone umide e fresche	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Tordela			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta boschi puri o misti di conifere e latifoglie con radure e ampie aree erbose, dalle rive del mare alle alte montagne	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Tordo bottaccio			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta boschi di conifere miste o di latifoglie ricchi di sottobosco, pianure alberate e cespugliate, vigneti, oliveti, macchia mediterranea, parchi e giardini.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Tordo sassello			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta boschi, parchi e, al di fuori del periodo della riproduzione, pascoli, zone coltivate, terreni in prossimità di zone umide	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Tortora		X			<i>Incolto – Agricolo</i> Il suo habitat preferenziale è quello dei campi, nelle zone rurali, dove siano presenti grandi alberi su cui nidificare.	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per

						la ricerca trofica.
Tortora dal collare		X			<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> frequenta principalmente i parchi urbani e suburbani, nonché i margini delle terre coltivate ove siano presenti alberature	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Tritone italico				X	<i>Palustre</i> laghi, stagni, maceri, pozze, risorgive. fuori dall'acqua in ambienti del suolo, prati e boschi	classe Anfibi: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Tuffetto				X	<i>Palustre</i> frequenta le zone umide sia d'acqua dolce che debolmente salmastra anche di piccole dimensioni, purché sia presente un'abbondante vegetazione	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Upupa				X	<i>Incolto – Agricolo</i> ama i luoghi secchi, semi-alberati, caldi e assolati e per questo la si può incontrare in frutteti, prati e vigneti o lungo strade sterrate tipiche delle nostre campagne, dove può fare i bagni di polvere e trovare il suo cibo preferito	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Usignolo di fiume				X	<i>Palustre</i> frequenta la fitta vegetazione ripariale erbacea e arbustiva delle zone paludose, delle rive di fiumi, laghi e stagni, e delle torbiere.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Verdone			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta campagne alberate, frutteti, boschi, campi coltivati a graminacee, parchi e giardini urbani e suburbani. predilige le zone pianeggianti	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Verzellino				X	<i>Incolto – Agricolo</i> l'habitat di questi uccelli è rappresentato dalle aree di pianura e collina con presenza di aree boschive non eccessivamente fitte, sia decidue che sempreverdi	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Vipera comune				X	<i>Incolto – Boschivo</i> luoghi aridi e caldi arbusti, siepi, margini dei boschi.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Volpe			X		<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> zone boschive e le pinete costiere, coltivi, incolti centri abitati	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Zigolo nero				X	<i>Incolto – Agricolo - Boschivo</i> frequenta praterie, incolti erbosi e cespugliati, coltivi, frutteti, vigneti, boschi anche molto degradati in	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.

					<i>zone collinari e montane</i>	

Parco Eolico Fenice fase di Esercizio Impatti Diretti Fauna		
<i>Grado di impatto</i>	<i>Specie</i>	<i>Percentuale</i>
<i>Impatto alto</i>	0	0%
<i>Impatto medio</i>	22	14%
<i>Impatto basso</i>	65	43%
<i>Impatto nullo</i>	66	43%



Parco Eolico Fenice
stima degli impatti tra Fauna e opere di progetto
fase di ESERCIZIO

<i>Fauna</i>	<i>Stima degli impatti INDIRETTI</i>				<i>Habitat di predilezione</i>	<i>Note</i>
	<i>Alto</i>	<i>Medio</i>	<i>Basso</i>	<i>Nulla</i>		
Airone cenerino				X	<i>Palustre</i> frequenta prati umidi e torrenti anche nei pressi di centri urbani e abitati.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Airone guardabuoi				X	<i>Palustre - Incolto</i> frequenta zone umide poco estese, zone palustri, risaie e praterie dove si associa spesso al bestiame al pascolo. meno acquatico degli altri aironi	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Albanella minore			X		<i>Palustre – Incolto - Agricolo</i> brughiere, praterie, pascoli, steppe cerealicole a zone umide. generalmente alle basse quote. fino ai 1500 m in asia. anche nelle praterie d'altitudine durante le migrazioni.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Albanella reale			X		<i>Palustre – Incolto - Agricolo</i> brughiere, praterie, coltivi erbacei, pascoli e zone umide, generalmente al di sotto dei 500 m in Europa. localmente, quote più elevate in asia. anche in praterie d'altitudine durante le migrazioni	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Alborella				X	<i>Palustre</i> fiumi a corrente moderata, laghi di ogni estensione, canali di pianura.	Classe Pesci: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Allocco				X	<i>Boschivo</i> frequenta boschi di latifoglie e misti, alternati ad ampie radure che fungono da territori di caccia, zone agricole	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Allodola			X		<i>Incolto</i> frequenta campagne più o meno coltivate, steppe, prati, pascoli e dune sabbiose, sia in pianura che in quota	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da

						automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Alzavola				X	<i>Palustre</i> con bassi fondali: paludi, torbiere, risaie, acquitrini, stagni, lagune, saline, aree di mare frequenta zone umide anche di piccole dimensioni	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Arvicola terrestre				X	<i>Incolto - Agricolo</i> fossi, canali irrigui, fiumi, stagni delle pianure e dei fondovalle, rive dei laghi, specchi d'acqua dolce e salmastra	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici per la manutenzione in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica.
Assiolo				X	<i>Incolto – Agricolo – Antropico</i> ambienti aperti in genere, anche di tipo rurale o suburbano. fino ai 1500 m.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Averla capirossa				X	<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta campagne alberate con siepi, aree incolte ricche di cespugli e alberi sparsi, macchia mediterranea, oliveti, frutteti, vigneti,	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Averla cenerina				X	<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta margini di boschi, campi coltivati e strade campestri con vegetazione ad alberi sparsi e cespugli sia in pianura che sui rilievi a pendii dolci. nelle zone di svernamento è presente nelle savane e nelle secche boscaglie di acacie.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Averla piccola				X	<i>Incolto - Agricolo</i> ambienti aperti cespugliosi, campagne percorse da siepi, macchie rade, radure, lande incolte, ambienti ecotonali fra pascoli e bosco. dal fondovalle a quasi 2000 m s.l.m. nidifica fra i cespugli e piccoli alberi tra i 70 cm e i 2 metri.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Balestruccio				X	<i>Incolto - Agricolo</i> costruiscono il loro nido sotto grondaie, tettoie, entrate delle porte, raramente anche sotto rupi, ponti in cemento armato o affini	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Ballerina bianca				X	<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta un'ampia tipologia di habitat, preferendo le zone aperte, presso stagni, laghi, corsi d'acqua, rive marine. localmente può vivere su terreni secchi o addirittura semidesertici. si è pure adattata agli ambienti coltivati e a quelli urbani, dove trova	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.

					<i>abbondanza di cibo e di siti di nidificazione</i>	
Barbagianni			X		<i>Incolto – Agricolo – Antropico ambienti aperti di vario genere, comprese zone umide, rurali e suburbane, generalmente al di sotto dei 600 metri in europa; anche a quote più elevate altrove</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.</i>
Barbastello comune			X		<i>Incolto – Agricolo – Antropico - Palustre aree boscate collinari e di bassa e media montagna</i>	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici per la manutenzione in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne</i>
Beccaccia				X	<i>Boschivo si riproduce in foreste miste di latifoglie, talvolta anche in consociazione con conifere, purchè sia garantita la presenza di sottobosco, radure e suoli ricchi di lettiera.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Beccaccino				X	<i>Palustre si adatta dovunque, anche se predilige paludi, prati umidi, praterie e risaie.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Beccamoschino				X	<i>Palustre - Incolto aree con bassa vegetazione erbosa, spesso vicino all'acqua, paludi, ma anche campi asciutti</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Biacco			X		<i>Incolto - Agricolo macchie, margini di boschi, radure, zone rocciose, muri a secco e pietraie; anche siepi, coltivi e aree antropizzate</i>	<i>classe Rettili: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Biscia tassellata				X	<i>habitat acquatici, da cui di solito non si allontana, fiumi, canali, torrenti e ruscelli.</i>	<i>classe Rettili: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Calandra			X		<i>Incolto - Agricolo frequenta zone aperte a clima secco, incolte o parzialmente coltivate, pianeggianti o collinari, con vegetazione bassa e assenza di alberi e cespugli</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.</i>
Calandrella			X		<i>Incolto - Agricolo frequenta ambienti aridi aperti con scarsa vegetazione erbacea, greti ciottolosi e sabbiosi di corsi d'acqua, incolti, steppe cerealicole.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.</i>
Cannaiola				X	<i>Palustre specie strettamente legata agli ambienti umidi e paludosi</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di</i>

						progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Capinera				X	<i>Incolto –Boschivo</i> vive nell'intrico delle siepi più fitte, nei cespugli e tra i rami degli alberi da frutta, ma non disdegna il sottobosco	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Cappellaccia				X	<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta gli ambienti steppici: terreni incolti, aridi, pietrosi, zone semidesertiche, lande coltivate preferibilmente a foraggiare, campi arati	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Cardellino				X	<i>Incolto - Agricolo</i> da prati fioriti, praterie con erba alta, boschi aperti, piantagioni, frutteti, parchi e giardini	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Carpa				X	laghi grandi e piccoli e nei tratti medi ed inferiori dei fiumi	Classe Pesci: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Cavedano				X	acque dolci correnti, limpide e calme. nei laghi si distribuisce lungo le acque litorali, nei fiumi fino agli estuari	Classe Pesci: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Cervone				X	<i>Incolto – Agricolo</i> macchia mediterranea, il limitare di boschi, i boschi radi e soleggiati o in genere i luoghi con vegetazione sparsa, le sassaie, i muretti a secco e gli edifici abbandonati	classe Rettili: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo..
Cesena				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> frequenta boschi, parchi, frutteti in prossimità di praterie e pianure coltivate.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Cicogna bianca				X	<i>Palustre</i> ambienti aperti come paludi o pianure erbose, dove può trovare facilmente cibo; per nidificare sceglie punti molto alti e scoperti, come la cima di edifici o di tralicci elettrici	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Cinciallegra				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> boschi di conifere, frutteti, campi, siepi, giardini e parchi urbani.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Cinciarella				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> abita nei boschi misti di bassa collina o pianeggianti, nei frutteti, nei giardini e nei parchi. e' rara nelle foreste di conifere	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Cinghiale				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> boschi folti	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di

					<i>a prevalenza di latifoglie con sottobosco, alternati a terreni pantanosi, pascoli o terreni coltivati</i>	<i>progetto. Habitat di predilezione presente in Avi. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica.</i>
Civetta			X		Incolto – Agricolo – Antropico zone aperte, pianeggianti, collinari, montane, boschive e alberate, coltivate e incolte, secche e umide, appartate e frequentate. predilige gli ambienti urbanizzati, soprattutto quelli rurali	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Codibugnolo				X	Palustre frequenta i boschi di latifoglie con folto sottobosco, campagne con filari, frutteti e vigneti, parchi e giardini urbani	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Codirosso			X		Incolto - Agricolo predilige boschi non troppo chiusi di larici e cembri, o boschi ai margini di torrenti. si concentra principalmente a quote medio-basse, ma arriva a raggiungere anche i 2000 metri di altitudine sulle alpi, mantenendosi generalmente nelle vicinanze di centri abitati.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Codirosso spazzacamino			X		Incolto – Agricolo zone montane, nelle quali il codirosso spazzacamino va alla ricerca di terreni sassosi o pareti rocciose fino al limite delle nevi perenni. durante la stagione fredda, la specie abbandona queste zone per scendere a quote inferiori	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Colombaccio			X		Incolto – Agricolo- Boschivo si è ben adattato alle città, tanto da essere un assiduo frequentatore dei parchi, anche se è molto più timido del piccione; il suo habitat principale, tuttavia, rimane la campagna, dove è molto presente.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Cornacchia grigia			X		Incolto – Agricolo campagne coltivate purché disseminate di alberi, siepi e boschetti, pascoli, brughiere, boschi, rive di fiumi e laghi, coste marine, aree urbane e suburbane	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Corriere piccolo				X	Palustre frequenta laghi, fiumi, ghiaietti allagati; durante l'inverno si può ritrovare lungo le coste marine.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Cuculo			X		Incolto - Agricolo frequenta le foreste con radure, campagne alberate, grandi parchi cittadini, pascoli d'alta quota fino a 2.000 m di	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da

					altitudine sulle alpi.	automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Cutrettola			X		<i>Palustre - Incolto</i> predilige soprattutto i campi umidi, ma si può riprodurre anche in zone asciutte, come nei campi di cereali	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Donnola			X		<i>Incolto - Agricolo</i> terreni coltivati, boschi, zone cespugliate, sassaie e presso abitazioni abbandonate	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici per la manutenzione in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica.
Fagiano			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> frequenta una grande varietà di ambienti, come i margini dei boschi, i parchi, i terreni coltivati, i canneti e le zone cespugliose, dal livello del mare fino a quote di 1500 metri circa.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Faina			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> boschi, margini di boschi, zone rocciose, spesso anche vicino ad abitazioni	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici per la manutenzione in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica.
Falco cuculo			X		<i>Palustre - Incolto - Agricolo</i> frequenta gli ambienti aperti con esclusione di quelli desertici o troppo aridi: steppe alberate, terreni coltivati alternati a boschi, foreste	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Falco di palude			X		<i>Palustre - Incolto - Agricolo</i> zone umide interne e di litorale, con sufficienti estensioni di canneti. anche foraggiere e steppe cerealicole, soprattutto se adiacenti ad ambienti allagati	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Falco pecchiaiolo			X		<i>Incolto – Boschivo</i> frequenta gli ambienti boscosi d'ogni tipo, possibilmente con spazi aperti sia in pianura che in montagna	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Falco pellegrino			X		<i>Palustre - Incolto - Agricolo</i> predilige gli habitat aperti, come praterie, tundra e campi. sono più diffusi nella tundra e nelle aree costiere	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Folaga				X	<i>Palustre</i> stagni calmi, terreni umidi e acque che scorrono lentamente, con molte piante acquatiche e canne palustri.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di

						progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Fringuello			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> frequenta boschi, siepi, giardini, aree aperte con alberi sparsi	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Gabbiano comune			X		<i>Palustre - Agricolo</i> frequenta le zone umide sia d'acqua dolce che salata, naturali o artificiali, costiere o dell'entroterra; è pure presente nei laghetti e lungo i fiumi all'interno delle città.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Gabbiano reale			X		<i>Palustre - Agricolo</i> frequenta le coste e il mare aperto, le zone umide costiere, le aree portuali e le città costiere; di rado si inoltra nell'entroterra. abitualmente si porta nelle discariche di rifiuti urbani	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Gallinella d'acqua				X	<i>Palustre</i> frequenta zone umide con fitta vegetazione, fiumi a corso lento, risaie e praterie in prossimità dell'acqua	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Garzetta				X	<i>Palustre</i> ambienti acquitrinosi, sponde di fiumi, laghi e stagni	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gazza			X		<i>Incolto - Agricolo</i> prati, cespuglietti, margini dei boschi, frutteti, campi coltivati e in generale da spazi aperti.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Geco comune				X	<i>Agricolo- Antropico</i> muri a secco, nelle vecchie abitazioni e nelle rovine, nelle legnaie e sui tetti	classe Rettili: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Germano reale				X	<i>Palustre</i> zone umide d'acqua dolce quali laghi, fiumi, risorgive, stagni e paludi, e si adatta bene anche in habitat intensamente coltivati	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gheppio			X		<i>Incolto - Agricolo</i> campi aperti ed erbosi e terreni agricoli, che forniscono loro sufficienti spazi aperti	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Ghiandaia				X	<i>Incolto — Boschivo</i> foreste cedue e miste, con predilezione per le aree boschive a prevalenza	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area

					di querce e carpini	di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Ghiandaia marina			X		<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta praterie steppose, zone incolte, coltivi con alberi sparsi, boschi di querce e pinete con radure sia di pianura che di bassa collina.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Grillaio			X		<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta ambienti aperti con scarsa copertura arborea ed arbustiva: prati, pascoli, praterie, zone stepposo-cerealicole, ambienti rocciosi	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Gru				X	<i>Palustre</i> frequenta torbiere alberate, zone aperte erbose e paludi. nelle zone di svernamento è presente in lagune, steppe, pascoli, aree coltivate e lungo il corso di grandi fiumi e laghi	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gruccione			X		<i>Palustre - Incolto</i> campagne aperte con vegetazione arborea e arbustiva poco densa e discontinua.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Gufo comune			X		<i>Incolto – Agricolo- Antropico</i> ambienti aperti con alberi sparsi, in filari o in macchie. anche zone boschive alternate a zone aperte	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Lepre comune			X		<i>Incolto - Agricolo</i> campi coltivati, incolti, boschi	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici per la manutenzione in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica.
Lodolaio			X		<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta colline, pianure, boschi, in prossimità di zone umide. caccia prevalentemente in volo, di mattina presto o di sera tardi.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Lucarino				X	<i>Incolto - Boschivo</i> boschi di conifere, prediligendo soprattutto gli alberi di larici e abeti rossi, nonché ontano e betulla	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Lucertola campestre			X		<i>Incolto – Agricolo</i> margini di boschi, boschaglie, radure e prati, coltivi, aree urbane, pietraie, cataste di legna, pinete litoranee, litorali sabbiosi, dune con vegetazione scarsa, alvei di	classe Rettili: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo..

					<i>torrenti e fiumi, sponde di laghi e stagni</i>	
Lui piccolo				X	<i>Incolto - Boschivo</i> frequenta un'ampia varietà di habitat con alberi e arbusti, quali parchi e boschi misti o decidui	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Lupo			X		<i>Incolto – Boschivo - Agricolo</i> zone montane densamente boscate, relativamente ricche di siti rifugio e di prede e con scarsa presenza antropica	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici per la manutenzione in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica.
Marangone				X	<i>Palustre</i> frequenta le zone umide d'acqua dolce o debolmente salmastra, caratterizzate da abbondante vegetazione palustre emergente.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Martin pescatore				X	<i>Palustre</i> strettamente legato alla vita acquatica, frequenta fiumi, torrenti, laghi, stagni, canali, lagune salmastre ed estuari.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Marzaiola				X	<i>Palustre</i> frequenta le zone umide aperte anche di piccole dimensioni, con acque dolci e bassi fondali, ed evita quelle troppo chiuse dalla vegetazione	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Merlo			X		<i>Incolto - Boschivo</i> il bosco, ma si adatta a vivere in numerosi ambienti e non raramente lo si trova nei frutteti e nei vigneti, in aree urbane a contatto ravvicinato con l'uomo..	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Mestolone				X	<i>Palustre</i> frequenta specchi d'acqua dolce e salmastra con fitta vegetazione e ricche di fango.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Migliarino di palude				X	<i>Palustre</i> paludi e acquitrini con canneti, carici, erbe alte, e alberi. durante la migrazione frequenta anche habitat più secchi.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Mignattino				X	<i>Palustre</i> zone paludose d'acqua dolce naturali o artificiali, laghi, fiumi a corso lento, risaie, lagune salmastre, saline, estuari e coste del mare.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Natrice dal collare				X	<i>Palustre</i> zone umide di ogni tipo corsi d'acqua ricchi di anfibi	classe Rettili: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Nibbio bruno			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> vive in zone di pianura o collinari, in zone boschive mature	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di

					<i>miste di latifoglie, circondate da zone aperte terrestri o acquatiche, pascoli</i>	<i>interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.</i>
Nibbio reale			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> aree collinari in cui sono presenti boschi con alberi sufficientemente grandi da potervi collocare il nido accanto ad ampie aree aperte, sia coltivate che non, in cui si alimenta; evita le zone con agricoltura intensiva.	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.</i>
Nottola comune			X		<i>Boschivo - Incolto</i> zone boschive e di habitat forestali	<i>classe Mammiferi: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici per la manutenzione in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne</i>
Oca selvatica				X	<i>Palustre- Incolto</i> nelle aree di riproduzione frequenta preferibilmente le zone umide con acqua dolce ricche di vegetazione palustre, mentre nei quartieri di svernamento è presente nei terreni palustri poco profondi anche di acque salmastre, nei pascoli, nei campi coltivati e, ove è disturbata, in mare	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Occhiocotto				X	<i>Incolto - Boschivo</i> frequenta la macchia mediterranea, i boschi con fitto strato arbustivo, i cespugliati di steppa, i parchi e i giardini urbani	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Occhione			X		<i>Incolto – Agricolo</i> occupa ambienti aridi, prati, coltivi, pascoli, spesso in prossimità di zone umide. specie terricola,	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.</i>
Passera europea			X		<i>Incolto – Agricolo-Antropico</i> zone agricole, zone urbane; comportamento migratorio. sedentaria; sito di nidificazione. edificio	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.</i>
Passera mattugia			X		<i>Incolto – Agricolo- Antropico</i> predilige paesaggi agricoli ricchi di siepi, boschetti campestri e alberi. dove siano disponibili cavità adatte alla nidificazione, cova anche nei frutteti, negli edifici delle aziende agricole e nei parchi. la si trova anche lungo i bordi dei boschi, mentre evita agglomerati con poco verde.	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.</i>
Passera scopaiola				X	<i>Palustre – Incolto</i> occupa principalmente boschi con sottobosco, giovani piantagioni di	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area</i>

					conifere, torbiere boscate e arbusteti di ontano che dominano il limite della vegetazione arborea	di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Passero solitario			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta pendii aridi e assolati in zone rocciose dalle coste marine alle alte montagne, cave di pietra, ambienti urbani e manufatti	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Pavoncella			X		<i>Palustre – Incolto</i> è tipica di ambienti aperti; nidifica in prati, campi coltivati e incolti. durante la riproduzione è territoriale	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Pendolino				X	<i>Palustre</i> frequenta le zone umide di pianura con acqua dolce o salmastra, ricche di cespugli, alberi e canneti. di rado si insedia a quote superiori ai 200	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Pettirosso			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> i boschi di conifere sono il suo habitat naturale, ma è spesso presente anche in giardini, siepi, boschetti, boschi con sottobosco. nidifica nei buchi o nelle spaccature di alberi, ai piedi delle siepi, nell'edera o anche in vecchi oggetti lasciati dall'uomo.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Picchio rosso maggiore				X	<i>Boschivo</i> frequenta le zone collinari e di pianura con boschi sia fitti che radi, parchi, giardini, siepi alberate in aperta campagna e coltivazioni di pioppo	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Picchio verde				X	<i>Boschivo</i> vive in boschi, boschetti e luoghi alberati, con tutte le esposizioni, in zone umide e secche, appartate e frequentate. preferisce le zone alberate discontinue, alternate da zone coltivate.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Piccione selvatico			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequentano coste rocciose marine e ambienti circostanti, zone rocciose dell'interno. si nutrono principalmente di sostanze vegetali raccolte direttamente sul terreno o posandosi sugli alberi (o sugli arbusti	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Pipistrello albolimbato			X		<i>Incolto - Antropico</i> boschi e foreste di ogni tipo, agro ecosistemi con coltivi, boschetti e siepi, parchi e giardini, aree urbane comprese le grandi città	classe Mammiferi: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici per la manutenzione in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Pipistrello di Savi			X		<i>Antropico - Boschivo</i> zone costiere, le aree rocciose, i boschi e le foreste di ogni tipo, nonché i più vari ambienti antropizzati, dalle zone agricole	classe Mammiferi: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi

					alle grandi città	meccanici per la manutenzione in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Piro piro boschereccio				X	<i>Palustre</i> zone agricole, laghi, zone umide, corsi d'acqua; comportamento migratorio. prevalentemente migratrice su lunga distanza	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Piro-piro culbiano				X	<i>Palustre</i> cave di argilla e zone umide con boschetti e canneti	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Piro-piro piccolo				X	<i>Palustre</i> in periodo riproduttivo frequenta le rive dei corsi d'acqua, specie a regime torrentizio, e quelle dei laghi, preferendo le sponde sassose o ciottolose anziché quelle sabbiose o fangose; nelle aree di svernamento s'insedia in un'ampia varietà di zone umide, sia dell'entroterra che costiere	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Pispola				X	<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta ambienti erbosi aperti, umidi e freschi, privi di vegetazione arborea o comunque con pochi alberi e di modesta altezza	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Piviere dorato				X	<i>Palustre - Incolto</i> coltivi scarsamente alberati, lagune, barene e valli da pesca	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Poiana				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> zone boschive alternate a spazi aperti. anche ambienti umidi alberati	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Quaglia				X	<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta le campagne, vicino ai campi coltivati di fieno e cereali, nei terreni aperti con bassa vegetazione. generalmente solitaria si ritrova con gli altri per il periodo della migrazione	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Ramarro				X	<i>Incolto – Agricolo</i> margini di boschi, cespuglieti, siepi, radure erbose, prati, coltivi, alvei di fiumi, aree urbane, pinete litoranee, pietraie	classe Rettili: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Rana agile				X	boschi e boscaglie, anche xerofili, radure, campi e prati umidi	classe Anfibi: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.

Rana verde italiana				X	<i>Palustre</i> ambienti umidi, zone costiere. sottobosco di pinete e foreste di latifoglie, in prati e coltivi	classe Anfibi: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Ratto delle chiaviche				X	<i>Agricolo - Antropico</i> campagna, aree urbanizzate paludi, canali e fiumi, discariche, i porti, fognature, aree verdi, cantine	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Regolo				X	<i>Incolto –Boschivo</i> frequenta boschi misti e di conifere e, in inverno, nel sottobosco e nelle siepi..	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Riccio				X	<i>Incolto – Agricolo</i> boscaglie e le macchie, lo si trova frequentemente ai margini delle aree coltivate, nei giardini, nei parchi e nei frutteti	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici per la manutenzione in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica.
Rigogolo				X	<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta boschi di essenze a foglia caduca o misti, frutteti, pioppeti, boschi planiziali, parchi urbani e giardini	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Rinolofo maggiore				X	<i>Incolto - Antropico</i> zone calde e aperte con alberi e cespugli prossime ad acque ferme o correnti, anche in vicinanza di insediamenti umani	classe Mammiferi: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici per la manutenzione in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Rondine				X	<i>Incolto – Agricolo</i> zone agricole con bestiame e fienili. compiono lunghissime migrazioni sorvolando aree aperte ma anche tratti di mare e creste montuose	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Rondone				X	<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> vive in città e paesi soprattutto con centri storici ricchi di cavità, a volte anche su coste rocciose o altri dirupi naturali, mentre comunemente nella taiga e ormai solo localmente altrove nidifica nelle cavità scavate dai picchi negli alberi.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Rospo comune				X	<i>Palustre</i> aree boschive di conifere, latifoglie e boschi misti, soprattutto in luoghi umidi, tanto quanto campagne aperte	Classe Anfibi: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Rospo smeraldino				X	<i>Palustre</i> habitat umidi, orti, coltivi, giardini	classe Anfibi: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di


						progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Saltimpalo			X		<i>Incolto – Agricolo</i> la sua residenza invernale è l'europa meridionale e occidentale. in europa centrale e orientale il saltimpalo è presente da marzo a novembre. vive su superfici aperte con vegetazione arbustiva, per esempio in brughiere, praterie alte, incolti, prati, campi coltivati.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Scricciolo				X	<i>Incolto –Boschivo</i> frequenta un'ampia varietà di ambienti: boschi e loro margini, zone fresche e ombrose con cespugli e alberi sparsi, macchia mediterranea	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Serotino comune			X		<i>Incolto – Antropico . Agricolo</i> aree boscate , parchi e giardini, agrosistemi con presenza di siepi.	classe Mammiferi: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici per la manutenzione in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Smeriglio			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta ambienti aperti e semi-boscati, tundra, brughiere e zone umide	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Sparviero			X		<i>Incolto –Boschivo</i> boschi di qualsiasi tipo, anche governati a ceduo, e zone alberate in genere, a tutte le altitudini	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Starna			X		frequenta pianure e colline caratterizzate da alternanza di colture arate, medicaie, prati, pascoli, frutteti, vigneti, incolti, fasce cespugliose	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Sterpazzola				X	<i>Incolto – Boschivo</i> frequenta ambienti soleggiati ove si alternano spazi aperti con folta vegetazione erbacea e cespugli, dal livello del mare fino ad altitudini di circa 1.500 metri. nella stagione riproduttiva preferisce i margini dei boschi, le radure, i terreni incolti e le brughiere	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Stiaccino			X		<i>Incolto – Agricolo</i> nidifica in praterie ampie, ricche di strutture e leggermente concimate. sui pascoli estensivi, nelle torbiere alte e nelle associazioni alpine di arbusti nani gli effettivi sono lievemente inferiori	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.

Storno			X		<i>Incolto – Agricolo – Antropico</i> frequenta campagne coltivate e incolti di pianura, di collina ed anche di montagna, parchi e giardini, boschi, villaggi e città. in Italia è sedentario e nidificante, erratico, migratore e svernante regolare	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Strillozzo			X		<i>Incolto – Agricolo</i> predilige aree aperte o molto aperte, purché vi sia qualche alto posatoio come punto di controllo e di canto e qualche sito in grado di offrire riparo, ed evita quindi foreste, zone umide – frequentate solo come dormitori – terreni rocciosi e accidentati, alte montagne e aree urbane	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Succiacapre			X		<i>Incolto – Agricolo</i> le strutture dell'habitat del succiacapre sono molto varie, tuttavia sono sempre ambienti aperti, asciutti e dal clima temperato	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Taccola			X		<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> frequenta ambienti rupestri, boschi non troppo fitti, campagne alberate. nei centri urbani si insedia in posizioni dominanti: torri, campanili	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Talpa romana		X			<i>Incolto – Agricolo</i> campi coltivati, prati con terreni prevalentemente freschi, porosi dove può agevolmente scavare le sue gallerie	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici per la manutenzione in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica.
Tarabusino				X	<i>Palustre</i> zone umide d'acqua dolce, ferma o corrente; predilige canneti fitti come il suo parente di maggiori dimensioni	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Tasso			X		<i>Incolto –Boschivo</i> zone boschive con fitto sottobosco, incolti	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici per la manutenzione in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica.
Testuggine comune			X		<i>Incolto –Boschivo</i> macchia mediterranea, boschi di querce e di lecci	classe Rettili: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Testuggine d'acqua				X	<i>Palustre</i> stagni, laghi, risorgive, fiumi, canali e fossati, paludi, bacini di cave esaurite; in	classe Rettili: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area

					generale, zone umide con ricca vegetazione.	di impianto.
Topo campagnolo			X		<i>Incolto – Agricolo</i> ambienti boschivi e di macchia, sia costieri che di montagna, boschi, campi, giardini e pietraie	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici per la manutenzione in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica.
Topo domestico			X		<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> ambienti urbani e suburbani e selvatico	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici per la manutenzione in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica.
Toporagno nano			X		<i>Incolto – Agricolo</i> aree boschive, zone erbose e nelle siepi, cespuglieti, praterie, zone umide e fresche	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici per la manutenzione in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica.
Tordela			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta boschi puri o misti di conifere e latifoglie con radure e ampie aree erbose, dalle rive del mare alle alte montagne	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Tordo bottaccio			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta boschi di conifere miste o di latifoglie ricchi di sottobosco, pianure alberate e cespugliate, vigneti, oliveti, macchia mediterranea, parchi e giardini.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Tordo sassello			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta boschi, parchi e, al di fuori del periodo della riproduzione, pascoli, zone coltivate, terreni in prossimità di zone umide	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Tortora			X		<i>Incolto – Agricolo</i> Il suo habitat preferenziale è quello dei campi, nelle zone rurali, dove siano presenti grandi alberi su cui nidificare.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Tortora dal collare			X		<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> frequenta principalmente i parchi urbani e suburbani, nonché i margini delle terre coltivate ove siano presenti alberature	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Tritone italico				X	<i>Palustre</i> laghi, stagni, maceri, pozze, risorgive, fuori dall'acqua in ambienti del suolo, prati e boschi	classe Anfibi: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.

Tuffetto				X	<i>Palustre</i> frequenta le zone umide sia d'acqua dolce che debolmente salmastra anche di piccole dimensioni, purché sia presente un'abbondante vegetazione	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Upupa				X	<i>Incolto – Agricolo</i> ama i luoghi secchi, semi-alberati, caldi e assolati e per questo la si può incontrare in frutteti, prati e vigneti o lungo strade sterrate tipiche delle nostre campagne, dove può fare i bagni di polvere e trovare il suo cibo preferito	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Usignolo di fiume				X	<i>Palustre</i> frequenta la fitta vegetazione ripariale erbacea e arbustiva delle zone paludose, delle rive di fiumi, laghi e stagni, e delle torbiere.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Verdone				X	<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta campagne alberate, frutteti, boschi, campi coltivati a graminacee, parchi e giardini urbani e suburbani. predilige le zone pianeggianti	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Verzellino				X	<i>Incolto – Agricolo</i> l'habitat di questi uccelli è rappresentato dalle aree di pianura e collina con presenza di aree boschive non eccessivamente fitte, sia decidue che sempreverdi	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.
Vipera comune				X	<i>Incolti – Boschivo</i> luoghi aridi e caldi arbusti, siepi, margini dei boschi.	classe rettili: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Volpe				X	<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> zone boschive e le pinete costiere, coltivi, incolti centri abitati	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici per la manutenzione in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica.
Zigolo nero				X	<i>Incolto – Agricolo - Boschivo</i> frequenta praterie, incolti erbosi e cespugliati, coltivi, frutteti, vigneti, boschi anche molto degradati in zone collinari e montane	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo causate da automezzi in area di impianto per la manutenzione.

Parco Eolico Fenice fase di Esercizio Impatti Indiretti Fauna		
Grado di impatto	Specie	Percentuale
Impatto alto	0	0%
Impatto medio	1	1%
Impatto basso	96	63%
Impatto nullo	56	36%



Nb: nella fase di esercizio non sono stati valutati gli impatti indiretti generati dalla circolazione di mezzi utilizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di progetto, considerando anche che l'area risulta essere altamente frequentata da mezzi meccanici agricoli e civili

Parco Eolico Fenice
stima degli impatti tra Fauna e opere di progetto
fase di DISMISSIONE

<i>Fauna</i>	<i>Stima degli impatti DIRETTI</i>				<i>Habitat di predilezione</i>	<i>Note</i>
	<i>Alto</i>	<i>Medio</i>	<i>Basso</i>	<i>Nulla</i>		
Airone cenerino				X	<i>Palustre</i> frequenta prati umidi e torrenti anche nei pressi di centri urbani e abitati.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Airone guardabuoi				X	<i>Palustre - Incolto</i> frequenta zone umide poco estese, zone palustri, risaie e praterie dove si associa spesso al bestiame al pascolo. meno acquatico degli altri aironi	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Albanella minore			X		<i>Palustre – Incolto - Agricolo</i> brughiere, praterie, pascoli, steppe cerealicole a zone umide. generalmente alle basse quote. fino ai 1500 m in asia. anche nelle praterie d'altitudine durante le migrazioni.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Albanella reale			X		<i>Palustre – Incolto - Agricolo</i> brughiere, praterie, coltivi erbacei, pascoli e zone umide, generalmente al di sotto dei 500 m in Europa. localmente, quote più elevate in asia. anche in praterie d'altitudine durante le migrazioni	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ed in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Alborella				X	<i>Palustre</i> fiumi a corrente moderata, laghi di ogni estensione, canali di pianura.	Classe Pesci: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Allocco				X	<i>Boschivo</i> frequenta boschi di latifoglie e misti, alternati ad ampie radure che fungono da territori di caccia, zone agricole	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Allodola		X			<i>Incolto</i> frequenta campagne più o meno coltivate, steppe, prati, pascoli e dune sabbiose, sia in pianura che in quota.	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per

						la ricerca trofica. Sottrazione di habitat.
Alzavola				X	<i>Palustre con bassi fondali: paludi, torbiere, risaie, acquitrini, stagni, lagune, saline, aree di mare frequenta zone umide anche di piccole dimensioni</i>	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Arvicola terrestre		X			<i>Incolto - Agricolo fossi, canali irrigui, fiumi, stagni delle pianure e dei fondovalle, rive dei laghi, specchi d'acqua dolce e salmastra</i>	classe Mammiferi: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Assiolo			X		<i>Incolto – Agricolo – Antropico ambienti aperti in genere, anche di tipo rurale o suburbano. fino ai 1500 m.</i>	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Averla capirossa			X		<i>Incolto - Agricolo frequenta campagne alberate con siepi, aree incolte ricche di cespugli e alberi sparsi, macchia mediterranea, oliveti, frutteti, vigneti,</i>	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Averla cenerina			X		<i>Incolto - Agricolo frequenta margini di boschi, campi coltivati e strade campestri con vegetazione ad alberi sparsi e cespugli sia in pianura che sui rilievi a pendii dolci. nelle zone di svernamento è presente nelle savane e nelle secche boscaglie di acacie.</i>	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Averla piccola			X		<i>Incolto - Agricolo ambienti aperti cespugliosi, campagne percorse da siepi, macchie rade, radure, lande incolte, ambienti ecotonali fra pascoli e bosco. dal fondovalle a quasi 2000 m s.l.m. nidifica fra i cespugli e piccoli alberi tra i 70 cm e i 2 metri.</i>	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Balestruccio			X		<i>Incolto - Agricolo costruiscono il loro nido sotto grondaie, tettoie, entrate delle porte, raramente anche sotto rupi, ponti in cemento armato o affini</i>	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Ballerina bianca			X		<i>Incolto – Agricolo frequenta un'ampia tipologia di habitat, preferendo le zone aperte, presso stagni, laghi, corsi d'acqua, rive marine. localmente può vivere su terreni secchi o addirittura semidesertici. si è pure adattata agli ambienti coltivati e a quelli urbani, dove trova abbondanza di cibo e di siti di nidificazione</i>	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Barbagianni			X		<i>Incolto – Agricolo – Antropico ambienti</i>	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di

					<i>aperti di vario genere, comprese zone umide, rurali e suburbane. generalmente al di sotto dei 600 metri in Europa; anche a quote più elevate altrove</i>	<i>progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Barbastello comune			X		<i>Incolto – Agricolo – Antropico - Palustre aree boscate collinari e di bassa e media montagna</i>	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne</i>
Beccaccia				X	<i>Boschivo si riproduce in foreste miste di latifoglie, talvolta anche in consociazione con conifere, purchè sia garantita la presenza di sottobosco, radure e suoli ricchi di lettiera.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Beccaccino				X	<i>Palustre si adatta dovunque, anche se predilige paludi, prati umidi, praterie e risaie.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Beccamoschino				X	<i>Palustre - Incolto aree con bassa vegetazione erbosa, spesso vicino all'acqua, paludi, ma anche campi asciutti</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Biacco			X		<i>Incolto - Agricolo macchie, margini di boschi, radure, zone rocciose, muri a secco e pietraie; anche siepi, coltivi e aree antropizzate</i>	<i>classe Rettili: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.</i>
Biscia tassellata				X	<i>habitat acquatici, da cui di solito non si allontana, fiumi, canali, torrenti e ruscelli.</i>	<i>classe Rettili: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Calandra			X		<i>Incolto - Agricolo frequenta zone aperte a clima secco, incolte o parzialmente coltivate, pianeggianti o collinari, con vegetazione bassa e assenza di alberi e cespugli</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Calandrella			X		<i>Incolto - Agricolo frequenta ambienti aridi aperti con scarsa vegetazione erbacea, greti ciottolosi e sabbiosi di corsi d'acqua, incolti, steppe cerealicole.</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Cannaiola				X	<i>Palustre specie strettamente legata agli ambienti umidi e paludosi</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Capinera				X	<i>Incolto –Boschivo vive nell'intrico delle siepi più fitte, nei cespugli e tra i rami degli alberi da frutta, ma non disdegna il sottobosco</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>

Cappellaccia		X			<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta gli ambienti steppici: terreni incolti, aridi, pietrosi, zone semidesertiche, lande coltivate preferibilmente a foraggiare, campi arati	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Cardellino			X		<i>Incolto - Agricolo</i> da prati fioriti, praterie con erba alta, boschi aperti, piantagioni, frutteti, parchi e giardini	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Carpa				X	laghi grandi e piccoli e nei tratti medi ed inferiori dei fiumi	Classe Pesci: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Cavedano				X	acque dolci correnti, limpide e calme. nei laghi si distribuisce lungo le acque litorali, nei fiumi fino agli estuari	Classe Pesci: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Cervone		X			<i>Incolto – Agricolo</i> macchia mediterranea, il limitare di boschi, i boschi radi e soleggiati o in genere i luoghi con vegetazione sparsa, le sassate, i muretti a secco e gli edifici abbandonati	classe Rettili: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Cesena			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> frequenta boschi, parchi, frutteti in prossimità di praterie e pianure coltivate.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Cicogna bianca				X	<i>Palustre</i> ambienti aperti come paludi o pianure erbose, dove può trovare facilmente cibo; per nidificare sceglie punti molto alti e scoperti, come la cima di edifici o di tralicci elettrici	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Cinciallegra				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> boschi di conifere, frutteti, campi, siepi, giardini e parchi urbani.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Cinciarella				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> abita nei boschi misti di bassa collina o pianeggianti, nei frutteti, nei giardini e nei parchi. e' rara nelle foreste di conifere	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Cinghiale				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> boschi folti a prevalenza di latifoglie con sottobosco, alternati a terreni pantanosi, pascoli o terreni coltivati	classe Mammiferi: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi fuori area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica.
Civetta			X		<i>Incolto – Agricolo – Antropico</i> zone aperte, pianeggianti, collinari, montane, boscose e alberate, coltivate e incolte, secche e umide,	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto,

					<i>appartate e frequentate. predilige gli ambienti urbanizzati, soprattutto quelli rurali</i>	<i>durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Codibugnolo				X	<i>Palustre frequenta i boschi di latifoglie con folto sottobosco, campagne con filari, frutteti e vigneti, parchi e giardini urbani</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Codiroso				X	<i>Incolto - Agricolo predilige boschi non troppo chiusi di larici e cembri, o boschi ai margini di torrenti. si concentra principalmente a quote medio-basse, ma arriva a raggiungere anche i 2000 metri di altitudine sulle alpi, mantenendosi generalmente nelle vicinanze di centri abitati.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Codiroso spazzacamino				X	<i>Incolto – Agricolo zone montane, nelle quali il codiroso spazzacamino va alla ricerca di terreni sassosi o pareti rocciose fino al limite delle nevi perenni. durante la stagione fredda, la specie abbandona queste zone per scendere a quote inferiori</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Colombaccio				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo si è ben adattato alle città, tanto da essere un assiduo frequentatore dei parchi, anche se è molto più timido del piccione; il suo habitat principale, tuttavia, rimane la campagna, dove è molto presente.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cornacchia grigia			X		<i>Incolto - Agricolo campagne coltivate purché disseminate di alberi, siepi e boschetti, pascoli, brughiere, boschi, rive di fiumi e laghi, coste marine, aree urbane e suburbane</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Corriere piccolo				X	<i>Palustre frequenta laghi, fiumi, ghiaietti allagati; durante l'inverno si può ritrovare lungo le coste marine.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Cuculo				X	<i>frequenta le foreste con radure, campagne alberate, grandi parchi cittadini, pascoli d'alta quota fino a 2.000 m di altitudine sulle alpi.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cutrettola				X	<i>Palustre - Incolto predilige soprattutto i campi umidi, ma si può riprodurre anche in zone asciutte, come nei campi di cereali</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Donnola				X	<i>Incolto - Agricolo terreni coltivati, boschi, zone cespugliate, sassaie e presso abitazioni abbandonate</i>	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto,</i>

						durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Fagiano			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo frequenta una grande varietà di ambienti, come i margini dei boschi, i parchi, i terreni coltivati, i canneti e le zone cespugliose, dal livello del mare fino a quote di 1500 metri circa.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Faina			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo boschi, margini di boschi, zone rocciose, spesso anche vicino ad abitazioni</i>	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Falco cuculo			X		<i>Palustre - Incolto - Agricolo frequenta gli ambienti aperti con esclusione di quelli desertici o troppo aridi: steppe alberate, terreni coltivati alternati a boschi, foreste</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Falco di palude			X		<i>Palustre - Incolto - Agricolo zone umide interne e di litorale, con sufficienti estensioni di canneti. anche foraggiere e steppe cerealicole, soprattutto se adiacenti ad ambienti allagati</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Falco pecchiaiolo			X		<i>Incolto — Boschivo frequenta gli ambienti boscosi d'ogni tipo, possibilmente con spazi aperti sia in pianura che in montagna</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Falco pellegrino		X			<i>Palustre - Incolto - Agricolo predilige gli habitat aperti, come praterie, tundra e campi. sono più diffusi nella tundra e nelle aree costiere</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Folaga				X	<i>Palustre stagni calmi, terreni umidi e acque che scorrono lentamente, con molte piante acquatiche e canne palustri.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Fringuello			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo frequenta boschi, siepi, giardini, aree aperte con alberi sparsi</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Gabbiano comune			X		<i>Palustre - Agricolo frequenta le zone umide sia d'acqua dolce che salata, naturali o artificiali, costiere o dell'entroterra; è pure presente nei laghetti e lungo i fiumi all'interno delle città.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Gabbiano reale			X		<i>Palustre - Agricolo frequenta le coste e il mare aperto, le zone umide costiere, le aree portuali e le città costiere; di rado si inoltra nell'entroterra. abitualmente si porta nelle</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>

					discariche di rifiuti urbani	
Gallinella d'acqua				X	<i>Palustre</i> frequenta zone umide con fitta vegetazione, fiumi a corso lento, risaie e praterie in prossimità dell'acqua	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Garzetta			X		<i>Palustre</i> ambienti acquitrinosi, sponde di fiumi, laghi e stagni	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gazza			X		<i>Incolto - Agricolo</i> prati, cespuglietti, margini dei boschi, frutteti, campi coltivati e in generale da spazi aperti.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Geco comune				X	<i>Agricolo- Antropico</i> muri a secco, nelle vecchie abitazioni e nelle rovine, nelle legnaie e sui tetti	classe Rettili: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Germano reale				X	<i>Palustre</i> zone umide d'acqua dolce quali laghi, fiumi, risorgive, stagni e paludi, e si adatta bene anche in habitat intensamente coltivati	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Gheppio		X			<i>Incolto - Agricolo</i> campi aperti ed erbosi e terreni agricoli, che forniscono loro sufficienti spazi aperti	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Ghiandaia				X	<i>Incolto -- Boschivo</i> foreste cedue e miste, con predilezione per le aree boschive a prevalenza di querce e carpini	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Ghiandaia marina			X		<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta praterie steppose, zone incolte, coltivi con alberi sparsi, boschi di querce e pinete con radure sia di pianura che di bassa collina.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Grillaio		X			<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta ambienti aperti con scarsa copertura arborea ed arbustiva: prati, pascoli, praterie, zone stepposo-cerealicole, ambienti rocciosi	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Gru				X	<i>Palustre</i> frequenta torbiere alberate, zone aperte erbose e paludi. nelle zone di svernamento è presente in lagune, steppe, pascoli, aree coltivate e lungo il corso di grandi fiumi e laghi	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gruccione			X		<i>Palustre - Incolto</i> campagne aperte con vegetazione arborea e arbustiva poco densa e	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area

					discontinua.	di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gufo comune			X		<i>Incolto – Agricolo- Antropico</i> ambienti aperti con alberi sparsi, in filari o in macchie. anche zone boschive alternate a zone aperte	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Lepre comune			X		<i>Incolto - Agricolo</i> campi coltivati, incolti, boschi	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Lodolaio			X		<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta colline, pianure, boschi, in prossimità di zone umide. caccia prevalentemente in volo, di mattina presto o di sera tardi.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Lucarino				X	<i>Incolto - Boschivo</i> boschi di conifere, prediligendo soprattutto gli alberi di larici e abeti rossi, nonché ontano e betulla	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Lucertola campestre			X		<i>Incolto – Agricolo</i> margini di boschi, boscaglie, radure e prati, coltivati, aree urbane, pietraie, cataste di legna, pinete litoranee, litorali sabbiosi, dune con vegetazione scarsa, alvei di torrenti e fiumi, sponde di laghi e stagni	classe Rettili: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI,. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Luì piccolo				X	<i>Incolto - Boschivo</i> frequenta un'ampia varietà di habitat con alberi e arbusti, quali parchi e boschi misti o decidui	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Lupo			X		<i>Incolto – Boschivo - Agricolo</i> zone montane densamente boscate, relativamente ricche di siti rifugio e di prede e con scarsa presenza antropica	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Marangone				X	<i>Palustre</i> frequenta le zone umide d'acqua dolce o debolmente salmastra, caratterizzate da abbondante vegetazione palustre emergente.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Martin pescatore				X	<i>Palustre</i> strettamente legato alla vita acquatica, frequenta fiumi, torrenti, laghi, stagni, canali, lagune salmastre ed estuari.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Marzaiola				X	<i>Palustre</i> frequenta le zone umide aperte anche di piccole dimensioni, con acque dolci e bassi fondali, ed evita quelle troppo chiuse dalla vegetazione	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Merlo				X	<i>Incolto - Boschivo</i> il bosco, ma si adatta a	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area

					vivere in numerosi ambienti e non raramente lo si trova nei frutteti e nei vigneti, in aree urbane a contatto ravvicinato con l'uomo..	di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Mestolone				X	<i>Palustre</i> frequenta specchi d'acqua dolce e salmastra con fitta vegetazione e ricche di fango.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Migliarino di palude				X	<i>Palustre</i> paludi e acquitrini con canneti, carici, erbe alte, e alberi. durante la migrazione frequenta anche habitat più secchi.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Mignattino				X	<i>Palustre</i> zone paludose d'acqua dolce naturali o artificiali, laghi, fiumi a corso lento, risaie, lagune salmastre, saline, estuari e coste del mare.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Natrice dal collare				X	<i>Palustre</i> zone umide di ogni tipo corsi d'acqua ricchi di anfibi	classe Rettili: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Nibbio bruno		X			<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> vive in zone di pianura o collinari, in zone boschive mature miste di latifoglie, circondate da zone aperte terrestri o acquatiche, pascoli	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Nibbio reale		X			<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> aree collinari in cui sono presenti boschi con alberi sufficientemente grandi da potervi collocare il nido accanto ad ampie aree aperte, sia coltivate che non, in cui si alimenta; evita le zone con agricoltura intensiva.	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Nottola comune			X		<i>Boschivo - Incolto</i> zone boschive e di habitat forestali	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Oca selvatica				X	<i>Palustre- Incolto</i> nelle aree di riproduzione frequenta preferibilmente le zone umide con acqua dolce ricche di vegetazione palustre, mentre nei quartieri di svernamento è presente nei terreni palustri poco profondi anche di acque salmastre, nei pascoli, nei campi coltivati e, ove è disturbata, in mare	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Occhiocotto				X	<i>Incolto - Boschivo</i> frequenta la macchia mediterranea, i boschi con fitto strato arbustivo, i cespugliati di steppa, i parchi e i giardini urbani	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Occhione			X		<i>Incolto – Agricolo</i> occupa ambienti aridi,	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area

					prati, coltivi, pascoli, spesso in prossimità di zone umide. specie terricola,	di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Passera europea			X		<i>Incolto – Agricolo-Antropico</i> zone agricole, zone urbane; comportamento migratorio. sedentaria; sito di nidificazione. edificio	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Passera mattugia			X		<i>Incolto – Agricolo- Antropico</i> predilige paesaggi agricoli ricchi di siepi, boschetti campestri e alberi. dove siano disponibili cavità adatte alla nidificazione, cova anche nei frutteti, negli edifici delle aziende agricole e nei parchi. la si trova anche lungo i bordi dei boschi, mentre evita agglomerati con poco verde.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Passera scopaiola				X	<i>Palustre – Incolto</i> occupa principalmente boschi con sottobosco, giovani piantagioni di conifere, torbiere boscate e arbusteti di ontano che dominano il limite della vegetazione arborea	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Passero solitario			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta pendii aridi e assolati in zone rocciose dalle coste marine alle alte montagne, cave di pietra, ambienti urbani e manufatti	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Pavoncella				X	<i>Palustre – Incolto</i> è tipica di ambienti aperti; nidifica in prati, campi coltivati e incolti. durante la riproduzione è territoriale	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Pendolino				X	<i>Palustre</i> frequenta le zone umide di pianura con acqua dolce o salmastra, ricche di cespugli, alberi e canneti. di rado si insedia a quote superiori ai 200	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Pettirosso			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> i boschi di conifere sono il suo habitat naturale, ma è spesso presente anche in giardini, siepi, boschetti, boschi con sottobosco. nidifica nei buchi o nelle spaccature di alberi, ai piedi delle siepi, nell'edera o anche in vecchi oggetti lasciati dall'uomo.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Picchio rosso maggiore				X	<i>Boschivo</i> frequenta le zone collinari e di pianura con boschi sia fitti che radi, parchi, giardini, siepi alberate in aperta campagna e coltivazioni di pioppo	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Picchio verde				X	<i>Boschivo</i> vive in boschi, boschetti e luoghi alberati, con tutte le esposizioni, in zone umide e secche, appartate e frequentate. preferisce le zone alberate discontinue, alternate da zone coltivate.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.

Piccione selvatico		X			<i>Incolto – Agricolo</i> frequentano coste rocciose marine e ambienti circostanti, zone rocciose dell'interno. si nutrono principalmente di sostanze vegetali raccolte direttamente sul terreno o posandosi sugli alberi (o sugli arbusti)	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Pipistrello albolimbato			X		<i>Incolto - Antropico</i> boschi e foreste di ogni tipo, agro ecosistemi con coltivi, boschetti e siepi, parchi e giardini, aree urbane comprese le grandi città	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Pipistrello di Savi			X		<i>Antropico - Boschivo</i> zone costiere, le aree rocciose, i boschi e le foreste di ogni tipo, nonché i più vari ambienti antropizzati, dalle zone agricole alle grandi città	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Piro piro boschereccio				X	<i>Palustre</i> zone agricole, laghi, zone umide, corsi d'acqua; comportamento migratorio. prevalentemente migratrice su lunga distanza	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Piro-piro culbianco				X	<i>Palustre</i> cave di argilla e zone umide con boschetti e canneti	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Piro-piro piccolo				X	<i>Palustre</i> in periodo riproduttivo frequenta le rive dei corsi d'acqua, specie a regime torrentizio, e quelle dei laghi, preferendo le sponde sassose o ciottolose anziché quelle sabbiose o fangose; nelle aree di svernamento s'insedia in un'ampia varietà di zone umide, sia dell'entroterra che costiere	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Pispola			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta ambienti erbosi aperti, umidi e freschi, privi di vegetazione arborea o comunque con pochi alberi e di modesta altezza	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Piviere dorato			X		<i>Palustre - Incolto</i> coltivi scarsamente alberati, lagune, barene e valli da pesca	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Poiana		X			<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> zone boschive alternate a spazi aperti. anche ambienti umidi alberati	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Quaglia		X			<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta le campagne, vicino ai campi coltivati di fieno e cereali, nei terreni aperti con bassa vegetazione. generalmente	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per

					<i>solitaria si ritrova con gli altri per il periodo della migrazione</i>	<i>la ricerca trofica.</i>
Ramarro			X		Incolto – Agricolo margini di boschi, cespuglieti, siepi, radure erbose, prati, coltivi, alvei di fiumi, aree urbane, pinete litoranee, pietraie	<i>classe Rettili: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.</i>
Rana agile				X	<i>boschi e boscaglie, anche xerofili, radure, campi e prati umidi</i>	<i>classe Anfibi: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Rana verde italiana				X	Palustre ambienti umidi, zone costiere. sottobosco di pinete e foreste di latifoglie, in prati e coltivi	<i>classe Anfibi: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Ratto delle chiaviche			X		Agricolo - Antropico campagna, aree urbanizzate paludi, canali e fiumi, discariche, i porti, fognature, aree verdi, cantine	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.</i>
Regolo				X	Incolto –Boschivo frequenta boschi misti e di conifere e, in inverno, nel sottobosco e nelle siepi..	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Riccio			X		Incolto – Agricolo boscaglie e le macchie, lo si trova frequentemente ai margini delle aree coltivate, nei giardini, nei parchi e nei frutteti	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Rigogolo			X		Incolto – Agricolo frequenta boschi di essenze a foglia caduca o misti, frutteti, pioppeti, boschi planiziali, parchi urbani e giardini	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Rinolofo maggiore			X		Incolto - Antropico zone calde e aperte con alberi e cespugli prossime ad acque ferme o correnti, anche in vicinanza di insediamenti umani	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne</i>
Rondine			X		Incolto – Agricolo zone agricole con bestiame e fienili. compiono lunghissime migrazioni sorvolando aree aperte ma anche tratti di mare e creste montuose	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Rondone			X		Incolto – Agricolo - Antropico vive in città e paesi soprattutto con centri storici ricchi di cavità, a volte anche su coste rocciose o altri dirupi naturali, mentre comunemente nella taiga e ormai solo localmente altrove nidifica nelle cavità scavate dai picchi negli alberi.	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>


Rospo comune				X	<i>Palustre</i> aree boschive di conifere, latifoglie e boschi misti, soprattutto in luoghi umidi, tanto quanto campagne aperte	Classe Anfibi: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Rospo smeraldino				X	<i>Palustre</i> habitat umidi, orti, coltivi, giardini	classe Anfibi: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Saltimepalo				X	<i>Incolto – Agricolo</i> la sua residenza invernale è l'Europa meridionale e occidentale. in Europa centrale e orientale il saltimpalo è presente da marzo a novembre. vive su superfici aperte con vegetazione arbustiva, per esempio in brughiere, praterie alte, incolti, prati, campi coltivati.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Scricciolo				X	<i>Incolto –Boschivo</i> frequenta un'ampia varietà di ambienti: boschi e loro margini, zone fresche e ombrose con cespugli e alberi sparsi, macchia mediterranea	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Serotino comune				X	<i>Incolto – Antropico - Agricolo</i> aree boscate, parchi e giardini, agrosistemi con presenza di siepi.	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Smeriglio				X	<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta ambienti aperti e semi-boscati, tundra, brughiere e zone umide	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Sparviero				X	<i>Incolto –Boschivo</i> boschi di qualsiasi tipo, anche governati a ceduo, e zone alberate in genere, a tutte le altitudini	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Starna				X	frequenta pianure e colline caratterizzate da alternanza di colture arate, medicaie, prati, pascoli, frutteti, vigneti, incolti, fasce cespugliose	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Sterpazzola				X	<i>Incolto - Boschivo</i> frequenta ambienti soleggiati ove si alternano spazi aperti con folta vegetazione erbacea e cespugli, dal livello del mare fino ad altitudini di circa 1.500 metri. nella stagione riproduttiva preferisce i margini dei boschi, le radure, i terreni incolti e le brughiere	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Stiaccino				X	<i>Incolto – Agricolo</i> nidifica in praterie ampie, ricche di strutture e leggermente	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area

					<i>concimare, sui pascoli estensivi, nelle torbiere alte e nelle associazioni alpine di arbusti nani gli effettivi sono lievemente inferiori</i>	<i>di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Storno		X			Incolto – Agricolo – Antropico frequenta campagne coltivate e incolti di pianura, di collina ed anche di montagna, parchi e giardini, boschi, villaggi e città. in Italia è sedentario e nidificante, erratico, migratore e svernante regolare	<i>classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Strillozzo			X		Incolto – Agricolo predilige aree aperte o molto aperte, purché vi sia qualche alto posatoio come punto di controllo e di canto e qualche sito in grado di offrire riparo, ed evita quindi foreste, zone umide – frequentate solo come dormitori – terreni rocciosi e accidentati, alte montagne e aree urbane	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Succiapapere			X		Incolto – Agricolo le strutture dell'habitat del succiapapere sono molto varie, tuttavia sono sempre ambienti aperti, asciutti e dal clima temperato	<i>classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Taccola		X			Incolto – Agricolo - Antropico frequenta ambienti rupestri, boschi non troppo fitti, campagne alberate. nei centri urbani si insedia in posizioni dominanti: torri, campanili	<i>classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Talpa romana		X			Incolto – Agricolo campi coltivati, prati con terreni prevalentemente freschi, porosi dove può agevolmente scavare le sue gallerie	<i>classe Mammiferi: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.</i>
Tarabusino				X	Palustre zone umide d'acqua dolce, ferma o corrente; predilige canneti fitti come il suo parente di maggiori dimensioni	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Tasso			X		Incolto –Boschivo zone boschive con fitto sottobosco, incolti	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Testuggine comune			X		Incolto –Boschivo macchia mediterranea, boschi di querce e di lecci	<i>classe Rettili: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Testuggine d'acqua				X	Palustre stagni, laghi, risorgive, fiumi, canali e fossati, paludi, bacini di cave esaurite; in	<i>classe Rettili: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>

					generale, zone umide con ricca vegetazione.	
Topo campagnolo			X		<i>Incolto – Agricolo</i> ambienti boschivi e di macchia, sia costieri che di montagna, boschi, campi, giardini e pietraie	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, e in area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Topo domestico		X			<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> ambienti urbani e suburbani e selvatico	classe Mammiferi: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Toporagno nano			X		<i>Incolto – Agricolo</i> aree boschive, zone erbose e nelle siepi, cespuglieti, praterie, zone umide e fresche	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Tordela			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta boschi puri o misti di conifere e latifoglie con radure e ampie aree erbose, dalle rive del mare alle alte montagne	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Tordo bottaccio			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta boschi di conifere miste o di latifoglie ricchi di sottobosco, pianure alberate e cespugliate, vigneti, oliveti, macchia mediterranea, parchi e giardini.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Tordo sassello			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta boschi, parchi e, al di fuori del periodo della riproduzione, pascoli, zone coltivate, terreni in prossimità di zone umide	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Tortora		X			<i>Incolto – Agricolo</i> Il suo habitat preferenziale è quello dei campi, nelle zone rurali, dove siano presenti grandi alberi su cui nidificare.	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Tortora dal collare		X			<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> frequenta principalmente i parchi urbani e suburbani, nonché i margini delle terre coltivate ove siano presenti alberature	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Tritone italico				X	<i>Palustre</i> laghi, stagni, maceri, pozze, risorgive, fuori dall'acqua in ambienti del suolo, prati e boschi	classe Anfibi: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Tuffetto				X	<i>Palustre</i> frequenta le zone umide sia d'acqua dolce che debolmente salmastra anche di piccole	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area

					dimensioni, purché sia presente un'abbondante vegetazione	di impianto.
Upupa			X		<i>Incolto – Agricolo</i> ama i luoghi secchi, semi-alberati, caldi e assolati e per questo la si può incontrare in frutteti, prati e vigneti o lungo strade sterrate tipiche delle nostre campagne, dove può fare i bagni di polvere e trovare il suo cibo preferito	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Usignolo di fiume				X	<i>Palustre</i> frequenta la fitta vegetazione ripariale erbacea e arbustiva delle zone paludose, delle rive di fiumi, laghi e stagni, e delle torbiere.	classe Uccelli: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Verdone			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta campagne alberate, frutteti, boschi, campi coltivati a graminacee, parchi e giardini urbani e suburbani. predilige le zone pianeggianti	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Verzellino			X		<i>Incolto – Agricolo</i> l'habitat di questi uccelli è rappresentato dalle aree di pianura e collina con presenza di aree boschive non eccessivamente fitte, sia decidue che sempreverdi	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Vipera comune				X	luoghi aridi e caldi arbusti, siepi, margini dei boschi.	classe Rettili: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Volpe			X		<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> zone boschive e le pinete costiere, coltivi, incolti centri abitati	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Zigolo nero			X		<i>Incolto – Agricolo - Boschivo</i> frequenta praterie, incolti erbosi e cespugliati, coltivi, frutteti, vigneti, boschi anche molto degradati in zone collinari e montane	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.

Parco Eolico Fenice fase di Dismissione Impatti Diretti Fauna		
Grado di impatto	Specie	Percentuale
Impatto alto	0	0%
Impatto medio	22	14%
Impatto basso	72	47%
Impatto nullo	59	39%



Parco Eolico Fenice stima degli impatti tra Fauna e opere di progetto fase di DISMISSIONE						
Fauna	Stima degli impatti INDIRETTI				Habitat di predilezione	Note
	Alto	Medio	Basso	Nulla		
Airone cenerino				X	<i>Palustre</i> frequenta prati umidi e torrenti anche nei pressi di centri urbani e abitati.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Airone guardabuoi				X	<i>Palustre - Incolto</i> frequenta zone umide poco estese, zone palustri, risaie e praterie dove si associa spesso al bestiame al pascolo. meno acquatico degli altri aironi	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Albanella minore			X		<i>Palustre – Incolto - Agricolo</i> brughiere, praterie, pascoli, steppe cerealicole a zone umide. generalmente alle basse quote. fino ai 1500 m in asia. anche nelle praterie d'altitudine durante le migrazioni.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Albanella reale			X		<i>Palustre – Incolto - Agricolo</i> brughiere, praterie, coltivi erbacei, pascoli e zone umide, generalmente al di sotto dei 500 m in Europa. localmente, quote più elevate in asia. anche in praterie d'altitudine durante le migrazioni	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Alborella				X	fiumi a corrente moderata, laghi di ogni estensione, canali di pianura.	Classe Pesci: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Allocco				X	<i>Boschivo</i> frequenta boschi di latifoglie e misti, alternati ad ampie radure che fungono da territori di caccia, zone agricole	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.

Allodola	X				<i>Incolto</i> frequenta campagne più o meno coltivate, steppe, prati, pascoli e dune sabbiose, sia in pianura che in quota	classe Uccelli: alta interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Alzavola				X	<i>Palustre</i> con bassi fondali: paludi, torbiere, risaie, acquitrini, stagni, lagune, saline, aree di mare frequenta zone umide anche di piccole dimensioni	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Arvicola terrestre	X				<i>Incolto - Agricolo</i> fossi, canali irrigui, fiumi, stagni delle pianure e dei fondovalle, rive dei laghi, specchi d'acqua dolce e salmastra	classe Mammiferi: alta interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Assiolo			X		<i>Incolto – Agricolo – Antropico</i> ambienti aperti in genere, anche di tipo rurale o suburbano. fino ai 1500 m.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Averla capirossa			X		<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta campagne alberate con siepi, aree incolte ricche di cespugli e alberi sparsi, macchia mediterranea, oliveti, frutteti, vigneti,	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Averla cenerina			X		<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta margini di boschi, campi coltivati e strade campestri con vegetazione ad alberi sparsi e cespugli sia in pianura che sui rilievi a pendii dolci. nelle zone di svernamento è presente nelle savane e nelle secche boscaglie di acacie.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Averla piccola			X		<i>Incolto - Agricolo</i> ambienti aperti cespugliosi, campagne percorse da siepi, macchie rade, radure, lande incolte, ambienti ecotonali fra pascoli e bosco. dal fondovalle a quasi 2000 m s.l.m. nidifica fra i cespugli e piccoli alberi tra i 70 cm e i 2 metri.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Balestruccio			X		<i>Incolto - Agricolo</i> costruiscono il loro nido sotto grondaie, tettoie, entrate delle porte, raramente anche sotto rupi, ponti in cemento armato o affini	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Ballerina bianca			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta un'ampia tipologia di habitat, preferendo le zone aperte, presso stagni, laghi, corsi d'acqua, rive marine. localmente può vivere su terreni secchi o addirittura semidesertici. si è pure adattata agli	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.

					ambienti coltivati e a quelli urbani, dove trova abbondanza di cibo e di siti di nidificazione	
Barbagianni			X		<i>Incolto – Agricolo – Antropico</i> ambienti aperti di vario genere, comprese zone umide, rurali e suburbane. generalmente al di sotto dei 600 metri in Europa; anche a quote più elevate altrove	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Barbastello comune			X		<i>Incolto – Agricolo – Antropico - Palustre</i> aree boscate collinari e di bassa e media montagna	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Beccaccia				X	<i>Boschivo</i> si riproduce in foreste miste di latifoglie, talvolta anche in consociazione con conifere, purchè sia garantita la presenza di sottobosco, radure e suoli ricchi di lettiera.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Beccaccino				X	<i>Palustre</i> si adatta dovunque, anche se predilige paludi, prati umidi, praterie e risaie.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Beccamoschino				X	<i>Palustre - Incolto</i> aree con bassa vegetazione erbosa, spesso vicino all'acqua, paludi, ma anche campi asciutti	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Biacco	X				<i>Incolto - Agricolo</i> macchie, margini di boschi, radure, zone rocciose, muri a secco e pietraie; anche siepi, coltivi e aree antropizzate	classe Rettili: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Biscia tassellata				X	habitat acquatici, da cui di solito non si allontana, fiumi, canali, torrenti e ruscelli.	classe Rettili: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Calandra		X			<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta zone aperte a clima secco, incolte o parzialmente coltivate, pianeggianti o collinari, con vegetazione bassa e assenza di alberi e cespugli	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Calandrella		X			<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta ambienti aridi aperti con scarsa vegetazione erbacea, greti ciottolosi e sabbiosi di corsi d'acqua, incolti, steppe cerealicole.	classe Uccelli: media interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Cannaiola				X	<i>Palustre</i> specie strettamente legata agli ambienti umidi e paludosi	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area

						di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Capinera				X	<i>Incolto –Boschivo</i> vive nell'intrico delle siepi più fitte, nei cespugli e tra i rami degli alberi da frutta, ma non disdegna il sottobosco	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Cappellaccia		X			<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta gli ambienti steppici: terreni incolti, aridi, pietrosi, zone semidesertiche, lande coltivate preferibilmente a foraggiare, campi arati	classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Cardellino			X		<i>Incolto - Agricolo</i> da prati fioriti, praterie con erba alta, boschi aperti, piantagioni, frutteti, parchi e giardini	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Carpa				X	laghi grandi e piccoli e nei tratti medi ed inferiori dei fiumi	Classe Pesci: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Cavedano				X	acque dolci correnti, limpide e calme. nei laghi si distribuisce lungo le acque litorali, nei fiumi fino agli estuari	Classe Pesci: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Cervone		X			<i>Incolto – Agricolo</i> macchia mediterranea, il limitare di boschi, i boschi radi e soleggiati o in genere i luoghi con vegetazione sparsa, le sassaie, i muretti a secco e gli edifici abbandonati	classe Rettili: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Cesena			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> frequenta boschi, parchi, frutteti in prossimità di praterie e pianure coltivate.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Cicogna bianca				X	<i>Palustre</i> ambienti aperti come paludi o pianure erbose, dove può trovare facilmente cibo; per nidificare sceglie punti molto alti e scoperti, come la cima di edifici o di tralicci elettrici	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Cinciallegra				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> boschi di conifere, frutteti, campi, siepi, giardini e parchi urbani.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Cinciarella				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> abita nei boschi misti di bassa collina o pianeggianti, nei frutteti, nei giardini e nei parchi. e' rara nelle foreste di conifere	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Cinghiale				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> boschi folti a prevalenza di latifoglie con sottobosco, alternati	classe Mammiferi: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di

					<i>a terreni pantanosi, pascoli o terreni coltivati</i>	<i>impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat.</i>
Civetta			X		<i>Incolto – Agricolo – Antropico zone aperte, pianeggianti, collinari, montane, boschive e alberate, coltivate e incolte, secche e umide, appartate e frequentate. predilige gli ambienti urbanizzati, soprattutto quelli rurali</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Codibugnolo				X	<i>Palustre frequenta i boschi di latifoglie con folto sottobosco, campagne con filari, frutteti e vigneti, parchi e giardini urbani</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Codirosso			X		<i>Incolto - Agricolo predilige boschi non troppo chiusi di larici e cembri, o boschi ai margini di torrenti. si concentra principalmente a quote medio-basse, ma arriva a raggiungere anche i 2000 metri di altitudine sulle alpi, mantenendosi generalmente nelle vicinanze di centri abitati.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Codirosso spazzacamino			X		<i>Incolto – Agricolo zone montane, nelle quali il codirosso spazzacamino va alla ricerca di terreni sassosi o pareti rocciose fino al limite delle nevi perenni. durante la stagione fredda, la specie abbandona queste zone per scendere a quote inferiori</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Colombaccio			X		<i>Incolto – Agricolo- Boschivo si è ben adattato alle città, tanto da essere un assiduo frequentatore dei parchi, anche se è molto più timido del piccione; il suo habitat principale, tuttavia, rimane la campagna, dove è molto presente.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cornacchia grigia		X			<i>Incolto – Agricolo campagne coltivate purché disseminate di alberi, siepi e boschetti, pascoli, brughiere, boschi, rive di fiumi e laghi, coste marine, aree urbane e suburbane</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Corriere piccolo				X	<i>Palustre frequenta laghi, fiumi, ghiaietti allagati; durante l'inverno si può ritrovare lungo le coste marine.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Cuculo			X		<i>frequenta le foreste con radure, campagne alberate, grandi parchi cittadini, pascoli d'alta quota fino a 2.000 m di altitudine sulle alpi.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>

Cutrettola				X	<i>Palustre - Incolto predilige soprattutto i campi umidi, ma si può riprodurre anche in zone asciutte, come nei campi di cereali</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Donnola				X	<i>Incolto - Agricolo terreni coltivati, boschi, zone cespugliate, sassaie e presso abitazioni abbandonate</i>	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Fagiano				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo frequenta una grande varietà di ambienti, come i margini dei boschi, i parchi, i terreni coltivati, i canneti e le zone cespugliose, dal livello del mare fino a quote di 1500 metri circa.</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Faina				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo boschi, margini di boschi, zone rocciose, spesso anche vicino ad abitazioni</i>	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Falco cuculo				X	<i>Palustre - Incolto - Agricolo frequenta gli ambienti aperti con esclusione di quelli desertici o troppo aridi: steppe alberate, terreni coltivati alternati a boschi, foreste</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Falco di palude				X	<i>Palustre - Incolto - Agricolo zone umide interne e di litorale, con sufficienti estensioni di canneti. anche foraggiere e steppe cerealicole, soprattutto se adiacenti ad ambienti allagati</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Falco pecchiaiolo				X	<i>Incolto — Boschivo frequenta gli ambienti boscosi d'ogni tipo, possibilmente con spazi aperti sia in pianura che in montagna</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Falco pellegrino			X		<i>Palustre - Incolto - Agricolo predilige gli habitat aperti, come praterie, tundra e campi. sono più diffusi nella tundra e nelle aree costiere</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Folaga				X	<i>Palustre stagni calmi, terreni umidi e acque che scorrono lentamente, con molte piante acquatiche e canne palustri.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Fringuello				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo frequenta boschi, siepi, giardini, aree aperte con alberi sparsi</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Gabbiano comune				X	<i>Palustre - Agricolo frequenta le zone umide sia d'acqua dolce che salata, naturali o artificiali,</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area</i>

					costiere o dell'entroterra; è pure presente nei laghetti e lungo i fiumi all'interno delle città.	di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gabbiano reale			X		<i>Palustre - Agricolo</i> frequenta le coste e il mare aperto, le zone umide costiere, le aree portuali e le città costiere; di rado si inoltra nell'entroterra. abitualmente si porta nelle discariche di rifiuti urbani	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gallinella d'acqua				X	<i>Palustre</i> frequenta zone umide con fitta vegetazione, fiumi a corso lento, risaie e praterie in prossimità dell'acqua	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Garzetta			X		<i>Palustre</i> ambienti acquitrinosi, sponde di fiumi, laghi e stagni	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gazza			X		<i>Incolto - Agricolo</i> prati, cespuglietti, margini dei boschi, frutteti, campi coltivati e in generale da spazi aperti.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Geco comune				X	<i>Agricolo- Antropico</i> muri a secco, nelle vecchie abitazioni e nelle rovine, nelle legnaie e sui tetti	classe Rettili: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Germano reale				X	<i>Palustre</i> zone umidi d'acqua dolce quali laghi, fiumi, risorgive, stagni e paludi, e si adatta bene anche in habitat intensamente coltivati	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gheppio		X			<i>Incolto - Agricolo</i> campi aperti ed erbosi e terreni agricoli, che forniscono loro sufficienti spazi aperti	classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Ghiandaia				X	<i>Incolto — Boschivo</i> foreste cedue e miste, con predilezione per le aree boschive a prevalenza di querce e carpini	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Ghiandaia marina			X		<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta praterie steppose, zone incolte, coltivi con alberi sparsi, boschi di querce e pinete con radure sia di pianura che di bassa collina.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Grillaio		X			<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta ambienti aperti con scarsa copertura arborea ed arbustiva: prati, pascoli, praterie, zone stepposo-cerealicole, ambienti rocciosi	classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per

						la ricerca trofica.
Gru				X	<i>Palustre</i> frequenta torbiere alberate, zone aperte erbose e paludi. nelle zone di svernamento è presente in lagune, steppe, pascoli, aree coltivate e lungo il corso di grandi fiumi e laghi	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gruccione			X		<i>Palustre - Incolto</i> campagne aperte con vegetazione arborea e arbustiva poco densa e discontinua.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Gufo comune			X		<i>Incolto – Agricolo- Antropico</i> ambienti aperti con alberi sparsi, in filari o in macchie. anche zone boschive alternate a zone aperte	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Lepre comune			X		<i>Incolto - Agricolo</i> campi coltivati, incolti, boschi	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Lodolaio			X		<i>Incolto - Agricolo</i> frequenta colline, pianure, boschi, in prossimità di zone umide. caccia prevalentemente in volo, di mattina presto o di sera tardi.	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Lucarino				X	<i>Incolto - Boschivo</i> boschi di conifere, prediligendo soprattutto gli alberi di larici e abeti rossi, nonché ontano e betulla	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Lucertola campestre		X			<i>Incolto – Agricolo</i> margini di boschi, boscaglie, radure e prati, coltivi, aree urbane, pietraie, cataste di legna, pinete litoranee, litorali sabbiosi, dune con vegetazione scarsa, alvei di torrenti e fiumi, sponde di laghi e stagni	classe Rettili: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Luì piccolo				X	<i>Incolto - Boschivo</i> frequenta un'ampia varietà di habitat con alberi e arbusti, quali parchi e boschi misti o decidui	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Lupo			X		<i>Incolto – Boschivo - Agricolo</i> zone montane densamente boscate, relativamente ricche di siti rifugio e di prede e con scarsa presenza antropica	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Marangone				X	<i>Palustre</i> frequenta le zone umide d'acqua dolce o debolmente salmastra, caratterizzate da abbondante vegetazione palustre emergente.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.

Martin pescatore				X	<i>Palustre</i> strettamente legato alla vita acquatica, frequenta fiumi, torrenti, laghi, stagni, canali, lagune salmastre ed estuari.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Marzaiola				X	<i>Palustre</i> frequenta le zone umide aperte anche di piccole dimensioni, con acque dolci e bassi fondali, ed evita quelle troppo chiuse dalla vegetazione	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Merlo				X	<i>Incolto - Boschivo</i> il bosco, ma si adatta a vivere in numerosi ambienti e non raramente lo si trova nei frutteti e nei vigneti, in aree urbane a contatto ravvicinato con l'uomo..	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Mestolone				X	<i>Palustre</i> frequenta specchi d'acqua dolce e salmastra con fitta vegetazione e ricche di fango.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Migliarino di palude				X	<i>Palustre</i> paludi e acquitrini con canneti, carici, erbe alte, e alberi. durante la migrazione frequenta anche habitat più secchi.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Mignattino				X	<i>Palustre</i> zone paludose d'acqua dolce naturali o artificiali, laghi, fiumi a corso lento, risaie, lagune salmastre, saline, estuari e coste del mare.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Natrice dal collare				X	<i>Palustre</i> zone umide di ogni tipo corsi d'acqua ricchi di anfibii	classe Rettili: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Nibbio bruno		X			<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> vive in zone di pianura o collinari, in zone boschive mature miste di latifoglie, circondate da zone aperte terrestri o acquatiche, pascoli	classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Nibbio reale		X			<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> aree collinari in cui sono presenti boschi con alberi sufficientemente grandi da potervi collocare il nido accanto ad ampie aree aperte, sia coltivate che non, in cui si alimenta; evita le zone con agricoltura intensiva.	classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Nottola comune			X		<i>Boschivo - Incolto</i> zone boschive e di habitat forestali	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne

Oca selvatica				X	<i>Palustre- Incolto</i> nelle aree di riproduzione frequenta preferibilmente le zone umide con acqua dolce ricche di vegetazione palustre, mentre nei quartieri di svernamento è presente nei terreni palustri poco profondi anche di acque salmastre, nei pascoli, nei campi coltivati e, ove è disturbata, in mare	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Occhiocotto				X	<i>Incolto - Boschivo</i> frequenta la macchia mediterranea, i boschi con fitto strato arbustivo, i cespugliati di steppa, i parchi e i giardini urbani	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Occhione				X	<i>Incolto – Agricolo</i> occupa ambienti aridi, prati, coltivi, pascoli, spesso in prossimità di zone umide. specie terricola,	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Passera europea				X	<i>Incolto – Agricolo-Antropico</i> zone agricole, zone urbane; comportamento migratorio. sedentaria; sito di nidificazione. edificio	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Passera mattugia				X	<i>Incolto – Agricolo- Antropico</i> predilige paesaggi agricoli ricchi di siepi, boschetti campestri e alberi. dove siano disponibili cavità adatte alla nidificazione, cova anche nei frutteti, negli edifici delle aziende agricole e nei parchi. la si trova anche lungo i bordi dei boschi, mentre evita agglomerati con poco verde.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Passera scopaiola				X	<i>Palustre – Incolto</i> occupa principalmente boschi con sottobosco, giovani piantagioni di conifere, torbiere boscate e arbusteti di ontano che dominano il limite della vegetazione arborea	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Passero solitario				X	<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta pendii aridi e assolati in zone rocciose dalle coste marine alle alte montagne, cave di pietra, ambienti urbani e manufatti	classe Uccelli: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Pavoncella				X	<i>Palustre – Incolto</i> è tipica di ambienti aperti; nidifica in prati, campi coltivati e incolti. durante la riproduzione è territoriale	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Pendolino				X	<i>Palustre</i> frequenta le zone umide di pianura con acqua dolce o salmastra, ricche di cespugli, alberi e canneti. di rado si insedia a quote superiori ai 200	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Pettirosso				X	<i>Incolto – Agricolo- Boschivo</i> i boschi di	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di

					conifere sono il suo habitat naturale, ma è spesso presente anche in giardini, siepi, boschetti, boschi con sottobosco. nidifica nei buchi o nelle spaccature di alberi, ai piedi delle siepi, nell'edera o anche in vecchi oggetti lasciati dall'uomo.	progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Picchio rosso maggiore				X	<i>Boschivo</i> frequenta le zone collinari e di pianura con boschi sia fitti che radi, parchi, giardini, siepi alberate in aperta campagna e coltivazioni di pioppo	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Picchio verde				X	<i>Boschivo</i> vive in boschi, boschetti e luoghi alberati, con tutte le esposizioni, in zone umide e secche, appartate e frequentate. preferisce le zone alberate discontinue, alternate da zone coltivate.	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Piccione selvatico		X			<i>Incolto – Agricolo</i> frequentano coste rocciose marine e ambienti circostanti, zone rocciose dell'interno. si nutrono principalmente di sostanze vegetali raccolte direttamente sul terreno o posandosi sugli alberi (o sugli arbusti	classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Pipistrello albolimbato			X		<i>Incolto - Antropico</i> boschi e foreste di ogni tipo, agro ecosistemi con coltivi, boschetti e siepi, parchi e giardini, aree urbane comprese le grandi città	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Pipistrello di Savi			X		<i>Antropico - Boschivo</i> zone costiere, le aree rocciose, i boschi e le foreste di ogni tipo, nonché i più vari ambienti antropizzati, dalle zone agricole alle grandi città	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Piro piro boschereccio				X	<i>Palustre</i> zone agricole, laghi, zone umide, corsi d'acqua; comportamento migratorio. prevalentemente migratrice su lunga distanza	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Piro-piro culbianco				X	<i>Palustre</i> cave di argilla e zone umide con boschetti e canneti	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Piro-piro piccolo				X	<i>Palustre</i> in periodo riproduttivo frequenta le rive dei corsi d'acqua, specie a regime torrentizio, e quelle dei laghi, preferendo le sponde sassose o ciottolose anziché quelle sabbiose o fangose; nelle aree di svernamento s'insedia in un'ampia varietà di zone umide, sia dell'entroterra che costiere	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Pispola			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta ambienti erbosi	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di

					<i>aperti, umidi e freschi, privi di vegetazione arborea o comunque con pochi alberi e di modesta altezza</i>	<i>interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Piviere dorato			X		<i>Palustre - Incolto coltivi scarsamente alberati, lagune, barene e valli da pesca</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Poiana		X			<i>Incolto – Agricolo- Boschivo zone boschive alternate a spazi aperti. anche ambienti umidi alberati</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Quaglia		X			<i>Incolto – Agricolo frequenta le campagne, vicino ai campi coltivati di fieno e cereali, nei terreni aperti con bassa vegetazione. generalmente solitaria si ritrova con gli altri per il periodo della migrazione</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Ramarro		X			<i>Incolto – Agricolo margini di boschi, cespuglieti, siepi, radure erbose, prati, coltivi, alvei di fiumi, aree urbane, pinete litoranee, pietraie</i>	<i>classe Rettili: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.</i>
Rana agile				X	<i>boschi e boscaglie, anche xerofili, radure, campi e prati umidi</i>	<i>classe Anfibi: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Rana verde italiana				X	<i>Palustre ambienti umidi, zone costiere. sottobosco di pinete e foreste di latifoglie, in prati e coltivi</i>	<i>classe Anfibi: nessuna interferenza in diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Ratto delle chiaviche		X			<i>Agricolo - Antropico campagna, aree urbanizzate paludi, canali e fiumi, discariche, i porti, fognature, aree verdi, cantine</i>	<i>classe Mammiferi: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.</i>
Regolo				X	<i>Incolto –Boschivo frequenta boschi misti e di conifere e, in inverno, nel sottobosco e nelle siepi..</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Riccio			X		<i>Incolto – Agricolo boscaglie e le macchie, lo si trova frequentemente ai margini delle aree coltivate, nei giardini, nei parchi e nei frutteti</i>	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Rigogolo			X		<i>Incolto – Agricolo frequenta boschi di essenze a foglia caduca o misti, frutteti, pioppeti, boschi planiziali, parchi urbani e giardini</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>

Rinolofo maggiore			X		<i>Incolto - Antropico</i> zone calde e aperte con alberi e cespugli prossime ad acque ferme o correnti, anche in vicinanza di insediamenti umani	classe Mammiferi: bassa interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Rondine			X		<i>Incolto – Agricolo</i> zone agricole con bestiame e fienili. compiono lunghissime migrazioni sorvolando aree aperte ma anche tratti di mare e creste montuose	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Rondone			X		<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> vive in città e paesi soprattutto con centri storici ricchi di cavità, a volte anche su coste rocciose o altri dirupi naturali, mentre comunemente nella taiga e ormai solo localmente altrove nidifica nelle cavità scavate dai picchi negli alberi.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Rospo comune				X	<i>Palustre</i> aree boschive di conifere, latifoglie e boschi misti, soprattutto in luoghi umidi, tanto quanto campagne aperte	Classe Anfibi: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Rospo smeraldino				X	<i>Palustre</i> habitat umidi, orti, coltivi, giardini	classe Anfibi: nessuna interferenza diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Saltimpalo			X		<i>Incolto – Agricolo</i> la sua residenza invernale è l'Europa meridionale e occidentale. in Europa centrale e orientale il saltimpalo è presente da marzo a novembre. vive su superfici aperte con vegetazione arbustiva, per esempio in brughiere, praterie alte, incolti, prati, campi coltivati.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Scricciolo				X	<i>Incolto –Boschivo</i> frequenta un'ampia varietà di ambienti: boschi e loro margini, zone fresche e ombrose con cespugli e alberi sparsi, macchia mediterranea	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Serotino comune			X		<i>Incolto – Antropico . Agricolo</i> aree boscate, parchi e giardini, agrosistemi con presenza di siepi.	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamenti e per la ricerca trofica. Specie di abitudini notturne
Smeriglio			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta ambienti aperti e semi-boscati, tundra, brughiere e zone umide	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.


Sparviero			X		<i>Incolto –Boschivo</i> boschi di qualsiasi tipo, anche governati a ceduo, e zone alberate in genere, a tutte le altitudini	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Starna			X		frequenta pianure e colline caratterizzate da alternanza di colture arate, medicaie, prati, pascoli, frutteti, vigneti, incolti, fasce cespugliose	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Sterpazzola				X	<i>Incolto – Boschivo</i> frequenta ambienti soleggiati ove si alternano spazi aperti con folta vegetazione erbacea e cespugli, dal livello del mare fino ad altitudini di circa 1.500 metri. nella stagione riproduttiva preferisce i margini dei boschi, le radure, i terreni incolti e le brughiere	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Stiaccino			X		<i>Incolto – Agricolo</i> nidifica in praterie ampie, ricche di strutture e leggermente concimate. sui pascoli estensivi, nelle torbiere alte e nelle associazioni alpine di arbusti nani gli effettivi sono lievemente inferiori	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Sturno		X			<i>Incolto – Agricolo – Antropico</i> frequenta campagne coltivate e incolti di pianura, di collina ed anche di montagna, parchi e giardini, boschi, villaggi e città. in Italia è sedentario e nidificante, erratico, migratore e svernante regolare	classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Strillozzo			X		<i>Incolto – Agricolo</i> predilige aree aperte o molto aperte, purché vi sia qualche alto posatoio come punto di controllo e di canto e qualche sito in grado di offrire riparo, ed evita quindi foreste, zone umide – frequentate solo come dormitori – terreni rocciosi e accidentati, alte montagne e aree urbane	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Succiacapre			X		<i>Incolto – Agricolo</i> le strutture dell'habitat del succiacapre sono molto varie, tuttavia sono sempre ambienti aperti, asciutti e dal clima temperato	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Taccola		X			<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> frequenta ambienti rupestri, boschi non troppo fitti, campagne alberate. nei centri urbani si insedia in posizioni dominanti: torri, campanili	classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.
Talpa romana		X			<i>Incolto – Agricolo</i> campi coltivati, prati con terreni prevalentemente freschi, porosi dove può	classe Mammiferi: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di

					agevolmente scavare le sue gallerie	impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Tarabusino				X	<i>Palustre</i> zone umide d'acqua dolce, ferma o corrente; predilige canneti fitti come il suo parente di maggiori dimensioni	classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Tasso			X		<i>Incolto –Boschivo</i> zone boschive con fitto sottobosco, incolti	classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Testuggine comune			X		<i>Incolto –Boschivo</i> macchia mediterranea, boschi di querce e di lecci	classe Rettili: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Testuggine d'acqua				X	<i>Palustre</i> stagni, laghi, risorgive, fiumi, canali e fossati, paludi, bacini di cave esaurite; in generale, zone umide con ricca vegetazione.	classe Rettili: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.
Topo campagnolo		X			<i>Incolto – Agricolo</i> ambienti boschivi e di macchia, sia costieri che di montagna, boschi, campi, giardini e pietraie	classe Mammiferi: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Topo domestico		X			<i>Incolto – Agricolo - Antropico</i> ambienti urbani e suburbani e selvatico	classe Mammiferi: media interferenzain diretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante gli spostamento e per la ricerca trofica. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Toporagno nano		X			<i>Incolto – Agricolo</i> aree boschive, zone erbose e nelle siepi, cespuglieti, praterie, zone umide e fresche	classe Mammiferi: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo. Sottrazione di habitat e di siti di riproduzione.
Tordela			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta boschi puri o misti di conifere e latifoglie con radure e ampie aree erbose, dalle rive del mare alle alte montagne	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Tordo bottaccio			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta boschi di conifere miste o di latifoglie ricchi di sottobosco, pianure alberate e cespugliate, vigneti, oliveti, macchia mediterranea, parchi e giardini.	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.
Tordo sassello			X		<i>Incolto – Agricolo</i> frequenta boschi, parchi e, al di fuori del periodo della riproduzione,	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area

					<i>pascoli, zone coltivate, terreni in prossimità di zone umide</i>	<i>di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Tortora		X			<i>Incolto – Agricolo Il suo habitat preferenziale è quello dei campi, nelle zone rurali, dove siano presenti grandi alberi su cui nidificare.</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Tortora dal collare		X			<i>Incolto – Agricolo - Antropico frequenta principalmente i parchi urbani e suburbani, nonché i margini delle terre coltivate ove siano presenti alberature</i>	<i>classe Uccelli: media interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in Avi ed in area di impianto. Probabile disturbo causato dall'incremento di mezzi meccanici in area di impianto, durante i voli di spostamento e per la ricerca trofica.</i>
Tritone italico				X	<i>Palustre laghi, stagni, maceri, pozze, risorgive, fuori dall'acqua in ambienti del suolo, prati e boschi</i>	<i>classe Anfibi: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto.</i>
Tuffetto				X	<i>Palustre frequenta le zone umide sia d'acqua dolce che debolmente salmastra anche di piccole dimensioni, purché sia presente un'abbondante vegetazione</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Upupa			X		<i>Incolto – Agricolo ama i luoghi secchi, semi-alberati, caldi e assolati e per questo la si può incontrare in frutteti, prati e vigneti o lungo strade sterrate tipiche delle nostre campagne, dove può fare i bagni di polvere e trovare il suo cibo preferito</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Usignolo di fiume				X	<i>Palustre frequenta la fitta vegetazione ripariale erbacea e arbustiva delle zone paludose, delle rive di fiumi, laghi e stagni, e delle torbiere.</i>	<i>classe Uccelli: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Verdone			X		<i>Incolto – Agricolo frequenta campagne alberate, frutteti, boschi, campi coltivati a graminacee, parchi e giardini urbani e suburbani. predilige le zone pianeggianti</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Verzellino			X		<i>Incolto – Agricolo l'habitat di questi uccelli è rappresentato dalle aree di pianura e collina con presenza di aree boschive non eccessivamente fitte, sia decidue che sempreverdi</i>	<i>classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.</i>
Vipera comune				X	<i>Incolti - -Boschivo luoghi aridi e caldi arbusti, siepi, margini dei boschi.</i>	<i>classe Rettili: nessuna interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Bassa probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.</i>
Volpe			X		<i>Incolto – Agricolo - Antropico zone boschive e le pinete costiere, coltivi, incolti centri</i>	<i>classe Mammiferi: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area</i>

					abitati	di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante gli spostamenti locali ed erratismo.
Zigolo nero			X		<i>Incolto – Agricolo - Boschivo</i> frequenta praterie, incolti erbosi e cespugliati, coltivi, frutteti, vigneti, boschi anche molto degradati in zone collinari e montane	classe Uccelli: bassa interferenza indiretta con le azioni di progetto. Habitat di predilezione presente in AVI, ma fuori area di impianto. Probabilità di interferenze con le azioni di progetto, durante i voli per spostamenti locali ed erratismo.


Parco Eolico Fenice fase di Dismissione Impatti Indiretti Fauna		
<i>Grado di impatto</i>	<i>Specie</i>	<i>Percentuale</i>
<i>Impatto alto</i>	3	2%
<i>Impatto medio</i>	24	16%
<i>Impatto basso</i>	67	44%
<i>Impatto nullo</i>	59	38%



Parco Eolico Fenice
Stima degli impatti complessivi sulla Fauna diretti ed indiretti per tutte le fasi

Parco Eolico Fenice Fauna Legenda Impatti Complessivi	
<i>Sigla</i>	<i>Riferimento</i>
FCD A	Fase cantiere impatto diretto alto
FCD M	Fase cantiere impatto diretto medio
FCD B	Fase cantiere impatto diretto basso
FCD N	Fase cantiere impatto diretto nullo
FCI A	Fase cantiere impatto indiretto alto
FCI M	Fase cantiere impatto indiretto medio
FCI B	Fase cantiere impatto indiretto basso
FCI N	Fase cantiere impatto indiretto nullo
FED A	Fase esercizio impatto diretto alto
FED M	Fase esercizio impatto diretto medio
FED B	Fase esercizio impatto diretto basso
FED N	Fase esercizio impatto diretto nullo
FEI A	Fase esercizio impatto indiretto alto
FEI M	Fase esercizio impatto indiretto medio
FEI B	Fase esercizio impatto indiretto basso
FEI N	Fase esercizio impatto indiretto nullo
FDD A	Fase dismissione impatto diretto alto
FDD M	Fase dismissione impatto diretto medio
FDD B	Fase dismissione impatto diretto basso
FDD N	Fase dismissione impatto diretto nullo
FDI A	Fase dismissione impatto indiretto alto
FDI M	Fase dismissione impatto indiretto medio
FDI B	Fase dismissione impatto indiretto basso
FDI N	Fase dismissione impatto indiretto nullo

Parco Eolico Fenice Fauna Impatti Complessivi		
<i>Fase e Grado Di Impatto</i>	<i>N. Specie</i>	<i>Percentuale</i>
FCD A	0	0%
FCD M	22	2%
FCD B	72	8%
FCD N	59	6%
FCI A	3	2%
FCI M	24	3%
FCI B	67	7%
FCI N	59	6%
FED A	0	0%
FED M	22	2%
FED B	65	7%
FED N	66	7%
FEI A	0	0%
FEI M	1	0%
FEI B	96	10%
FEI N	56	6%
FDD A	0	0%
FDD M	22	2%
FDD B	72	8%
FDD N	59	6%
FDI A	3	2%
FDI M	24	3%
FDI B	67	7%
FDI N	59	6%



Si precisa che il grado di impatto diretto ed indiretto assegnato ad ogni singola specie nelle tre fasi, è stato calcolato in considerazione della loro presenza all'interno dell'area di cantiere e di studio, alla loro densità di popolazione, alla capacità di resilienza della specie. L'insieme della valutazione di questi elementi, ha stabilito il grado di impatto per ogni singola specie faunistica.

CONSIDERAZIONI FINALI

Al fine di valutare nel migliore dei modi il comportamento della fauna durante la fase di cantiere e la fase di esercizio del Parco Eolico, sono state prese in considerazione altri fattori che, in maniera diversa, possono essere causa di ulteriori interferenze tra la componente faunistica e le opere ed azioni di progetto. Tali fattori sono stati individuati nella Migrazione, nei Corridoi Ecologici, nella Biodiversità e negli Impatti cumulativi, generati soprattutto dalla presenza sul territorio di altri parchi eolici. **La migrazione**, come è noto, è un fenomeno che riguarda soltanto la classe degli uccelli. Due volte all'anno alcune specie di uccelli compiono un viaggio di andata e ritorno dall'Europa all'Africa. Questi spostamenti di massa interessano, di solito, brevissimi periodi di tempo, la massima concentrazione si ha in una due settimane, sia durante il passo autunnale, che durante il ripasso primaverile. Stabilire con precisione la "Rotta Migratoria" è praticamente impossibile. Per rotta migratoria si deve intendere soltanto come una direzione geografica e non una tipologia ambientale, infatti la maggior parte delle migrazioni si svolgono ad altezze considerevoli, di gran lunga superiore a quella della torre + pala del parco eolico. Le specie che sulla terra ferma migrano a bassa quota, di solito si spostano all'interno di aree naturaliformi (corridoi ecologici), i quali con la loro tipologia ambientale garantiscono la disponibilità di rifugio, la disponibilità alimentare e la sosta (stopover). L'area di progetto non risulta interessata direttamente dalla migrazione, saltuariamente è possibile osservare, in periodi molto ristretti, volare stormi di gru in transito, ad altissime quote. Inoltre l'intensa antropizzazione di tutto il territorio, l'utilizzo del suolo prevalentemente ad agricoltura intensiva, la scarsità di corridoio ecologici, riducono di molto la possibilità di migrazione a bassa quota (solitamente passeriformi).

I corridoi ecologici in genere svolgono una funzione molto importante su un territorio, garantendo la possibilità di spostamento della fauna. La teriofauna utilizza i corridoi ecologici come vere autostrade, infatti per la fauna terricola, queste aree, garantiscono gli spostamenti di prede e predatori in un ambiente naturale dove è possibile spostarsi senza essere visti, oltre a garantire un minimo di disponibilità alimentare. All'interno dell'area di progetto i corridoi ecologici naturali sono scarsissimi, di solito, questi, sono garantiti da vallate di fiumi, corsi d'acqua con vegetazione igrofila, da lembi di bosco ed incolti all'interno di aree agricole. Nell'area di progetto sono stati individuati soltanto alcuni canali a portata stagionale, quasi del tutto privi di vegetazione arborea, ed alcuni incolti


temporanei in attesa di semina. Assente, nell'area di progetto, le aree a prato pascolo permanenti. Questo ambiente riduce di molto la presenza faunistica sul territorio.

Biodiversità deriva dal greco bios che significa vita, e dal latino diversitas che significa differenza o diversità. Il termine biodiversità si è ormai consolidato e viene comunemente utilizzato nei diversi ambiti scientifici e culturali. La biodiversità può essere definita come la ricchezza di vita sulla terra: ed è rappresentata da tutte le specie animali e vegetali presenti sul pianeta. Milioni di piante, animali e microrganismi, i geni che essi contengono, costituiscono la Biosfera. Questa varietà non si riferisce solo alla forma e alla struttura degli esseri viventi, ma include anche la diversità intesa come abbondanza, distribuzione e interazione tra le diverse componenti del sistema. In altre parole, all'interno degli ecosistemi convivono ed interagiscono fra loro sia gli esseri viventi sia le componenti fisiche ed inorganiche, influenzandosi reciprocamente. La biodiversità, quindi, esprime il numero, la varietà e la variabilità degli organismi viventi (di ogni specie), e come questi varino da un ambiente ad un altro nel corso del tempo. La diversità di specie comprende la ricchezza delle stesse, in termini di numero delle stesse specie presenti in una determinata zona, o di frequenza delle specie, cioè la loro rarità o abbondanza su un territorio o in un habitat.


La diversità biologica o biodiversità, in ecologia, è la varietà di organismi viventi nelle loro diverse forme, e nei rispettivi ecosistemi. Rappresenta quindi la base e il potenziale di tutti i processi vitali e i servizi degli ecosistemi sul nostro pianeta. Il livello di biodiversità accertato dopo la realizzazione della maggior parte dei parchi eolici non appare molto dissimile da quanto verificato prima della introduzione nel territorio di dette realizzazioni. Naturalmente, parlare di biodiversità ha un significato se si parla in ambito di grande scala in quanto variazioni locali, anche consistenti, ma su scala molto ridotta hanno poca influenza sulle dinamiche delle popolazioni. La biodiversità presa in considerazione è quella dell'area vasta o di studio; tenendo presente che comunque le interazioni fra i vari fattori dell'ambiente si esplicano in un raggio molto più vasto, coincidente con quello dell'intero territorio della Provincia di Foggia e Province limitrofe.

La biodiversità presa in esame dal presente studio, considera le famiglie e le specie floro-faunistiche riscontrate all'interno dell'area di studio e quelle potenzialmente presenti.

Parco Eolico Fenice Biodiversità Famiglie flora-fauna censita		
	<i>Numero Famiglie</i>	<i>Percentuale</i>
Famiglie Floristiche	81	55%
Famiglie Faunistiche	67	45%
Totale 148		



Parco Eolico Fenice Biodiversità Specie flora-fauna censita		
	<i>Numero Specie</i>	<i>Percentuale</i>
Specie Floristiche	303	66%
Specie Faunistiche	153	34%
Totale 456		



La biodiversità riscontrata tra le componenti flora potenziale e fauna potenziale all'interno dell'area di studio, comprende 148 famiglie, di cui il 55% famiglie floristiche ed il 45% famiglie faunistiche. Mentre le specie floro-faunistiche complessive sono 456 di cui il 66% specie floristiche ed il 34% specie faunistiche. L'interferenza tra opere di progetto e biodiversità è stata riportata singolarmente nei capitoli riferiti alla vegetazione e flora e fauna.

Gli impatti cumulativi si generano sommando le interferenze che provocano le infrastrutture antropiche presenti nella stessa area. Sul territorio esistono già delle torri eoliche ed altre stanno per essere installate. In ogni caso, come già rimarcato più volte, l'area di studio è fortemente antropizzata, la fauna presente è abituata a vivere a stretto contatto con l'uomo e tutte le sue attività e strutture. L'aumento di torri eoliche all'interno di un'area dove sono presenti da tempo, genera soltanto disturbo in fase di cantiere. Inoltre, la distanza interposta tra una torre e l'altra, e la distanza tra un parco eolico e l'altro non generano l'effetto barriera perché gli spazi, interposti tra una torre e un'altra, sono sufficienti ad assicurare nessuna interferenza tra le tipologie ed azioni di progetto e la

componente faunistica in transito. Inoltre l'aumento di sottrazione di habitat agricolo, non incide su specie faunistiche rare o di pregio.

RIEPILOGO DELLA STIMA DEGLI IMPATTI

- **Ecosistema** - Le macchie ecosistemiche di maggiore valore naturalistico, non vengono interessate direttamente dalla realizzazione del parco eolico, l'unico ecosistema interessato direttamente dalla realizzazione del parco eolico, è quello agricolo (seminativo) attraverso la sottrazione e frammentazione dell'habitat, quello con il più basso valore ambientale.
- **Habitat** - Gli impatti stimati per gli habitat presenti all'interno dell'area di studio, riguardano quasi esclusivamente gli impatti diretti arrecati all'habitat seminativi e colture arboree ed arbustive, attraverso la sottrazione e frammentazione dell'habitat (soltanto seminativi). Nessun habitat prioritario o di pregio è coinvolto direttamente con le opere di progetto.
- **Flora** - All'interno dell'Area di progetto non sono state rilevate specie floristiche rare o di pregio. L'interferenza diretta tra opere di progetto e flora rara o di pregio risulta praticamente nulla, anche in relazione al fatto che gli interventi per la realizzazione ed il funzionamento del parco eolico, avvengono tutti in area agricola, dove la presenza di flora rara o di pregio, è quasi del tutto assente. All'interno dell'area di studio, fuori dall'area di progetto, su 303 specie floristiche potenzialmente presenti, soltanto 13 pari al 4% sono tutelate da normative. Inoltre tutte e 13 prediligono habitat al di fuori dell'area di progetto.
- **Fauna**
- Anfibi: *nessun impatto significativo sulle specie individuate all'interno dell'area di impianto. habitat di predilezione presente all'interno dell'AVI, ma fuori dall'area di impianto. Lieve disturbo durante la fase di cantiere e dismissione per il rospo comune e quello smeraldino durante i loro trasferimenti da un'area umida all'altra (avvengono quasi sempre di notte). Nessun impatto durante la fase di esercizio.*
- Rettili: *disturbo diretto durante la fase di cantiere e dismissione causati dai movimenti di terra necessari per l'impianto delle turbine ed opere accessorie. Probabile distruzione di qualche sito di riproduzione. Tutte le specie presenti sono comuni con popolazioni abbondanti). Nessun impatto durante la fase di esercizio.*
- Mammiferi: *disturbo lieve durante i lavori di posa in opera delle turbine generato dai mezzi meccanici in movimento. Probabile distruzione di qualche tana di*

micromammifero. Si precisa che la quasi totalità dei mammiferi riscontrati in area di studio ha abitudini notturne che non coincidono con le ore utilizzate per l'esecuzione dei lavori. Questo riduce di molto la possibilità di interferenza diretta tra mammiferi e azioni di progetto.). Nessun impatto durante la fase di esercizio.

- *Uccelli: basso impatto diretto in fase di cantiere e dismissione su alcune specie avifaunistiche, quelle più comuni e stanziali, quelle presenti all'interno dell'area di impianto durante l'intero arco dell'anno. Minimo rischio di collisione in fase di esercizio per alcune specie di rapaci e di veleggiatori, la maggior parte delle specie avifaunistiche, volano al di sotto dell'altezza di rotazione delle pale.*

Status Fauna - Presenza:

- *comune 32% pari a n. 50 specie;*
- *frequente 34% pari a 52 specie;*
- *rara 30% pari a 46 specie;*
- *accidentale 4% pari a 6specie.*

La presenza maggiore pari al 34% è data dalle specie che di solito, anche con pochi individui frequenta l'area di studio. La maggior parte di esse sono quelle dette sinantropiche, cioè abituate alla presenza dell'uomo e delle sue attività.

Status Fauna - Fenologia:

- *migratore regolare 41% pari a 64 specie;*
- *migratore parziale 17% pari a 26 specie;*
- *stanziale 42% pari a 66 specie.*

Il 41% della fauna presa in considerazione è migratore regolare, cioè risiede sul territorio per alcuni periodi dell'anno, sia primaverili che invernali. Di conseguenza la parziale presenza annuale sul territorio, riduce di molto le probabilità di interferenza con le opere di progetto.

Status Fauna – Habitat :

- *Vegetazione igrofila-palustre 21% pari a 65 specie;*
- *Vegetazione spontanea arborea-arbustiva-erbacea 36% pari a 109 specie;*
- *Seminativi e colture arboree 25% pari a 78 specie;*

- *Edificato urbano-rurale 7% pari a 21 specie;*
- *Aree boscate e macchia mediterranea 11% pari a 33 specie.*

Il 36% della fauna predilige l'habitat con vegetazione spontanea arborea-arbustiva-erbacea fuori dall'area di progetto, il 25% della fauna utilizza l'habitat seminativi e colture arboree costituente anche l'area di progetto, il 21%, l'habitat vegetazione igrofila-palustre fuori dall'area di progetto, il 11% l'habitat Aree boscate e macchia mediterranea, fuori dall'area di progetto, il 7% l'habitat edificato urbano rurale. Si precisa comunque che del 25% di area agricola, una percentuale è destinata a colture arboree ed arbustive, di conseguenza le specie che utilizzano stabilmente i seminativi (area di progetto) si riducono di molto.

CONCLUSIONI

A seguito dello sviluppo di tutti i dati raccolti sul campo, e da ricerche bibliografiche riguardanti gli ecosistemi, gli habitat, la flora e la fauna del territorio oggetto di studio, si stima che, in generale la realizzazione del parco eolico denominato “Fenice”, non comporterà cambiamenti significativi sugli equilibri, rapporti ed interazioni, stabiliti ormai da tempo, tra ecosistemi-flora-fauna presenti sul territorio. Alcune interferenze dirette coinvolgeranno l’ecosistema agricolo ed alcune specie faunistiche comuni e di poco valore naturalistico durante la fase di cantiere e di dismissione. Durante la fase di esercizio le interferenze dirette ed indirette sugli ecosistemi, habitat, vegetazione e flora si limiteranno di molto, risulteranno praticamente nulle. Si stima una bassa probabilità di rischio di interferenza con alcune specie avifaunistiche, durante il volo per la ricerca e l’inseguimento della preda. Si precisa comunque che soprattutto i rapaci sono dotati di una vista straordinaria, in grado di scorgere una piccola preda a centinaia di metri di distanza, e capace di evitare tutti gli ostacoli che, a prescindere dalle strutture del parco eolico, già insistono sul territorio.

La maggior parte dell’avifauna rimanente, vola solitamente al di sotto dell’altezza di rotazione delle pale. I passeriformi, per spostarsi utilizzano di solito filari di vegetazione presenti all’interno dell’area di progetto. Le specie di chirotteri rinvenute all’interno dell’area di studio hanno siti di nidificazione in casolari abbandonati, oppure cavità di alberi, tutti ad altezza minima da terra, molto lontano dall’altezza minima di rotazione della pala, inoltre durante ricerca e cattura del cibo, gli insetti, volano sempre a quota più bassa rispetto alle pale. Prima di trarre le dovute conclusioni, è opportuno considerare la tendenza evolutiva dell’Area Vasta interessata dal progetto, senza la realizzazione del Parco Eolico. L’Area di Progetto ricade su un territorio da tempo fortemente antropizzato; al suo interno insistono insediamenti urbani, rurali e una fitta rete viaria (strade provinciali, comunali ed interpoderali) infrastrutture industriali/artigianali. L’agricoltura è praticata in maniera intensiva con massiccio utilizzo di macchinari agricoli e prodotti chimici. Le aree naturaliformi, all’interno dell’area di progetto, sono quasi completamente assenti. Questi fattori reali, insieme alla presenza costante degli uomini, determinano una scarsa valenza ecologica dell’intera area oggetto di studio. Si può affermare quindi, che in base ai dati raccolti, ed in considerazione delle dinamiche evolutive del territorio, l’area in esame, anche senza l’intervento, non risentirà di nessun miglioramento ambientale spontaneo, e comunque in ogni caso l’area non si evolverà spontaneamente verso una migliore qualità

dell'ambiente. Per quanto riguarda la tendenza futura, con la realizzazione dell'opera, si potranno prevedere interventi di compensazione naturalistica e di riqualificazione ambientale che in parte ristabiliranno, attraverso ricuciture, rinfoltimenti e piantumazioni di vegetazione spontanea, la base sulla quale impostare nuovi rapporti ecologici tra vegetazione e fauna e territorio. La presenza della nuova infrastruttura all'interno dell'area di studio non comporterà nessuna alterazione per gli equilibri floro-faunistici presenti, mentre con la realizzazione degli interventi di compensazione (riqualificazione di alcune aree fortemente degradate e realizzazione di corridoi ecologici) si potrebbe avere un aumento della naturalità per alcune zone, all'interno dell'area di studio.

Bibliografia

- AMORI G., ANGELICI F.M., FRUGIS S., GANDOLFI G., GROPALI R., LANZA B., RELINI G. E VICINI IL. 1993. Vertebrata. In Minelli A., Ruffo S. e La Posta S. (eds): Check-list delle specie della fauna d'Italia. Ed. Calderini, n. 110, 83 pp.
- Bertel Bruun UCCELLI D'EUROPA, disegni di Arthur Singer – Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano 1977
- BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 – *Birds in Europe: populations estimates, trends and conservation status*. BirdLife International (BirdLife Conservation Series n.12). Cambridge, UK, pp. 374.
- Blasi C., 1996 - *Il fitoclima d'Italia*. Giorn. Bot. Ital. vol. 130, 1, 1996: 166-176.
- Braun-Blanquet J., 1964 - *Pflanzensoziologie*. Springer, Wien.
- BRICHETTI P. Carta delle Vocazioni Faunistiche, Descrizione e Stato delle Specie di Particolare Interesse Faunistico e Venatorio: Uccelli. Regione Puglia, Ass.to Cultura, Tempo Libero, Caccia. I.N.B.S. Ozzano dell'Emilia Bologna
- BRICHETTI P. E MASSA B. 1997. Check-list degli uccelli italiani aggiornata al dicembre 1995. In Brichetti P. e Gariboldi A. (eds): Manuale pratico di ornitologia. Edagricole, 238-258.
- BULGARINI F., CALVARIO E., FRATICELLI F., PETRETTI F. E SARROCCO S., 1998 - *Libro Rosso degli animali d'Italia. Vertebrati*. 210 pp.; WWF Italia, Roma.

- CALVARIO E. E SARROCCO S. (eds) 1997. Lista Rossa dei Vertebrati italiani. WWF Italia. Settore Diversità Biologica. Serie Ecosistema Italia. DB6.
- CALVARIO E., GUSTIN M., SARROCCO S., ed altri, 1999. Nuova Lista Rossa degli Uccelli Nidificanti in Italia. Rivista italiana Ornitologica, 69 (1): 3-43.
- CERFOLLI F., PETRASSI F., PETRETTI F. (EDS), 2002 – *Libro rosso degli Animali d'Italia. Invertebrati*. WWF Italia – ONLUS, Roma.
- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, 1981. Distribuzione e biologia di 22 Specie di Mammiferi in Italia. Corpo Forestale dello Stato e delle Regioni Autonome Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia
- Francesco Mezzatesta RAPACI Guida ai rapaci diurni d'Europa– Edagricole Bologna 1 edizione 1984
- GALLETTA B., GANDOLFO M. A., PAZIENTI M., PIERI BUTI G., Dal Progetto alla VIA. Guida e manuale per gli studi di impatto ambientale di opere edilizie, Pantarch Consulting. ISTAT, (1996), "Statistiche ambientali" Arti grafiche Rubettino, Soveria Manelli;
- Gianfranco Bologna IL MONDO DEGLI UCCELLI– Arnoldo Mondadori editore – Officine Grafiche di Verona ottobre 1976
- GIANFRANCO PIRONI - *La valutazione di incidenza – Zone e piani di vegetazione nell'Italia Centrale (Flora, vegetazione e Paesaggio vegetale) mitigazione e compensazione degli impatti sulle componenti geobotaniche* – Seminario 24-24-26 marzo 2004, Regione Abruzzo. L'Aquila).
- Giovanni Boano GLI UCCELLI RAPACI Guide a tutte le specie italiane Istituto Geografico De Agostini S.p.A., IGDA Officine Grafiche, Novara 1987
- GLI UCCELLI I protagonisti della natura Alberto Peruzzo Editore, Milano Marzo 1966
- GROPPALI R., FANFANI A. E PAVAN M. 1983. Aspetti della copertura forestale, della flora e della fauna nel paesaggio naturalistico dell'Italia meridionale e insulare. Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Collana Verde 65, 309 pp.
- Jean Dorst LE MIGRAZIONI DEGLI UCCELLI– Editoriale Olimpia – seconda edizione – Città di Castello (Perugia) 1976

- LA VITA DEGLI ANIMALI E IL LORO MONDO Dagli anfibi agli uccelli Oscar Mondadori Editore, Ottobre 197
- LAMBERTINI M., GUSTIN M., FAVALLI U., TALLONE G. 1989. IBA – ITALIA. Aree di importanza europea per gli uccelli selvatici in Italia. LIPU, 263 pp.
- Leste I. Short UCCELLI Guide tascabili Mondadori – Arnoldo Mondadori Editore, Verona settembre 1975
- LUIGI BRUZZI, Valutazione di irnpatto ambientale. Guida agli aspetti procedurali, normativi, tecnici. Maggioli Editore, 2000.
- Luigi Cagnolaro – Aldo Martello UCCELLI D'ITALIA I miracoli della natura– Giunti Editore S.p.A. Venezia 1975
- MARCHIORI S. ET AL. - “Piante ed habitat rari, a rischio e vulnerabili della Puglia” - Dipartimento di Biologia Università di Lecce.
- Mario Chiavetta I RAPACI D'ITALIA E D'EUROPA– prefazione di Sergio Frugis – Rizzoli editore Milano Febbraio 1981
- MESCHINI E. E FRUGIS S. (eds) 1993. Atlante degli uccelli nidificanti in Italia. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XX: 1-344.
- MINISTERO DELL'AMBIENTE – Progetto BioItaly
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Repertorio della Flora Italiana Protetta - http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1467.
- MINISTERO DELL'AMBIENTE, 2000 (ined.) – Database Natura 2000. Direzione per la Conservazione della Natura.
- MINISTERO DELL'AMBIENTE, 2000 (ined.) – Database Natura 2000. Direzione per la Conservazione della Natura. Serie Atti e Studi, 5, Roma: 88-89.
- MONTEMAGGIORI A., OTTAVIANI D., REGGIANI G., RONDININI C., 2002. Rete Ecologica Nazionale. Un approccio alla conservazione dei vertebrati Italiani. Universita di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo; Ministero dell'Ambiente, Direzione per la Conservazione della Natura; Istituto di Ecologia Applicata. <http://www.gisbau.uniroma1.it/REN>.
- Neil Ardley CONOSCERE GLI UCCELLI– Euroclub Italia S.p.A., Lainate (MI) Giugno 1980

- Neil Ardley- GUIDA ILLUSTRATA DEGLI UCCELLI E IL BIRDWATCHING traduzione di Franca Zanichelli – Vallardi Industrie Grafiche S.p.A. Aprile 1984
- PIGNATTI S., 2003 – Flora d'Italia. Ed agricole.
- POZIO E. E FRISENDA S., 1980 Gli Anfibi e i Rettili della Regione Puglia. pp 233-257. In: Scalera Liaci L. (curatrice). Atti del VII Simposio Nazionale sulla Conservazione della Natura. Cacucci, Bari
- R. F. Porter I. Willis S. Christensen B. P. Nielsen – GUIDA ALL'IDENTIFICAZIONE DEI RAPACI EUROPEI IN VOLO Zanichelli editore Bologna 1985
- Roger Peterson GUIDA DEGLI UCCELLI D'EUROPA Atlante illustrato a colori– Guy Mountfort – P.A.D. Hollom , Franco Muzio & C. editore Padova 1983
- SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA 1996. Atlante degli Anfibi e dei Rettili italiani. Annali Museo Civico Storia Naturale G. Doria, Genova, 91:95-178.
- SPAGNESI M., ZAMBOTTI L., 2001. Raccolta delle norme nazionali e internazionali per la conservazione della fauna selvatica e degli habitat. Servizio conservazione della natura, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica "Alessandro Ghigi", Quaderni di conservazione della natura. Tipolitografia FG Savignano sul Panaro, Modena.
- Tomaselli R., Balduzzi A., Filipello S. M., 1973 – *Carta bioclimatica d'Italia*. Collana Verde 33:56-60, Ministero Agricoltura e Foreste, Roma.
- TROCCHI V. E METERANGELO V., Carta delle Vocazioni Faunistiche. Analisi degli Istituti per la Gestione Faunistico Venatoria e Propose: Provincia di Foggia. Regione Puglia Ass.to Cultura, Tempo Libero, Caccia. I.N.B.S. Ozzano dell'Emilia Bologna
- Archivio Bioitaly. Sito Internet www.regione.puglia.it
- AA.VV. Sito internet :
www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/natura_2000/valutazione_incidenza.asp
- COMMISSIONE EUROPEA, (2000). *La Gestione dei siti della rete Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE*. Commissione Europea, Brussels, 69 pp.

- CONTI F., MANZI A., PEDROTTI F., 1992 – *Libro Rosso delle piante d'Italia*. WWF Italia. Roma.
- CONTI F., MANZI A., PEDROTTI F., 1997 – *Liste Rosse Regionali delle piante d'Italia*. W.W.F., S.B.I. Camerino.
- FENAROLI L., 1974 – *Catalogus Taxonomicus Florae Garganicae*. Atti Ist. Bot. Univ. Pavia, serie 6, vol. VIII: 27-176..
- PANTALEO F., 1991 – *La foce di S. Andrea e i canali adiacenti (Lago di Lesina Puglia): studio floristico*. Ann. Bot. Vol. XIIIX, anno, Suppl. 8: 123-125
- PIGNATTI S., 1982 – *Flora d'Italia*. Voll. 1-3 Edagricole, Bologna.
- RUSSO G. & M. FIORENTINO, 2002. – *Piante rare e minacciate del Parco Nazionale del Gargano*. Edizioni del Parco. Monte Sant'Angelo (FG).
- Webgrafia
- Banca dati Società

Per la verifica del livello di protezione delle specie rilevate si è fatto riferimento al "Repertorio della Flora Italiana Protette" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) (<http://www.minambiente.it>).