


- LEGENDA - (Parte C)**  
**INDAGINI GEONOSTICHE PREGRESSE**
- Sondaggi geonostici
  - Linee di sismica a rifrazione
- INDAGINI GEONOSTICHE PROGETTO ESECUTIVO**
- Sondaggi geonostici
  - Sondaggi geonostici orizzontali
  - Linee di sismica tomografica a rifrazione
  - Linee di geoelettrica tomografica
  - Linee di georadar
  - Indagine sismica MASW
  - Pozzetti geonostici esplorativi

- LEGENDA - (Parte B)**  
**ELEMENTI MORFOLOGICI PRINCIPALI**
- Conoidi alluvionali
  - Cono di detrito
  - Nicchia di distacco principale
  - Orlo di scarpata di frana
  - Aree in frana attive
  - Aree in frana quiescenti
  - Aree con indizi di movimento
  - Scavo antropico connesso ad un'attività di cava
  - Gabbionate
  - Soglie e briglie fluviali



- LEGENDA - (Parte A)**  
**DEPOSITI DETRITICI QUATERNARI (Piacene - Olocene)**
- Ripari e terrapieni di origine antropica (R). Depositi ghiaioso-sabbiosi ben classificati e compattati artificialmente (terrapeni), oppure accumuli eterometrici non addensati e non classificati (ripari) (Olocene).
  - Coltri eluvio-colluviali (Ec). Depositi aerati, poco compattati e cementati, a struttura matrix-supported con matrice fine prevalentemente sabbioso-siltosa e ciottoli di piccole dimensioni (Olocene).
  - Breccia di versante (Bv). Depositi a struttura clast-supported e talora matrix-supported, con stratificazione grossolana parallela al pendio. Presenza di clasti eterometrici, angolosi e poco sferici, frammati a ghiaia, mentre la matrice fine è generalmente costituita da sabbia e silt. Grado di cementazione del deposito variabile (Olocene).
  - Detrito di falda (Df). Deposito caratterizzato da struttura open-work e clast-supported, costituito da blocchi e ciottoli angolosi, eterometrici e non sferici, immersi in una matrice sabbioso-siltosa subordinata rispetto alla frazione grossolana (Olocene).
  - Detrito di falda cementato (Dfc). Deposito di caratteristiche analoghe al precedente, nel quale le porzioni cementate presentano un addensamento e un quantitativo di matrice fine sabbioso-siltosa maggiori rispetto alle porzioni non cementate (Olocene).
  - Accumulo di frana (F). Accumulo caotico a struttura sia clast-supported che matrix supported, generalmente privo di stratificazione. Il deposito è costituito da blocchi e ciottoli angolosi, eterometrici e non sferici immersi in una matrice sabbioso-siltosa presente in proporzioni variabili (Olocene).
  - Alluvioni di fondovalle recenti e attuali (ALr). Depositi non cementati e scarsamente addensati, costituiti da ghiaie e ciottoli eterometrici ad arrotondamento e sfericità differenziali, immersi in matrice fine prevalentemente sabbioso-siltosa. La struttura del deposito è variabile da matrix a clast supported e la stratificazione si presenta da grossolana a ben evidente (Olocene).
  - Alluvioni antiche terrazzate (ALA). Depositi a prevalentemente componente ghiaiosa, non cementati o debolmente cementati, localmente addensati e costituiti essenzialmente da ghiaie e ciottoli arrotondati immersi in matrice sabbioso-siltosa a vario grado di alterazione. La struttura del deposito è variabile da matrix a clast-supported, mentre la stratificazione non è sempre evidente (Pleistocene-Olocene).
  - Depositi fluvio-lacustri (FL). Alternanze di ghiaie, sabbie, silti argillosi e argille siltose. Il deposito presenta struttura variabile da clast a matrix supported, stratificazione discontinua e talvolta sottili livelli torbosi (Pleistocene inf.-medio).
  - Depositi fluvio-lacustri del Mercurio (FLM). Depositi conglomeratici di origine fluviale intercalati da livelli fini lacustri. I conglomerati sono costituiti da ciottoli eterometrici e poligenici scarsamente arrotondati, da frequenti ghiaie e da matrice fine prevalentemente sabbiosa. Il deposito si presenta scarsamente cementato ed è caratterizzato da struttura clast-supported e stratificazione grossolana. Le porzioni fini sono costituite da sabbie siltose debolmente argillose a struttura matrix supported e stratificazione evidente materializzata da lamine piano parallele. (Pleistocene inf.-medio).
- SUBSTRATO ROCCIOSO PRE-QUATERNARIO (Triassico - Miocene inf.)**
- Unità ofiolitiche**
- Unità di Diamante-Terranova (DT). Unità costituita da argilloscisti, fillati di colore da grigiastro a verdastro con intercalazioni quarziche e calcescisti. (Giurassico sup. - Cretaceo inf.)
  - Unità Lungro-Verbarico
  - Scioli del Fiume Lao (SL). Argilliti e argilloscisti di colore da grigiastro a verdognolo caratterizzati da intercalazioni centimetriche di quarziti. In alcune porzioni sono state inoltre osservate frequenti intercalazioni centimetriche di arenarie prive di componente carbonatica (Burdigalliano).
  - Flysch argillifici (Fy). Alternanze di argilliti e argilliti-marmose di colore da giallo ocra a verde olivastro, intercalate a sottili livelli centimetrico-decimetriche di calcareniti e arenarie. (Miocene inf.)
  - Formazione di Colle Trodo (Tr). Calcareniti e breccie calcaree di colore da grigio a blu scuro, alternate ad argille siltose, calcari marnosi e marne-argillose varicolori. (Eocene medio - Aquitaniano).
  - Breccie calcaree e calcari (BC). Calcari microcristallini compatti di colore grigio intercalati da breccie carbonatiche di origine sedimentaria e livelli conglomeratici a ciottoli carbonatici. I clasti/ciottoli presentano dimensioni centimetrico-decimetriche e sono immersi in una matrice micritica. (Maastrichtiano - Patagonico).
  - Formazione di Serra Bonangelo e di Orsilia (BG). Formazioni indistinguibili sul terreno costituite da calcari micritici di colore grigio scuro o nero, calcari straterati caratterizzati da intercalazioni di mame rossa e ghiaie e calcari dolomitici di colore grigio chiaro, compatti e stratificati. All'interno dei calcari dolomitici è stata osservata la presenza di selce grigio-scuro. (Norico sup. - Retico/Hettangiano - Lus/Dogger).
  - Limburgini (Lm). Metabasalti porfiriti completamente alterati caratterizzati da massa di fondo di colore giallo ocra facilmente sfaldabile, al cui interno sono visibili dei fantasmi di fenocristalli di dimensioni millimetriche. Le porzioni meno alterate evidenziano un ammasso di colore verde scuro caratterizzato da massa di fondo da vetrosa a microcristallina e fenocristalli di dimensioni millimetriche. (Ea incerta).
  - Dolomie (D). Dolomie di colore grigio chiaro/scuro o nere, a grana medio fine e talora tessitura saccarodea. Talvolta sono presenti dei livelli di doloranti di colore nerastro costituite da arenarie medio-fini di dolomia. L'ammasso è caratterizzato da una stratificazione metrica/purimetrica grossolana e poco evidente alla mesoscala, nonché da un elevato ed eterogeneo grado di fratturazione. (Norico).
- Unità Pollino-Ciaglia**
- Calcari grigio-chiaro (Cg). Calcari e dolomie ben stratificati, conglomerati calcarei e calcareniti. L'ammasso si presenta generalmente di colore grigio chiaro e molto compatto. (Giurassico).

- ELEMENTI GEOLOGICI E STRUTTURALI**
- Limiti geologici
  - Giacitura delle superfici di stratificazione/scistosità e relativo valore di inclinazione
  - Giacitura delle superfici di faglia e relativo valore di inclinazione
  - Giacitura delle superfici di scistosità e relativo valore di inclinazione
  - Giacitura del piano assiale delle pieghe e relativo valore di inclinazione
  - Giacitura degli assi di piega e relativo valore di inclinazione
  - Stazioni geomecamiche eseguite
  - Tracce di faglie certe
  - Tracce di faglie presunte
  - Superfici di sovrascorrimento certe (thrust)
  - Superfici di sovrascorrimento presunte (thrust)
  - Tracce sezioni geologiche

**Anas SpA**  
 Direzione Centrale Progettazione

ASR 18/07  
 AUTOSTRADA A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA  
 LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 10 DELLE NORME CNR/BO  
 Dal km 153+400 al km 173+900  
 MACROLOTTO 3 - PARTE 2<sup>a</sup>

**PROGETTO ESECUTIVO**

CONTRAENTE GENERALE		IL RESPONSABILE DEL CONTRAENTE GENERALE	
<b>ital SARC</b>			
GRUPPO DI PROGETTAZIONE		I RESPONSABILI DI PROGETTO	
IRIP: TENDITAL S.p.A. (mandataria) JTI PROGETTI ITALIA S.p.A. PROMTEENGINEERING.IT S.r.l. STUDIO NELLE ASSOCIATI S.r.l. SOL S.r.l. SITECO S.r.l.		Dott. Ing. M. Roccaforte Ordine Ing. Verona n° A1665 Dott. Ing. S. Possoli Ordine Ing. Roma n° 20809 Dott. Ing. A. Foccaracci Ordine Ing. Roma n° 28894	
INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE		IL RESPONSABILE AMBIENTALE	
IL GEOLOGO Dott. Geol. Vittoria Federici Ordine Geol. Lazio n° 284 IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Giovanni Maria Casparati Ordine Ing. Veneto n° 392		Dott. Massimiliano Bechini Ordine Ing. Milano n° 14725 VISTO: ANAS S.p.A. - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. A. Frascari Ordine Ing. Bologna n° 7115/A	
<b>STUDI ED INDAGINI GEOLOGIA</b>			
CARTA GEOLOGICA DI DETTAGLIO			
Tav. 7/16			
CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
LO411B E 1301	T00-GE02-GE0-CG07_A.dwg	A	1:2000
D			
C			
B			
A	EMMISSIONE	15/01/2014	ALESSIO FEDERICO POSSATI
REV.	DESCRIZIONE	DATA REDATTO	VERIFICATO APPROVATO