



Distribuzione delle comunità dominanti



Lunghezza costa (m)	Tipo di costa	Inclinazione	Popolamento dominante	SL	EQR	Qualità Ecologica
155	falesia alta naturale	verticale	fotofilo	10	0.10	buona
95	falesia alta naturale	orizzontale	<i>E. amentacea</i> 2	12	0.78	elevata
220	falesia alta naturale	orizzontale	<i>E. amentacea</i> 3	15	0.98	elevata
60	falesia alta naturale	orizzontale	<i>E. amentacea</i> 4	19	1.24	elevata
10	falesia alta naturale	verticale	<i>L. byssoides</i>	20	1.31	elevata
110	scogliera bassa naturale	verticale	fotofilo	10	0.60	sufficiente
70	scogliera bassa naturale	orizzontale	<i>E. amentacea</i> 1+ fotofilo	12	0.72	buona
10	struttura alta artificiale	verticale	Corallinales incrostanti	6	0.75	buona
270	struttura bassa artificiale	verticale	Corallinales incrostanti	6	0.50	sufficiente
Qualità ecologica complessiva					0.74	buona

Fasi di valutazione



Ericaria amentacea (C.Agardh)
Molinari & Guiry.



Lithophyllum byssoides (Lamarck) Foslie



Tavola 2 - Metodo CARLIT per Habitat 1170



Report attività integrative "Biodiversità"
Restauration of health and safety conditions to operate the station – Stazione VLF – Isola di Tavolara (SS)

Sezione del Genio Militare per la Marina di Cagliari

