


LEGENDA

- Depositi detritici (a6)  
Depositi originati da movimenti di natura gravitativa con accumuli eterogenei ed eterometrici di clasti arenacei mediamente da centimetrici fino a metrici, immersi in matrice ghiaioso-sabbiosa e argillosa, a luoghi addensati e privi di matrice. Olocene
- Depositi glaciali e periglaciali (c3)  
Depositi costituiti da accumuli detritici deposti per azione glaciale. Eteroclassati ed a struttura coatica con clasti inglobati in marce limoso-sabbiosa o sabbioso-limoso. Localmente sono presenti massi erratici. Pleistocene medio e superiore.
- Formazione del Macigno (MAC)  
Torbidi arenacei e arenaceo-pelitici, quarzoso feldspatiche, micacee, in strati mediamente decimetrici intervallati da livelli metrici. Gli intervalli pelitici risultano spesso laminati e sono costituiti da siltiti, argilliti ed argille siltose. Oligocene superiore - Miocene inferiore.
- Giaciture stratificazione
- Rilevamento geomeccanico da affioramento (2012)
- Rilevamento su affioramento puntuale
- Stazione di rilevazione dati RMR
- Stendimento lungo l'ammasso roccioso

RIFERIMENTI

- C732-D106 - GEOLOGIA - PROFILI DI MONTE E DI VALLE
- C732-D107 - GEOTECNICA - PROFILI DI MONTE E DI VALLE
- C732-D108 - GEOTECNICA - SEZIONI TRASVERSALI

SCALA 1/1000



|     |                 |           |             |           |               |
|-----|-----------------|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 0   | PRIMA EMISSIONE | PCI       | FOL         | GLU       | 22 APR 28     |
| REV | DESCRIZIONE     | DISegnATO | REVISIONATO | APPROVATO | YY mm DD DATA |

C732-D105



IMPIANTO IDROELETTRICO DI RIGOSO  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 RECUPERO DELLA DIGA DI LAGO BALLANO  
**GEOLOGIA**  
 PLANIMETRIA

