

APPENDICE C
ELENCO FLORISTICO

ELENCO FLORISTICO

Nella presente Appendice si riporta l'elenco delle principali specie riconosciute al momento dell'indagine (Marzo 2007). L'elenco è da considerare necessariamente incompleto ma comunque rappresentativo della composizione floristica dell'area.

Per ogni specie determinata sono state indicate le seguenti voci ricavate da PIGNATTI, 2002:

- **Nome scientifico**
- **Nome comune**
- **Forma biologica:** sintetizza l'informazione relativa al portamento della pianta ed agli adattamenti di cui questa dispone per superare la stagione avversa e costituisce un sistema molto comodo per evidenziare le relazioni fra clima e flora. Le forme biologiche sono stabilite in base alla posizione delle gemme rispetto al suolo, carattere cui è attribuito un ruolo adattativi.
- **Tipo corologico:** i tipi corologici o corotipi o geo-elementi si riferiscono alla distribuzione delle piante nel mondo.
- **Habitat**
- **Indice di rarità** (C = comune; R = raro; RR = rarissimo) riferito alla Regione Puglia
- **Note:** annotazioni sull'interesse conservazionistico o su eventuali riferimenti normativi di protezione.

Elenco delle principali specie floristiche riconosciute al momento del rilievo (Rilievo Bioprogramm 2007)

| Nome scientifico | Nome comune | Forma biologica | Corotipo | Ambiente | Rarità | Note |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|---|--------|------|
| <i>Pinus halepensis</i> | Pino d'Aleppo | P scap | Steno-Medit | Pinete e garighe, soprattutto costiere | C | |
| <i>Quercus calliprinos</i> | Quercia di palestina | P scap - P scap | Steno-Medit-Orient | Pascoli aridi, macchie | R | |
| <i>Ficus carica</i> | Fico comune | P scap | Medit-Turan | Rupi ombrose, muri | C | |
| <i>Osyris alba</i> | Ginestrella comune | NP | Euri-Medit | Macchia mediterranea | C | |
| <i>Beta vulgaris subsp. maritima</i> | Bietola comune | H scap/T scap | Euri-Medit. | Spontanea sulle coste e comunem. Coltivata | C | |
| <i>Anemone hortensis</i> | Anemone fior-stella | G bulb | N-Medit | Prati aridi. Cedui | C | |
| <i>Papaver rhoeas</i> | Papavero comune | T scap | E-Medit | Sinantropica ruderale | C | |
| <i>Eruca sativa</i> | Rucola comune | T scap | Medit.-Turan | Ruderi, orti | C | |
| <i>Reseda lutea</i> | Reseda comune | H scap (T scap) | Europ. | Incolti, ruderi, greti, massicciate | C | |
| <i>Psolarea bituminosa</i> | Trifoglio bituminoso | H scap | Euri-Medit | Pascoli, aridi, incolti, siepi | C | |
| <i>Lathyrus ochrus</i> | Cicerchia pisellina | T scap | Steno-Medit | Incolti, campi | C | |
| <i>Medicago lupulina</i> | Erba medica | T scap (H scap) | Paleotemp. | Ambienti ruderali, anche calpestati, incolti aridi | C | |
| <i>Lotus edulis</i> | Ginestrino commestibile | T scap | Steno-Medit. | Incolti aridi, spiagge, vigne | C | |
| <i>Oxalis pes-caprae</i> | Acetosella gialla | G bulb | Sud-Afr. | Incolti, orti, campi | CC | |
| <i>Mercularis annua</i> | Mercorella comune | T scap | Paleotemp. | Suoli abbandonati, infestante colture | C | |
| <i>Euphorbia peplus</i> | Euforbia minore | T scap | Cosmopolita | Suoli concimati, colture, orti, ruderi | C | |
| <i>Malva sylvestris</i> | Malva selvatica | H scap (T scap) | Subcosmop. | Incolti, sinantropica | CC | |
| <i>Cistus incanus</i> | Cisto rosso | NP | Steno-Medit | Macchie e garighe | C | |
| <i>Fumana thymifolia</i> | Fumana vischiosa | Ch suffr | Steno-Medit | Pendii aridi, sassosi e rupestri | R | |
| <i>Ecballium elaterium</i> | Cocomero asinino | G bulb | Euri-Medit | Macerie, sabbie, pref. lungo le coste | C | |

| Nome scientifico | Nome comune | Forma biologica | Corotipo | Ambiente | Rarità | Note |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|---|----------|--|
| <i>Hedera helix</i> | Edera | P lian | Submedit.-Subatl. | Boschi medit e submediterr. | CC | |
| <i>Crithmum maritimum</i> | Finocchio marino | Ch suffr | Euri-Medit | Rupi maritt., scogliere, muri per il mare | C | |
| <i>Daucus carota</i> | Carota selvatica | H bienn | Subcosmop. | Incolti, lungo le vie, prati aridi | CC | |
| <i>Anagallis arvensis</i> | Centonchio dei campi | T rept | Subcosmop. | Garighe, incolti, campi, orti | CC | |
| <i>Limonium sp.</i> | Limonio | | | Litorali | - | |
| <i>Olea europea</i> | Olivo | P caesp/Pscap | Steno-Medit | Spontaneo e coltiv. In tutta l'area medit. | C | |
| <i>Sherardia arvensis</i> | Toccamano | T scap | Subcosmop. | Garighe, incolti, pascoli aridi | C | |
| <i>Rubia peregrina</i> | Robbia selvatica | P lian | Steno-Medit.-Macarones | Boschi sempreverdi e più raramente caducifogli, macchie, siepi | C | |
| <i>Cerithe major</i> | Erba vajola maggiore | T scap | Steno-Medit. | Incolti, bordi di vigne e oliveti, lungo le vie | C | |
| <i>Borago officinalis</i> | Boraggine comune | T scap | Euri-Medit | Incolti, ruderi | C | |
| <i>Ajuga iva</i> | Iva moscata | Ch suffr | Steno-Medit. | Prati aridi, pascoli, incolti | C | |
| <i>Teucrium polium</i> | Camedrio polio | Ch suffr | Steno-Medit. | Garighe, pascoli aridi, dune consolidate | C | |
| <i>Phlomis fruticosa</i> | Salvione giallo | NP | Steno-Medit.-Sett. | Rupi, garighe | R | |
| <i>Micromeria graeca</i> | Issopo meridionale | Ch suffr | Steno-Medit. | Rupi, pietraie, pascoli | C | |
| <i>Micromeria fruticulosa</i> | Issopo marittimo | Ch suffr | Endem | Generalm. presso il mare | R | Segnalata dal Pignatti (2002) solo in Sicilia, Campania, Ventotene e Otranto. |
| <i>Thymus capitatus</i> | Timo arbustivo | Ch frut | Steno-Medit.-Orient. | Garighe, pendii aridi, pinete mediterranee | C | |
| <i>Verbascum sinuatum</i> | Verbasco sinuoso | H bienn | Euri-Medit | Incolti aridi e sabbiosi, lungo le vie | C | |
| <i>Plantago coronopus</i> | Piantaggine barbatella | H bienn/H ros | Euri-Medit | Incolti aridi generalmente presso il mare, prati salmastri, scogliere | C | |
| <i>Plantago serraria</i> | Piantaggine serraria | H ros | Steno-Medit. | Incolti aridi, anche subsalsi, soprattutto lungo il litorale | C | |

| Nome scientifico | Nome comune | Forma biologica | Corotipo | Ambiente | Rarità | Note |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|--------|------|
| <i>Plantago lagopus</i> | Piantaggine di lepre | T scap | Steno-Medit. | Pascoli aridi, incolti | C | |
| <i>Plantago psyllium</i> | Piantaggine pulicaria | T scap | Steno-Medit. | Incolti aridi, pascoli | C | |
| <i>Scabiosa columbaria</i> | Vedovina selvatica | H scap | Eurasiat | Prati, pascoli aridi, siepi, bordi boschivi | C | |
| <i>Bellis annua</i> | Pratolina annuale | T scap | Steno-Medit | Prati, incolti | C | |
| <i>Chrysanthemum coronarium</i> | Crisantemo giallo | T scap | Steno-Medit | Campi, vigne, oliveti, incolti | C | |
| <i>Helichrysum italicum</i> | Perpetuini d'Italia | Ch suffr | S-Europ | Macchie, garighe, prati aridi | C | |
| <i>Inula viscosa</i> | Enula cepittoni | H scap | Euri-Medit | Ruderi, greti del torrenti, spiagge, incolti umidi | C | |
| <i>Senecio gr. cineraria</i> | Senecione cinerario | Ch suffr | | Rupi maritt | C | |
| <i>Calendula arvensis</i> | Fiorrancio selvatico | T scap | Euri-Medit | Incolti, margini delle vie, campi e vigneti | C | |
| <i>Galactites tomentosa</i> | Scarlina | H bienn | Steno-Medit | Incolti, ruderi, lungo le vie | C | |
| <i>Carthamus lanatus</i> | Zafferanoni selvatico | T scap | Euri-Medit | Incolti aridi, oliveti, vigne | C | |
| <i>Carlina corymbosa</i> | Carlina raggio d'oro | H scap | Steno-Medit. | Prati aridi e sassosi | C | |
| <i>Picris hieracioides</i> | Aspraggine comune | H scap | Eurosib | Incolti, lungo le vie | C | |
| <i>Sonchus oleraceus</i> | Grespino comune | T scap | Subcosmop. | Colture concimate, muri, bordi delle vie | CC | |
| <i>Reichardia picroides</i> | Grattalingua comune | H scap | Steno-Medit | Rupi marittime, incolti aridi, muri, lungo levie | C | |
| <i>Asphodelus microcarpus</i> | Asodelo mediterraneo | G rhiz | Steno-Medit | Incolti, aridi, pascoli, garighe | C | |
| <i>Urginea maritima</i> | Scilla marittima | G bulb | Steno-Medit-macarones | Pendii aridi, garighe | C | |
| <i>Muscari atlanticum</i> | Muscari atlantico | G bulb | Euri-medit | Prati, pascoli, orti e vigneti | C | |
| <i>Allium neapolitanum</i> | Allio napoletano | G bulb | Steno-Medit | Muri, vignete, oliveti, parchi, in ambienti umidi e ombrosi | C | |
| <i>Asparagus acutifolius</i> | Asparago pungente | G rhiz | Steno-Medit | Macchie, leccete, boschi, caducifogli, siepi | C | |

| Nome scientifico | Nome comune | Forma biologica | Corotipo | Ambiente | Rarità | Note |
|----------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|---|----------|--|
| <i>Nome scientifico</i> | Nome comune | Forma biologica | Corotipo | Ambiente | Rarità | Note |
| <i>Romulea bulbocodium</i> | Zafferanetto | G bulb | Steno-Medit | Prati aridi, boscaglie | C | |
| <i>Vulpia ciliata</i> | Paleo cigliato | T caesp | Euri-Medit | Garighe, incolti, bordi delle vie | C | |
| <i>Agropyron repens</i> | Gramigna comune | G rhiz | Circumbor | Incolti, bordi delle vie, campi, prati aridi | CC | |
| <i>Lagurus ovatus</i> | Piumino | T scap | Euri-Medit | Suoli aridi sabbiosi, incolti, dune marittime | C | |
| <i>Arundo donax</i> | Canna domestica | G rhiz | Subcosmop. | Coltivata e spontaneizzata | C | |
| <i>Phleum paniculatum</i> | Codolina lima | T scap | Euri-Medit-Turan | Incolti aridi, muri, vie, vigne e oliveti | R | |
| <i>Arum italicum</i> | Gigaro chiaro | G rhiz | Steno-Medit | Macchie, cedui, radure, siepi, vigne e oliveti | C | |
| <i>Arisarum vulgare</i> | Arisaro comune | G rhiz | Steno-Medit | Leccete, cedui, incolti, siepi, oliveti | C | |
| <i>Orchis lactea</i> | Orchidea aguzza | G bulb | Steno-Medit | Prati aridi, macchie | R | Segnalata nel formulario standard tra le altre specie di interesse conservazionistico |
| <i>Santolina marchii</i> | Crespolina di Marchi | NP | Origine sconosciuta | Coltiv. e sporadicamente subspontanea su ruderi macerie | C | |