LEGENDA

COPERTURE SENZA ATTRIBUZIONE DI ETA'

Frana quiescente · Frana antica · Frana attiva

a3 - Depositi di versante
Limi e sabbie marroni inglobanti ciottoli sub-angolari, eterometrici ed eterogenee tasca suoordinati.

a4 - Depositi eluvio-colluviali
Limi, limi sabbiosi e sabbie limose brune con ghiaie minute e ciottoli millimetrici eterogenee. Coltre frequentemente marroni rossastri.

DEPOSITI QUATERNARI

H1b - Depositi fluviali
Ghiaie, sabbie e limi costituiti da litrieoscistosi da decelimento ghiaiose e con ghiaia, limi argillosi e sabbie con ghiaie decelimento limose. Nella zona alluvionale del Fiume Ombrone sono presenti intercalazioni torbose di ghiaie e ciottoli arrotondati. Colore variabile da nocciola a grigio. Possibile presenza di elementi millenitici resistenti e manganese e livelli organici fossili.
Età: Olocene

H1b1 - Depositi fluviali attuali
Depositi in evoluzione, sono d'acqua attuali.
Età: Olocene

H1a - Depositi lagunari
Argille limose e limi argillosi prevalenti con subordinate intercalazioni di sabbie- limose e sabbie ghiaiose. Colore scuro e grigio. Presenza locale di resti di fauna di ambiente salmastro.
Età: Olocene

Qt1d - Depositi fluviali
Sabbie limose con ghiaia, ghiaie limose, sabbie limose, limi argillosi e sabbiosi. Gli strati da subordinati a suoloriferenti, ocrosi. Colore da nocciola-rossastro-ocraceo a grigio. Possibili concrezioni carbonatiche, resulta carbonosi e tracce di manganese.
Età: Pleistocene superiore

Qt1d1 - Depositi di ambiente Fluvio-Lacustre e Lagunare
Si rinvengono intercalate ai depositi alluvionali, sono costituiti da limi, limi sabbiosi, sabbie limose con intercalazioni di ghiaia e limi caratteri carbonatici. Intercalati livelli resistenti torbosi. Originati da deposizione in ambiente lacustre e palustre. Colore da nocciola a grigio. Possibile presenza di resti di fauna continentale e palustre. Si presumono in relazione alle quote di acque sotterranee del sedimento.
Età: Pleistocene medio-superiore

Qt1b - Depositi lagunari
Argille e limi prevalenti con subordinate intercalazioni di sabbie-limose. Colore da nocciola verdastro a grigio-verdastro. Presenza di malacofauna di ambiente salmastro.
Età: Pleistocene medio formazioni Versiano ?

DEPOSITI NEOGENICI

FAA - Argille azzurre
Argille grigio - azzurre, argille marnose, talvolta sabbiose, localmente fossilifere grige. Presenza sporadica di ciottoli di gesso. Ruditi carbonatiche, di genesi marina(?) in sondaggio locali frammenti da mm a cm di roccia del colore bruno - scuro, nero due e scaglia bituminosa simile alle ammoniti.
Età: Pliocene - Quaternario?

PCB - Conglomerati e sabbie di Giuncarico
Conglomerati eterometrici costituiti essenzialmente da clasti a decelimento a litotipi delle Unità Liguri in matrice sabbioso-argillosa, ossia alternazioni di limi e sabbie, in sondaggio limo-argillosi con intercalazioni di limi sabbiosi e ghiaino decelimento cementati
Età: Pliocene - Quaternario?

COM - CONGLOMERATI MIOCENICI (ph. Conglomerati di Monteberaldi, Conglomerati di Pedare inferno)
Conglomerati non classati di colore dal rosso al grigio-verde con ciottoli in genere embricati e di dimensioni centimetriche da cm a decametrica. Sono costituiti di litotipi derivanti dalle formazioni delle Unità Liguri (calcari-silosi, arenarie, diaspri, arenarie quarzose) e Toscane (calcari, calcari selciferi, arenarie). Matrice sabbioso-argillosa, in sondaggio limo-argillosa e limo sabbiosa molto addensata/cementata decelimente cementata. Localmente si rinvengono sovente in sondaggio sottoforma di ghiaie e ciottoli in matrice limo-sabbiosa rossastra. Ambiente fluviale
Età: Messiniano sup. (TURO,BANO)

CRO - CONGLOMERATI ROSSI DI COLLACCHIA
Conglomerati poligenici a matrice sabbiosa e/o argillosa. Si rinvengono in genere mediamente cementati e non organizzati con spessi di alternanze centimetriche (a 1 e 40 cm. Ciottoli e matrice si presentano generalmente arrossati o verdi. I ciottoli derivano in genere dalla formazione delle argille a Palombini (Prevalenti calcari, subordinati arenarie, diaspri ecc.). Ambiente fluvio-lacustre
Età: Messiniano s.s. (TURO,BANO)

UNITA' TETTONICHE LIGURI

APA - ARGILLE A PALOMBINI
Argilliti e siltiti grigio scure a luoghi intercalate subordinati calcari grigi. Localmente, intercalate alle argilliti ed alle siltiti di rinvengono marne di colore grigio-verde. E' presente una facies "caotica-scagliosa" costituita da argille e siltiti grigio scure con intercalazioni di strati sottili di quarzoareniti. La formazione presenta quasi sempre assetto caotico, con stazione costituita da argilliti che inglobano masse calcaree senza ovviamente continuità laterale. In sondaggio frequenti livelli di argilliti marnose e argilliti alternate ad argilliti. Colore grigio scuro. Corte alternata a più sciolti.
Età: Cretaceo

br - Breccia ofiolitica
Descrizione: Radicamento per lo più di colore rosso, intercalate a livelli sottili di argilliti e brecce di natura calcarea, talvolta marnoso-calcarea.
Ambiente: Ambiente sedimentario, sedimentiti trasportate con veve di colate (ofioliti). Colore variabile dal verde chiaro al verde molto scuro con tessitura massiccia o brecciforme/caotica.

UNITA' TETTONICHE SUBLIGURI

PPP - Plioch di Poggio Pallone
Calcari marnosi, calcari e marne grigio chiaro/verde in strati da medio a molto spessi con assi centimetrici da fine a grossolano, subordinate intercalazioni di siltiti ed argille grige. La parte basale è localmente marcata da una brecciola ofitico-ematoxea.
Età: Eocene inferiore e medio

UNITA' TETTONICHE TOSCANE

MAC - Macigno
Arenarie quarzoso-feldspatico-micacee e siltiti in strati da sottili a spessi. Presentano base arenitica grossolana e tetto pelitico (siltiti marnose e subordinate argilliti non sempre presenti).
Età: Oligocene superiore-Miocene inferiore

CV - Calcare cavernoso
Calcari, calcari dolomitici grigi chiari a nerrone rossastro, cerosi tettonizzati suddivisi ad elementi calcareo o dolomitici a cemento calcareo, subordinate dolomie nere, non gessi. Caratteristica è la presenza di piccole cavità di forma poligonale vuote ("calcari vacuolari o cellulari") o riempite da calcare dolomitico ("brecciosi"). Si presentano bene interessate fratturati ed alterati dal carsismo. La cavernosità (e livelli dolomitici dovuti da dissoluzione e ricristallizzazione) è maggiormente sviluppata nella zona di contatto, ed alla dissoluzione dei cristalli di gesso così formati. Età: Norico-Retico
Età: Trias (Norico-retico)

UNITA' TETTONICHE TOSCANE METAMORFICHE (VERRUCANO AUTOCTT.)

SRC - Formazione della Verruca
Filoni quarzitico-muscovitiche grigio chiaro e grigio verdi, talora violacee, alternate a metaconglomerati quarzosi costituiti prevalentemente da clasti di quarzo cavato e quarziti talvolte a matrice filladica scura. I vari termini litologici possono frequentemente interessare la tessiture massive (prograsnita. In sondaggio passaggi alterati a sabbie e limi sabbiosi scuri, verdi, verdastri con clasti di quarzite, limi talvolta sovente violacei e limi.
Età: Trias (Ladinico sup.-Carnico)

ax affiorante · ax subaffiorante

PLANIMETRIA E PROFILO

Campagna Indagini Geognostiche PD-2010

- Sondaggio geognostico attrezzato con piezometro
- Sondaggio geognostico attrezzato per sismica in foro
- Sondaggio geognostico a distruzione di nucleo attrezzato per sismica in foro
- Prova penetrometrica statica
- Pozzetto esplorativo
- Tomografia elettrica

Indagini Geognostiche pregresse

- Sondaggio geognostico PP (2003) - Fase A
- Sondaggio geognostico ANAS (1999)
- Prova penetrometrica ANAS (1999)
- Sondaggio geognostico ANAS (1991)
- Prova penetrometrica ANAS (1991)
- Sondaggio geognostico ANAS (1975)
- Prova penetrometrica ANAS (1975)
- Indagini Regione Toscana (Consiglio Lamma)

Sondaggio attrezzato ed utilizzato nestalmente per il telecontrollo

Litologie prevalenti nei depositi quaternari e neogenici (s.s. pedol.)

- Litofacies prevalentemente ghiaiosa
- Litofacies ghiaia, sabbia, limo
- Litofacies prevalentemente sabbiosa
- Litofacies prevalentemente limoso-sabbosa fitto, ghiaiosa
- Litofacies prevalentemente limoso argillosa
- Torce
- Gesso

Litofacies prevalenti nei depositi di substrato (pedlig.)

- Conglomerati, Ghiaie con sabbie e limo (PCB, COM, CRO)
- Argilliti e siltiti con calcari (APA); calcari con subordinate argilliti e siltiti (PPP)
- Arenarie e siltiti (MAC)
- Calcare, Calcare cavernoso (CV)
- Filladi e quarziti (SRC)
- Zona ad intensa fratturazione/alterazione da carsismo
- Contatto stratigrafico certo, presunto
- Sovrascorrimento certo, presunto
- Faglia certa o presunta / sovolta presunta
- Limite dicorsa con alterazione del substrato
- Traccia profilo geologico

Il profilo geologico è eseguito 30 m in destra rispetto all'asse autostradale. La traccia lungo la quale è stato realizzato il profilo è riportata in planimetria mediante una linea blu; sul profilo viene inoltre riportata la posizione della livellette di progetto mediante una linea rossa.







| | | |