

Litologie in affioramento


- h1m** Depositi antropici. Discariche industriali. OLOCENE
- h1r** Depositi antropici. Materiali di riporto e aree bonificate. OLOCENE
- h2** Coltri eluvio-colluviali. Detriti immersi in matrice fine. OLOCENE
- h3** Depositi di versante. Detriti con clasti angolosi, talora parzialmente cementati. OLOCENE
- h4a** Depositi di frana. Corpi di frana antichi. OLOCENE
- h4b** Depositi alluvionali. OLOCENE
- h4c** Depositi alluvionali. Ghiaie da grossolane a medie. OLOCENE
- h4d** Depositi alluvionali terrazzati. Ghiaie e subordinate sabbie. OLOCENE
- h4e** Depositi alluvionali. Limi ed argille. OLOCENE
- h4f** Depositi alluvionali terrazzati. OLOCENE
- h4m** Depositi alluvionali terrazzati. Ghiaie e subordinate sabbie. OLOCENE
- h4n** Depositi alluvionali terrazzati. Sabbie con subordinati limi ed argille. OLOCENE
- h4p** Depositi lacustri. Calcarei lacustri talvolta con gasteropodi polmonati. OLOCENE
- h4q** Depositi lacustri. Limi ed argille grigio scure con intercalazioni sabbiose. OLOCENE
- h4r** Depositi di spiaggia antichi. Sabbie, arenarie, calciridilli, ghiaie con bivalvi, gasteropodi, con subordinati depositi sabbioso-limosi PLEISTOCENE SUP. - ?OLOCENE
- h4s** Litofacies nelle DACITI e ANDESITI DI MONTE SA PIBIONADA. Andesiti porfiriche per fenocristalli di Pl, Am e Cpx; in giacitura subvulcanica. OLIGOCENE SUP.
- h4t** Litofacies nel Subintema di Portosuso (SINTEMA DI PORTOVESME). Ghiaie alluvionali terrazzate da medie a grossolane, con subordinate sabbie. PLEISTOCENE SUP.
- h4u** Litofacies nelle DACITI e ANDESITI DI MONTE SA PIBIONADA. Daciti porfiriche con fenocristalli di Pl, P e Am; in giacitura subvulcanica (P.ta Fanaris, M. Truxionis); diffusa alterazione idrotermale. OLOCENE SUP.
- h4v** RIOLITI DI SERRA DI PARINGIANU (Liparti "1" Auct. p.p.). Depositi di flusso proclastico in facies ignimbritica, a composizione riolitica, di colore da grigio a bruno rossastro, densamente saldati, con tessitura da eufassitica a paratassitica e vitrofiro basale; con breccie autoclastiche nella parte superiore. Localmente, strutture da fontanamento e paleosuoli a tetto. LANGHIANO
- h4w** RIOLITI DI PARINGIANU (Liparti "11" Auct.). Depositi di flusso proclastico in facies ignimbritica, con alternanze di depositi di caduta, a composizione riolitica, di colore variabile da grigio giallastro a rosa arancio, da non saldati a densamente saldati, con tessitura eufassitica. Alla base, localmente, depositi epistatici prevalentemente arenaceo-conglomeratici e paleosuoli a tetto. Spessore fino a oltre 40 m. LANGHIANO
- h4x** RIOLITI IPERACALINE DI MONTE ULMUS (Liparti "12" Auct.). Depositi di flusso proclastico in facies ignimbritica, di composizione riolitica iperacalina, di colore grigio bruno, da incipientemente a densamente saldati, con evidenti strutture di flusso nella parte inferiore. Presenza di vitrofiro alla base e deposito di caduta a tetto con paleosuoli. MIOCENE MEDIO (LANGHIANO)
- h4y** COMENDITI AUCT. Depositi di flusso proclastico in facies ignimbritica a composizione riolitica comenditica, da non saldati (tuffi, tuffi a lapilli) a densamente saldati, con tessitura eufassitica e livello vitrofiro basale; subordinate intercalazioni di depositi proclastici di caduta, epistatici e paleosuoli. Spessori affioranti fino a 30 m. (15,5±0,5 Ma). MIOCENE MEDIO (LANGHIANO)
- h4z** RIOLITI DI NURAXI ("Liparti 14" Auct.). Depositi di flusso proclastico in facies ignimbritica a composizione riolitica, con cristalli liberi di Pl, di colore variabile da grigio ceruleo a bruno violaceo spesso reorotici, densamente saldati. LANGHIANO
- h4aa** RIOLITI DI MONTE CROBU. Depositi di flusso proclastico di composizione riolitica, da densamente saldati a non saldati (tuffi, tuffi a lapilli e tuffi-breccia). Spessore: in genere da alcuni metri fino a qualche decina di metri. MIOCENE MEDIO (LANGHIANO)
- h4ab** RIOLITI DI SERUCI. Depositi di flusso proclastico in facies ignimbritica a chimismo riolitico, densamente saldati, spesso con livello vitrofiro alla base. MIOCENE INF.-MEDIO (BURDIGALIANO SUP. - LANGHIANO)
- h4ac** DACITI DI ACQUA SA CANNA. Depositi di flusso proclastico in facies ignimbritica a chimismo dacitico, da non saldati ad incipientemente saldati, e depositi proclastici di caduta, di colore da grigio chiaro fino a rosato. Alla base ed in alternanza depositi epistatici costituiti da arenarie vulcaniche, breccie e conglomerati BURDIGALIANO SUP.
- h4ad** DACITI DI CORDA MARIA. Depositi di flusso proclastico in facies ignimbritica a chimismo dacitico, da densamente saldati a tessitura eufassitica, a non saldati, spesso con livello vitrofiro; talora, alla base, depositi proclastici di caduta e paleosuoli. MIOCENE INF. (BURDIGALIANO)
- h4ae** ANDESITI DI MONTE PALMAS. Andesiti in breccie autoclastiche a clasti subangolosi scorie grigio chiare, passanti verso l'alto a lave andesitico-dacitiche. MIOCENE INF. (BURDIGALIANO)
- h4af** Litofacies nelle ANDESITI DI MONTE PALMAS. Alla base, bancate di breccie proclastiche a matrice pomiceo cineritica, intercalazioni di livelli epistatici. MIOCENE INF. (BURDIGALIANO)
- h4ag** Litofacies nelle ANDESITI DI MONTE PALMAS. Intercalazione discontinua di andesiti basaltiche scure, porfiriche, in massa di fondo ipocristallina; in colate massive e autoclastiche. MIOCENE INF. (BURDIGALIANO)
- h4ah** ANDESITI DI CUCURURU PORCEDDUS. Andesiti in colate massive, di colore grigio scuro con bande di fusso, e subordinate breccie laviche autoclastiche più frequenti verso l'alto, a struttura porfirica MIOCENE INF. (BURDIGALIANO)
- h4ai** Litofacies nelle ANDESITI DI CUCURURU PORCEDDUS. Breccie epistatiche, poligeniche, eterometriche, e arenarie vulcanoclastiche; MIOCENE INF. (BURDIGALIANO)
- h4aj** ANDESITI BASALTICHE DI MONTE ENNAZZA. Andesiti basaltiche e andesiti in breccie laviche autoclastiche in colate, subordinate colate laviche massive. MIOCENE INF.
- h4ak** ANDESITI DI TRACASI. Andesiti in colate massive, localmente con bande di fusso, spesso alterate, a struttura porfirica, in massa di fondo ipocristallina. MIOCENE INF.
- h4al** FORMAZIONE DEL CIXERRI. Argille silose di colore rossastro, arenarie quarzoso-feldspatiche, conglomerati eterometrici e poligenici debolmente cementati. EOCENE MEDIO - ?OLIGOCENE
- h4am** Litofacies nella FORMAZIONE DEL CIXERRI. Breccie di quarzo e litidi ben cementate e noduli ferruginosi alla base. EOCENE MEDIO - ?OLIGOCENE
- h4an** LIGITIFERO AUCT. Calcarei di colore biancastro con resti di bivalvi e oregoni di corallo, breccie cementate e rari livelli carboniosi; a tetto, talvolta, livello decimetrico di calcare organogeno con resti di limnee. EOCENE INF.-MEDIO (YPRESIANO SUP. - LUTEZIANO INF.)
- h4ao** MILIOLITICO AUCT. Calcarei e calcari arenacei, spesso ricchissimi in milioliti di ambiente lagunare. EOCENE INF. (YPRESIANO)
- h4ap** Litofacies nella formazione del MILIOLITICO AUCT. Talora, alla base conglomerati poligenici a prevalenti clasti di quarzo e litidi, verso l'alto arenarie quarzose a cemento carbonatico. EOCENE INF. (YPRESIANO)
- h4aq** BUNTSANDSTEIN AUCT. Alternanza di arenarie, argilliti, siltiti, livelli marnosi con gesso e conglomerati poligenici TRIASSICO MEDIO (ANISICO)
- h4ar** Filoni intermedio-basici a composizione andesitica o basaltica, a volte porfirici, generalmente molto alterati. CARBONIFERO SUP. - PERMIANO
- h4as** ARENARIE DI SAN VITO. Alternanze irregolari, da decimetriche a metriche, di metarenarie medio-fini, metasiltiti con laminazioni piano-parallele, ondulate ed incrociate, e metasiltiti micacee di colore grigio. Intercalazioni di metamiccongomerati poligenici CAMBRIANO MEDIO - ORDOVICIANO SUP.
- h4at** FORMAZIONE DI FLUMINAMGIORE. Alternanza di calcari e metapeliti scure, ricche in fossili. SILURIANO INF.-DEVONIANO INF. (WENLOCK-LOCHKOVIANO INF.)
- h4au** FORMAZIONE DI GENNA MUXERRU. Metapeliti e metasiltiti nere carboniose con intercalazioni di litidi e metarenarie nere, con graptoliti. SILURIANO INF. (LLANDOVERY)
- h4av** Membro di Giris (FORMAZIONE DI RIO SAN MARCO). Metapeliti, metasiltiti e subordinatamente metarenarie medio-fini massive, di colore grigio scuro e nero, con rari livelli a laminazioni piano-parallele caratterizzati da granuli di quarzo dispersi nelle metasiltiti. ORDOVICIANO SUP. (ASHGILL SUP.)
- h4aw** Membro di Serra Corroga (FORMAZIONE DI RIO SAN MARCO). Alternanze ritmiche di lamine millimetriche piano-parallele di metasiltiti e metarenarie fini di colore grigio-verde. ORDOVICIANO SUP. (ASHGILL SUP.)
- h4ax** Membro di Cuccunureddu (FORMAZIONE DI RIO SAN MARCO). Alternanze ritmiche torbiditiche di strati centimetrici e decimetrici di metarenarie micacee e metasiltiti di colore grigio o nocciola, con laminazioni piano-parallele e incrociate, e strati di metapeliti verdi. ORDOVICIANO SUP. (ASHGILL SUP.)

- h4ay** Membro di Punta Arenas (FORMAZIONE DI RIO SAN MARCO). Alternanze di strati decimetrici di metabreccie e metaconglomerati di colore verde, e metarenarie fini, e metasiltiti di colore grigio scuro con laminazioni piano-parallele e incrociate. ORDOVICIANO SUP. (ASHGILL SUP.)
- h4az** Membro di Punta S'Argiola (FORMAZIONE DI DOMUSNOVAS). Metasiltiti e metapeliti massive, spesso carbonatiche, di colore rosso-violaceo la parte alta del membro è caratterizzata da noduli e livelli centimetrici di ferro e manganese. ORDOVICIANO SUP. (ASHGILL INF.)
- h4ba** Litofacies nel Membro di Punta S'Argiola (FORMAZIONE DI DOMUSNOVAS). Intercalazione di metacalcanti basiche. ORDOVICIANO SUP. (ASHGILL INF.)
- h4bb** FORMAZIONE DI PORTIXEDDU. Metasiltiti e metargilliti massive grigio-verdi scure, raramente rossastre, con rari livelli millimetrici piano-paralleli e orizzonti a noduli fosfatici bianchi; ORDOVICIANO SUP. (CARADOC - ASHGILL INF.)
- h4bc** FORMAZIONE DI MONTE ORRI. Alternanze di metasiltiti e metarenarie medio-fini verdastre, quarzoso-feldspatiche, con laminazioni piano-paralleli ed incrociate caratterizzate da livelli millimetrici di minerali pesanti e bioturbazioni; strati metrici di metarenarie medio-grossolane. ORDOVICIANO SUP. (CARADOC)
- h4bd** Membro di Medau Murtas (FORMAZIONE DI MONTE ARGENTU). Metarenarie e metasiltiti viola e verdi, e subordinati metaconglomerati e breccie prevalentemente quarzose. ORDOVICIANO ?MEDIO-SUP.
- h4be** Membro di Rio Is Arus (FORMAZIONE DI MONTE ARGENTU). Metasiltiti e metapeliti di colore grigio con subordinate metarenarie. ORDOVICIANO ?MEDIO-SUP.
- h4bf** Membro di Punta Sa Broccia (FORMAZIONE DI MONTE ARGENTU). Metaconglomerati e metabreccie eterometrici poligenici, alternati a metasiltiti e metarenarie violacee. ORDOVICIANO ?MEDIO-SUP.
- h4bg** Olistoliti nel Membro di Punta Sa Broccia (FORMAZIONE DI MONTE ARGENTU). "Olistoliti" di metacalcari del Membro del Calcare ceroidale trasformati in skarn. ORDOVICIANO SUP. (CARADOC)
- h4bh** Membro di Riu Cea de Mesu (FORMAZIONE DI CABITZA). Monotone alternanze di metasiltiti e metapeliti di colore verde e grigio con laminazioni parallele; nella parte basale sono presenti rari livelli di metarenarie a grana media con laminazioni tipo HCS. CAMBRIANO MEDIO - ORDOVICIANO INF. (MAYAIANO-TREMADOC)
- h4bi** Membro di Punta Su Funu (FORMAZIONE DI CABITZA). Alternanze ritmiche di metasiltiti e metapeliti rosso-violaceo verdi; subordinate livelli di metarenarie quarzoso-feldspatiche con laminazioni piano parallele e incrociate. CAMBRIANO MEDIO - ORDOVICIANO INF. (MAYAIANO-TREMADOC)
- h4bj** Membro di Punta Camisonis (FORMAZIONE DI CABITZA). Alternanze di strati di metarenarie grossolane e metasiltiti grigio-verdi CAMBRIANO MEDIO - ORDOVICIANO INF. (MAYAIANO-TREMADOC)
- h4bk** FORMAZIONE DI CAMPO PISANO. Alternanze di metacalcari, metacalcari marnosi rosati, metasiltiti grigie e metacalcari grigio-rosati a struttura nodulare, talora silticizzati, ricchi in frammenti di fossili. CAMBRIANO INF.-MEDIO (LENIANO-AMGAIANO)
- h4bl** Membro del Calcare ceroidale (FORMAZIONE DI GONNESA). Calcarei grigi massivi, talora nerastri, spesso dolomitizzati. CAMBRIANO INF. (ATDABANIANO SUP. - LENIANO)
- h4bm** Membro di Matoppa (FORMAZIONE DI NEBIDA). Metarenarie e metasiltiti, con laminazioni piano-parallele, alternate a bancate decimetriche di metarenarie quarzose, con rari livelli carbonatici. CAMBRIANO INF. (ATDABANIANO)

Redazione: Dott.ssa Geol. Maria Luisa Biggio Ordine geologi Regione Sardegna n. 354
Dott. Geol. Vincenzo Marsala Ordine geologi Regione del Veneto n. 593 Anzianità 1994

- Reticolo idrografico
- Superficie idrografica
- Elementi progettuali**
- Condotta di progetto

Quadro di unione - scala 1:250.000





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessoradu de sos traballus pùblicos
Assessorato dei lavori pubblici



Ente acque della Sardegna

INTERCONNESSIONE DEI SISTEMI IDRICI
COLLEGAMENTO TIRSO-FLUMEDOSA 4° LOTTO
COLLEGAMENTO SULCIS - IGLESIENTE
(Delibera Giunta Regionale n. 44/23 del 07.11.2014 - Convenzione RAS-ENAS del 22.12.2014)



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA - ECONOMICA
integrato con gli elaborati necessari al fine dell'ottenimento del PUA

LINEE DI INTERVENTO "A" E "C"

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO
Planimetria e sezioni geologiche - Quadro 3

Allegato:
PF.10.32-3
scale: 1:10.000

Mandatari:



Mandatari:



Mandatari:



Mandatari:



Redatto da:



Mandatari:



Mandatari:



Mandatari:



REVISIONE	MODIFICA	DATA	TECNICO	CONTROLLI
REV.00	Prima emissione	maggio 2019	M.B.; V.M.	A.G.
REV.01	Per validazione	settembre 2019	M.B.; V.M.	A.G.
REV.02	Per validazione	dicembre 2019	M.B.; V.M.	A.G.