



LEGENDA

DEPOSITI DI VERSANTE

Coltre detritico-ghiacciale e/o eluvio-ghiacciale (Olocene - Attuale)

(a): Depositi derivanti dalla degradazione meccanica e in parte dall'alterazione dei litotipi del substrato, sui quali appoggiano in contatto stratigrafico discordante. Lo spessore massimo è di circa 2-3 m, localmente maggiore laddove sono presenti accumuli più consistenti al piede dei versanti; nei primi 1-1,5 m dalla superficie sono spesso intensamente rimaneegati dalle attività agricole.

Comprendono argille limose e argille sabbiose, localmente passanti a sabbie argillose e a limi argillo-sabbiosi, con frequenti livelli sabbioso-ghiacciai a clasti poligenici da angolosi a subarrotondati. Il colore varia a seconda del litotipo di origine da grigio a marrone e bruno-rossastro; la tessitura è massiva, con abbondanti resti vegetali.

DEPOSITI ALLUVIONALI

Depositi alluvionali attuali (Olocene - Attuale)

Depositì degli alvei di piene attuali, anche temporaneamente abbandonati, e di piene esondabili. Lo spessore massimo è dell'ordine di alcuni metri.

(a3): Ghiaie eterometriche a ciottoli poligenici da arrotondati a subarrotondati, con tessitura clast-supported in matrice sabbiosa e sabbioso-limosa di colore grigio e giallastro, da scarsa a abbondante, sabbie e sabbie limose in matrice limoso-argillosa con intercalazioni di argille limose e locali livelli ghiaiosi. Il colore è generalmente da marrone a ocra, la tessitura è massiva o laminata.

Depositi alluvionali recenti (Olocene)

Depositi di alveo fluviale, piana esondabile, meandro e conoide alluvionale, a dominante composizione sabbioso-ghiacciaia. Lo spessore massimo è di circa 15 m.

(a2): Limi e limi argilosce con subordinate sabbie e sabbie limose di colore marrone, grigio e giallastro, a stratificazione più o meno ben definita, talora con laminazione incrociata, con abbondanti ghiaie poligeniche da subangolosi ad arrotondate; localmente si rinviengono lenti e livelli di ghiaie poligeniche ed eterometriche, da subangolosi ad arrotondati, in matrice sabbiosa e sabbioso-limosa di colore marrone e grigio-giallastro, da scarsa a abbondante.

DEPOSITI MARINI NEOGENICO-QUATERNARI

Al tetto delle unità tettoniche della catena poggiante in discordanza depositi tortoniani, evaporiti messiniani e depositi del Plio-Pleistocene, a cui si intercalano, a vari orizzonti stratigrafici, livelli di argille brecciate. Queste successioni si sono depositate in bacini satelliti ubicati sopra le unità che si sono strutturate durante le fasi collisionali neogeniche.

FORMAZIONE TERRAVECCIA (Tortoniano inf. - Messiniano inf.)

Depositi marini di piattaforma continentale, scarpata e piana fluvio-deliziosa, costituiti da tre differenti litofaci a composizione argilloso-marnosa, sabbioso-conglomeratica e argilloso-brecciativa. Poggiano in contatto stratigrafico discordante sul Flysch Numidico e sulle Argille Varigete. Lo spessore della formazione è di circa 300-400 metri, fino a circa 1300 metri perfezionati in sottosuolo.

(TRV) Argille limose e argille marnose di colore grigio, grigio-azzurro e grigio-verdeastro, marrone per alterazione, a struttura scaglosa o solitamente stratificata, con frequenti livelli millimetrici di sabbie e sabbie limose grigie e giallastre; localmente si rinviengono passaggi di marna, marna argillose e argilli di colore grigio e grigio-verdeastro, a struttura scaglosa o solitamente stratificata.

(TRVa) Arenarie medio-fin prevalenti, di color rossoastro o giallastro, da poco a ben cementate, con lenti e livelli metrico-decametrici di conglomerati di colore grigio, rosso e giallastro, a clasti poligenici (comprendenti roccia carbonatiche, silicee, cristalline s.l., graniti e porfiriti dacitico-andesitici) in matrice arenacea da poco a ben cementata. Localmente sono presenti intercalazioni metrico-decametriche di sabbie ± limose addensate e compatte e di ghiaie sabbiose addensate e compatte, a clasti poligenici eterometrici, da arrotondati a subarrotondati; subordinate intercalazioni di limi sabbiosi, limi argillo-sabbiosi e microconglomerati grigi e nocciali in strati di spessore da centimetrico a decimetrico.

(TRVb) Argille, argille limose e limi argilosce di colore grigio e marrone, a struttura brecciativa o a blocchetti poliedrici, talora scaglosa o indistinta, con locali livelli di sabbie limose grigie e frequenti ghiaie poligeniche da angolosi a subangolosi, localmente si rinviengono passaggi di argille marnose e argilliti di colore grigio-verdeastro, a struttura brecciativa o finemente scaglosa, e distoliti eterometrici di quarzareniti numidiche e argille variegate.

Elementi geologici e strutturali
Limite stratigrafico (certo o presunto)
Blochi o corpi rocciosi alloctoni di dimensioni non cartografabili
Giacitura della stratificazione

SIMBOLOGIA

30

Elementi idrogeologici

- a ● Sorgente (a), sorgente salina (b), sorgente mineralizzata (c)
- Pozzo
- ▲ Area umida, acquitrino, zona a drenaggio difficoltoso

SIMBOLI IDROGEOLGICI

- | | |
|-----------|--|
| (a) -0,82 | Lettura piezometriche*: soggiacenza minima (a) e massima (b) misurate nel periodo di osservazione (ottobre 2019 / gennaio 2020). |
| (b) 4,00 | Limite superiore della zona satura (rappresentativo della condizione di massima misurata nel periodo di osservazione ottobre 2019 / gennaio 2020). |

* le letture effettuate nei sondaggi eseguiti per il progetto preliminare sono relative al 2018

Elementi geomorfologici

Forme e processi gravitativi

La definizione della tipologia dei fenomeni gravitativi fa riferimento alla classificazione riportata nel Manuale e Linee Guida APAT 39 (2006) e nel Vol. 13 (Fascicolo I) dei Quaderni di Aggiornamento ed Integrazioni delle linee guida della carta Geomorfologica d'Italia alla scala 1:50.000 (ISPRA, 2018). Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione geologica allegata.

attivo quiescente inattivo

Orlo di scarpa di frana

Area a fransosi diffusa, caratterizzata da piccole frane superficiali di dimensioni generalmente non cartografabili, spesso coalescenti, associate a fenomeni diffusi di denudamento del substrato stabile.

Aree in solfusso, caratterizzate da lento movimento verso il basso di uno strato superficiale, comprendente il terreno agrario rimaneegato e/o la coltre di alterazione del substrato in posto, di spessore compreso tra 1 e 2 m circa.

Forme e processi legati alla dinamica dei corsi d'acqua

attivo quiescente inattivo

Orlo di scarpa di erosione fluviale o torrentizia

Corsò d'acqua o canale

Alveo temporaneamente abbandonato

Scarpata morfologica

Lago, bacino irriguo, specchio d'acqua

attivo quiescente inattivo

Orlo di scarpa di erosione fluviale o torrentizia

Corsò d'acqua o canale

Alveo temporaneamente abbandonato

Scarpata morfologica

Lago, bacino irriguo, specchio d'acqua

attivo quiescente inattivo

Orlo di scarpa di erosione fluviale o torrentizia

Corsò d'acqua o canale

Alveo temporaneamente abbandonato

Scarpata morfologica

Lago, bacino irriguo, specchio d'acqua

attivo quiescente inattivo

Orlo di scarpa di erosione fluviale o torrentizia

Corsò d'acqua o canale

Alveo temporaneamente abbandonato

Scarpata morfologica

Lago, bacino irriguo, specchio d'acqua

attivo quiescente inattivo

Orlo di scarpa di erosione fluviale o torrentizia

Corsò d'acqua o canale

Alveo temporaneamente abbandonato

Scarpata morfologica

Lago, bacino irriguo, specchio d'acqua

attivo quiescente inattivo

Orlo di scarpa di erosione fluviale o torrentizia

Corsò d'acqua o canale

Alveo temporaneamente abbandonato

Scarpata morfologica

Lago, bacino irriguo, specchio d'acqua

attivo quiescente inattivo

Orlo di scarpa di erosione fluviale o torrentizia

Corsò d'acqua o canale

Alveo temporaneamente abbandonato

Scarpata morfologica

Lago, bacino irriguo, specchio d'acqua

attivo quiescente inattivo

Orlo di scarpa di erosione fluviale o torrentizia

Corsò d'acqua o canale

Alveo temporaneamente abbandonato

Scarpata morfologica

Lago, bacino irriguo, specchio d'acqua

attivo quiescente inattivo

Orlo di scarpa di erosione fluviale o torrentizia

Corsò d'acqua o canale

Alveo temporaneamente abbandonato

Scarpata morfologica

Lago, bacino irriguo, specchio d'acqua

attivo quiescente inattivo

Orlo di scarpa di erosione fluviale o torrentizia

Corsò d'acqua o canale

Alveo temporaneamente abbandonato

Scarpata morfologica

Lago, bacino irriguo, specchio d'acqua

attivo quiescente inattivo

Orlo di scarpa di erosione fluviale o torrentizia

Corsò d'acqua o canale

Alveo temporaneamente abbandonato

Scarpata morfologica

Lago, bacino irriguo, specchio d'acqua

attivo quiescente inattivo

Orlo di scarpa di erosione fluviale o torrentizia

Corsò d'acqua o canale

Alveo temporaneamente abbandonato

Scarpata morfologica

Lago, bacino irriguo, specchio d'acqua

attivo quiescente inattivo

Orlo di scarpa di erosione fluviale o torrentizia

Corsò d'acqua o canale

Alveo temporaneamente abbandonato

Scarpata morfologica

Lago, bacino irriguo, specchio d'acqua

attivo quiescente inattivo

Orlo di scarpa di erosione fluviale o torrentizia

Corsò d'acqua o canale

Alveo temporaneamente abbandonato

Scarpata morfologica

Lago, bacino irriguo, specchio d'acqua

attivo quiescente inattivo

Orlo di scarpa di erosione fluviale o torrentizia

Corsò d'acqua o canale

Alveo temporaneamente abbandonato

Scarpata morfologica

Lago, bacino irriguo, specchio d'acqua

attivo quiescente inattivo

Orlo di scarpa di erosione fluviale o torrentizia

Corsò d'acqua o canale

Alveo temporaneamente abbandonato

Scarpata morfologica

Lago, bacino irriguo, specchio d'acqua

attivo quiescente inattivo