



Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente Organismo di Diritto Pubblico

(Legge n° 1158 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n°114 del 24 aprile 2003)

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA



PROGETTO DEFINITIVO ALTERNATIVE AI SITI DI DEPOSITO

(Richieste CTVA del 22/12/2011 Prot. CTVA/2011/4534 e del 16/03/2012 Prot. CTVA/2012/1012)

EUROLINK S.C.p.A.

IMPREGILO S.p.A. SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. A.R.L. SACYR S.A.U.

ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. LTD A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE

PRO-GEO HIPPO	IL CONTRAENTE GENERALE PROJECT MANAGER	STRETTO DI MESSINA Direttore Generale	STRETTO DI MESSINA Amministratore Delegato
Prof. Ing. G. Umiltà Ordine Ing. Palermo n°1729	(Ing. P.P. Marcheselli)	Ing. G. Fiammenghi	Dott. P.Ciucci
Eurolink			
Ing. E.Pagani Ordine Ing. Milano n°15408			

Firmato digitalmente ai sensi dell' "Art.21 del D.Lgs. 82/2005"

CZV0789

Unità Funzionale COLLEGAMENTI VERSANTE SICILIA

Tipo di sistema CANTIERI

Raggruppamento di opere/attività SITI DI RECUPERO AMBIENTALE

Opera - tratto d'opera - parte d'opera SITO AL3

Titolo del documento RELAZIONE GEOLOGICA

CODICE			С	G	0	0	0	0	Р	R	Χ	٧	s	С	Z	С	4	S	D	8	3	0	0	0	0	0	1	F	0									
--------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
F0	08/06/2012	Emissione finale	M. Gerbino	P. Cosenza	G. Umiltà

NOME DEL FILE: CZV0789 F0 revisione interna:





Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO

Alternative ai siti di deposito

RELAZIONE GEOLOGICA

Codice documento CZV0789

Rev F0

Data 08/06/2012

INDICE

IND	DICE	3
Sito	o AL3 RELAZIONE GEOLOGICA	5
1	Premesse	5
2	Inquadramento geomorfologico	5
3	Lineamenti geologici	6
4	Considerazioni di carattere idrogeologico	7
5	II Sito AL3	8
5	5.1 Descrizione e geolitologia	8
ΑP	PENDICE	10
FO	TO 1 - Foggia data alla pendice con gradonate ad anfiteatro a seguito della sistemazione finale.	
FO ⁻	TO 2 – Foggia data alla pendice con gradonate ad anfiteatro a seguito della sistemazione finale.	





PROGETTO DEFINITIVO

Alternative ai siti di deposito

RELAZIONE GEOLOGICA

Codice documento
CZV0789

Rev F0

08/06/2012

Data

Sito AL3 RELAZIONE GEOLOGICA

1 Premesse

Il sito AL3 rientra nell' area che, nell'ambito del Piano di impiego dei materiali provenienti dagli scavi, può essere indicata come "Area Messina" dal nome del Comune all'interno del cui territorio ricade.

Detta area, per le finalità del progetto di cui sopra, si trova in una situazione ottimale per i seguenti motivi:

- 1. è abbastanza vicina ai cantieri in cui saranno prodotti i terreni di scavo;
- 2. i siti compresi in quest'area utilizzati in modo intensivo per cavarvi sabbia e ghiaia nello stato attuale si trovano in una situazione di profondo degrado ambientale. Il progetto in argomento consentirà la riqualificazione delle aree degradate.

2 Inquadramento geomorfologico

La morfologia dell'area, nel suo insieme, è tipicamente collinare, subordinata principalmente alle litologie affioranti, in assai minor misura ad interventi antropici. Nella parte in cui affiorano terreni sciolti e incoerenti il paesaggio risulta frastagliato e movimentato da continue digitazioni con varie linee di drenaggio. In corrispondenza degli affioramenti lapidei la morfologia assume uno stile più articolato con pendii più inclinati e frequenti rotture di pendenza, relazionabili con le strutture tettoniche presenti e con gli agenti esogeni, che - a loro volta - dipendono dalle condizioni climatiche locali.

Le aree di affioramento dei terreni metamorfici sono caratterizzate da versanti ancora più ripidi specialmente in corrispondenza delle formazioni gneissiche.

Nell'area si rileva la presenza di alcuni terrazzi marini.

La rete idrografica è abbastanza sviluppata e rappresentata da tre aste principali:

1. La Fiumara di Tono, la cui asta ha grosso modo andamento Sud – Nord; la sua foce è lungo la costa tirrenica.

Eurolink S.C.p.A. Pagina 5 di 12





PROGETTO DEFINITIVO

Alternative ai siti di deposito

RELAZIONE GEOLOGICA

Codice documento
CZV0789

Rev F0

08/06/2012

Data

- 2. La Fiumara di Curcuraci, la cui asta si svolge con direzione Ovest Est; la sua foce è lungo la costa ionica.
- 3. La Fiumara di Pace la cui asta scorre in direzione NW SE; la sua foce è lungo la costa ionica.

I reticoli idrografici di tutt' e tre questi corsi d'acqua si presentano discretamente articolati nei tratti montani dove si rileva la presenza di un buon numero di rami fluviali secondari, ad andamento più contorto rispetto a quello dell'asta principale. La notevole attività erosiva ha formato valli strette ed incassate. La loro attività erosiva, infatti, è alquanto rilevante, sia a causa di percorsi brevi e con pendenze accentuate, sia per la natura dei terreni attraversati.

Il regime idrologico è marcatamente torrentizio, tipico delle fiumare meridionali, con deflussi superficiali scarsi o assenti dalla tarda Primavera fino agli inizi d'Autunno e consistenti in Autunno e, soprattutto, durante i mesi invernali.

Tutt' e tre i corsi d'acqua sono stati oggetto di interventi con arginature fluviali, per limitare il pericolo di esondazioni, e con traverse per determinare una pendenza minore e limitarne l'attività erosiva.

3 Lineamenti geologici

Sulla scorta della letteratura geologica esistente e sulla base dei rilevamenti pregressi, le osservazioni dirette durante i sopralluoghi effettuati hanno consentito di pervenire alle seguenti ricostruzioni che trovano compendio nelle tavole tematiche allegate.

L'Area Messina fa parte del Settore Meridionale dell'Arco Calabro, caratterizzato dalla presenza di affioramenti riferibili alle Unità peloritane. Le Unità tettoniche che hanno dato luogo a questo grande edificio sono rappresentate da Unità di natura principalmente metamorfica e da lembi di coperture sedimentarie meso-cenozoiche, ricoperte da spesse successioni terrigene oligomioceniche e – subordinatamente – da sedimenti clastici ed evaporitici.

Il basamento metamorfico affiorante nell'area in esame è riferibile all'Unità Aspromonte costituita prevalentemente da paragneiss.

Nell'area presa in esame i terreni affioranti, dai più antichi ai più recenti, sono risultati i seguenti.

Calcari marnosi e marne calcaree, in facies di Trubi, del Pliocene inferiore. Sono di colore biancocrema, in strati decimetrici che talvolta arrivano al metro, in cui possono rinvenirsi litotipi molto

Eurolink S.C.p.A. Pagina 6 di 12





PROGETTO DEFINITIVO

Alternative ai siti di deposito

RELAZIONE GEOLOGICA

Codice documento
CZV0789

Rev F0

08/06/2012

Data

calcarei a frattura scheggiosa e litotipi a componente più argillosa a frattura concoide.

Seguono, quindi, depositi plio-pleistocenici in cui si rinvengono calcareniti a stratificazione incrociata o piano-parallela di colore giallognolo alternate a livelli di sabbie sciolte cui seguono verso l'alto ed in eteropia argille più o meno marnose, spesso sabbiose, color grigio-azzurro.

I vari termini di substrato localmente risultano coperti dalle "Ghiaie e Sabbie di Messina", del Pleistocene medio, costituite da sabbie, ghiaie e conglomerati fluvio-deltizi, di colore grigio-giallastro o rossastro. I ciottoli, per lo più cristallini, sono generalmente arrotondati e di diametro compreso tra pochi centimetri ed il metro.

I depositi più recenti sono rappresentati da:

- terrazzi marini del Pleistocene medio-superiore costituiti sabbia giallognola con ghiaia e ciottoli eterometrici tondeggianti spesso appiattiti di natura prevalentemente metamorfica.
- 2. alluvioni recenti e piane litorali costituiti da limi, sabbie e ghiaie, talora terrazzati, lungo i corsi d'acqua o nelle pianure costiere.

Nell'area si nota la presenza di più sistemi di faglie orientate prevalentemente in direzione NE – SW, legate ad una tettonica recente.

4 Considerazioni di carattere idrogeologico

Le differenze litologiche dei terreni presenti nell'area presa in esame, sia in affioramento che nel sottosuolo, determinano l'esistenza di complessi idrogeologici dalle caratteristiche di permeabilità ben distinguibili.

I terreni metamorfici sono caratterizzati da una bassa permeabilità primaria, tuttavia la presenza di fratture può conferire una discreta permeabilità secondaria che consente una modesta circolazione idrica discontinua, e la presenza di limitate falde idriche.

Di un certo interesse, se sostenuti alla base da terreni non permeabili o dotati di scarsa permeabilità, potrebbero essere le "Sabbie e Ghiaie di Messina" e i depositi terrazzati recenti, caratterizzati da una permeabilità da media ad elevata per porosità.

Altrettanto interessanti sono da considerare le alluvioni recenti nelle aree golenali dei corsi d'acqua e nelle pianure costiere dove, infatti, si rileva la presenza di numerosi pozzi.

Allo scopo di avere una visione immediata delle caratteristiche di permeabilità, sia pure di

Eurolink S.C.p.A. Pagina 7 di 12





PROGETTO DEFINITIVO

Alternative ai siti di deposito

RELAZIONE GEOLOGICA

Codice documento
CZV0789

Rev F0 Data 08/06/2012

massima, dei terreni affioranti, nella Carta Idrogeologica si è potuta fare la seguente distinzione in base al loro grado di permeabilità.

GRADO DI PE	RMEABILITA' K
Alta permeabilità	K > 10 cm/sec
Media permeabilità	10 cm/sec > K > 10 ⁻⁴ cm/sec
Bassa permeabilità	10 ⁻⁴ cm/sec > K > 10 ⁻⁷ cm/sec
Praticamente impermeabile	K < 10 cm/sec

* * *

In provincia di Messina si ha una piovosità media annua di ca. 800 mm, a fronte di una piovosità media regionale di 640 mm ca.

Il versante tirrenico dei Monti Peloritani fa registrare valori di precipitazione media nelle fasce costiere e collinari di 770 mm ca per arrivare addirittura a 1300 mm ca. nelle zone di spartiacque.

Nell'arco dell'anno solare il periodo più piovoso risulta essere quello autunno invernale, con i mesi di dicembre, gennaio e febbraio più piovosi di ottobre, novembre e marzo; nei restanti mesi le precipitazioni sono scarse o assenti.

5 II Sito AL3

5.1 Descrizione e geolitologia

Il sito denominato AL3 ricade nell'ambito del territorio comunale di Messina in Località Faro Superiore ad una quota media di 120 m sul l.m.

Nella Carta Tecnica della Regione Siciliana N° 588110 in scala 1:10.000 è localizzabile con le coordinate Gauss-Boaga 2570139,0000 Est e 4236633,0000 Nord.

Il sito si inserisce in un ampio comprensorio dove affiorano con notevoli spessori le cosiddette "Sabbie e Ghiaie di Messina" di età medio-pleistocenica (v Carta Geologica) in cui si rinvengono sabbie, ghiaie, ciottoli e conglomerati fluvio-deltizi, di colore giallognolo o rossastro,

Eurolink S.C.p.A. Pagina 8 di 12





PROGETTO DEFINITIVO

Alternative ai siti di deposito

RELAZIONE GEOLOGICA

Codice documento
CZV0789

Rev F0 Data 08/06/2012

con presenza di grossi blocchi tondeggianti di natura prevalentemente metamorfica. Nel caso di specie si ha una preponderanza di conglomerati rossastri ed elementi sciolti a granulometria grossolana. La stratificazione è poco evidente. Dalle ricostruzioni svolte la giacitura mostra un'immersione preferenziale verso i quadranti settentrionali.

Nella situazione attuale la morfologia del sito appare molto regolare, foggiata ad anfiteatro a seguito di una sistemazione ad ampie gradonate che è stata data alla pendice già oggetto di sfruttamento del giacimento di inerti (foto 1-2).

Non si notano segni provocati da ruscellamento delle acque meteoriche. Viste le caratteristiche di elevata permeabilità del giacimento non esistono conche di ristagno nel piazzale della cava che confina con la stradella di accesso agli ex impianti. E' il caso di segnalare, tuttavia, che quest'ultima è stata insediata in un impluvio che a quote più basse confluisce nella Fiumara di Tono, anch'essa trasformata in una via pubblica, come spesso si verifica nei corsi d'acqua del messinese, fino alla sua foce nella costa tirrenica.

Nelle carte della pericolosità e del rischio geomorfologico allegate al PAI non si riscontrano criticità che possano coinvolgere il sito AL3 in argomento. In quelle della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione si segnala che la stradella che porta da Faro Superiore al sito in argomento è stata considerata "Sito Oggetto d'Attenzione".

Eurolink S.C.p.A. Pagina 9 di 12





PROGETTO DEFINITIVO

Alternative ai siti di deposito

RELAZIONE GEOLOGICA

Codice documento CZV0789 Rev F0 Data 08/06/2012

APPENDICE

Eurolink S.C.p.A. Pagina 10 di 12





PROGETTO DEFINITIVO

Alternative ai siti di deposito

RELAZIONE GEOLOGICA

Codice documento CZV0789 Rev F0 Data 08/06/2012

FOTO 1 – Foggia data alla pendice con gradonate ad anfiteatro a seguito della sistemazione finale.



FOTO 2 – Foggia data alla pendice con gradonate ad anfiteatro a seguito della sistemazione finale.



Eurolink S.C.p.A. Pagina 11 di 12





PROGETTO DEFINITIVO

Alternative ai siti di deposito

RELAZIONE GEOLOGICA

Codice documento CZV0789 Rev F0

08/06/2012

Data

Eurolink S.C.p.A. Pagina 12 di 12