

# COMUNE DI LANUVIO



# PROVINCIA DI ROMA CAPITALE



## IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO DA 60,90 MWp RNE 1 LANUVIO SOLAR

Istanza di valutazione di impatto ambientale per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'artt. 23, 24-24bis e 25 D.lgs. n.152/2006

IMMOBILE	Comune di Lanuvio Foglio 34 Mappali 7/parte, 92/parte, 93, 26 e 27	
PROGETTO <b>VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE</b>	OGGETTO <b>DOC05 – RELAZIONE TECNICO AGRONOMICA</b>	SCALA --
REVISIONE - DATA	VERIFICATO	APPROVATO
REV.00 - 26/02/2022		
IL RICHIEDENTE	<b>RNE1 S.r.l.</b> 20144 Milano – Viale San Michele del Carso, 22  FIRMA _____	
IL PROGETTISTA	Per. Agr. Giovanni Cattaruzzi   FIRMA _____ 	
TEAM DI PROGETTO	Arch. Rosalba Teodoro - Ing. Francesca Imbrogno Per. Ag. Giovanni Cattaruzzi <b>LAND LIVE</b> 20124 Milano - Citycenter Regus - Via Lepetit 8/10 Tel. +39 02 0069 6321 13900 Biella - Via Repubblica 41 Tel. +39 015 32838 - Fax +39 015 30878	

## RELAZIONE TECNICO AGRONOMICA

1.0 Il progetto fotovoltaico	3
2.0 Contesto agroambientale	3
3.0 Partenariati di progetto	6
4.0 Caratteristiche del progetto agri-fotovoltaico	7
5.0 Orientamento delle politiche agro-ambientali dell'Unione Europea	8
5.1 Il Green Deal europeo	8
5.2 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	11
5.3 Il Programma di Sviluppo Rurale 2021/2028	11
5.4 PAC - Politica Agricola Comune - UE	12
6.0 Cenni sulla situazione socio-economica del settore primario nel Lazio	12
7.0 Politica ecologica del parco agri-fotovoltaico	13
7.1 Modalità di attuazione delle politiche agroambientali nel parco fotovoltaico	16
7.2 Integrazione delle attività agricole nel campo fotovoltaico a terra	17
7.2.1 L'impianto	17
7.2.2 I parametri climatici	18
7.2.3 La meccanizzazione	19
7.2.4 Sintesi delle modalità di integrazione	20
7.2.5 Scelta delle colture e delle attività agricole	21
8.0 La coltivazione dei prati, la fertilità dei suoli agrari e il ruolo di habitat	22
8.1 Realizzazione della coltura prativa	24
8.2 Manutenzione del prato successivamente alla semina	25
8.3 Macchine e attrezzature necessarie per la gestione della coltura	25
8.4 Computo metrico estimativo dei costi di realizzazione e manutenzione	28
9.0 La funzione dell'apicoltura in agricoltura e nell'ecosistema	29
9.1 Realizzazione delle postazioni apistiche	31
9.2 Descrizione dei lavori di realizzazione e manutenzione	32
9.2.1 Realizzazione	32
9.2.2 Manutenzione al primo anno dopo l'impianto	33
9.3 Scelta delle essenze mellifere erbacee ed arbustive	33
9.4 Computo metrico estimativo dei lavori di realizzazione e manutenzione	34
9.5 Business plan dell'attività apistica	35
10.0 Calcolo degli input evitati	37
11.0 Monitoraggio agro-ambientale tramite sistemi IOT Agritech 4.0	41
11.1 Agritech 4.0 nell'attività apistica	41
11.2 Agritech 4.0 nell'attività foraggera	42
11.3 Agritech 4.0 e monitoraggio ambientale	42
11.4 Computo metrico estimativo della sensoristica IOT Agritech 4.0	43
12.0 Cronoprogramma dei lavori	44
13.0 Quadro economico riassuntivo delle opere agrarie	44
14.0 Opere di mitigazione, descrizione sommaria e computazione dei costi	45

## 1.0 Il progetto fotovoltaico

L'ipotesi progettuale verte sulla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra situato nel Comune di Lanuvio (Prov. Roma Capitale) che occupa una superficie agricola utilizzata (SAU) di ha 57,92 e raggiunge una potenza di picco di MW 60,90. L'obiettivo del progetto è quello di generare energia elettrica da fonte solare ovvero dalla principale e più importante fonte rinnovabile disponibile in natura integrandolo con la conduzione di attività agro-ambientali significative dal punto di vista ecologico, paesaggistico ed economico produttivo.




— Area interessata dall'impianto fotovoltaico

## 2.0 Contesto agroambientale

L'area oggetto di interesse è situata a 8 km a Sud-Sud Ovest dell'abitato di Lanuvio in loc. Macchia del Casale. E' accessibile da viabilità comunale (Via Campomorto) e possiede una giacitura parzialmente pianeggiante e parzialmente acclive con una modesta pendenza compresa fra 5° e 8°. E' caratterizzata da terreni agricoli coltivati, privi di particolari sistemazioni superficiali se non qualche scolina per la raccolta

e l'allontanamento delle acque meteoriche. Collocati ad una quota altimetrica compresa di circa 75 metri sul livello del mare, ricadono nel bacino imbrifero del Fosso della Ficoccia adiacente al confine ovest del sito d'intervento. Attualmente coltivati a seminativo, sono caratterizzati da un suolo agrario di buona fertilità caratterizzato da una tessitura variabile da medio impasto ad argilloso e limoso (entro i primi 120/180 cm) sovrastante depositi piroclastici (ceneri e pozzolane) limoso/debolmente sabbiosi risalenti al Pleistocene medio. Dal punto di vista idrologico la falda acquifera principale si colloca ad una profondità superiore a mt 30 dal piano campagna senza escludere, data la natura dei sedimenti pedologici, di falde superficiali sospese fra depositi di permeabilità differente.




○ Ubicazione impianto

■ Depositi prevalentemente limo-argillosi e pozzolane  
(Carta geologica - Regione Lazio - 2021)

La zona fitoclimatica nella quale è compresa la superficie considerata è la n° 12 della classificazione del Blasi caratterizzata da termotipo mesomediterraneo inferiore, ombrotipo subumido superiore, regione xeroterica (sottoregione mesomediterranea); la piovosità media annua è compresa fra 842 e 966 mm mentre la temperatura media annua è compresa fra 14,5 e 16,1 °C con un periodo di permanenza al di sotto dei 10°C di 2/4 mesi all'anno ed un periodo di potenziale aridità da maggio ad agosto.





○ Ubicazione impianto

■ Regione mediterranea - Termotipo mesomediterraneo inferiore - Ombrotipo subumido superiore - Regione xeroterica  
(*Carta del fitoclima del Lazio - C. Blasi - 1994*)

La ventosità è limitata (3,1/3,6 m/s) ed generalmente proveniente da ovest - ponente (per 8,5 mesi/anno) e da est - levante (per 3,7 mesi/anno).

Dal punto di vista agroambientale, l'area interessata dall'impianto si colloca nel punto d'incontro fra un territorio particolarmente antropizzato, in quanto prossimo all'abitato di Aprilia (LT), dove l'uso del suolo è caratterizzato dalla presenza di aree urbanizzate (civili abitazioni, fabbricati commerciali e di servizi), da un sistema viario fitto e articolato ed aree agricole dedicate a colture agrarie. Risultano residuali i territori naturali o paraturali costituiti unicamente dalla diffusa rete *Fossi* caratterizzati da vegetazione spondale più o meno consistente. Le superfici coltivate sono dedicate alla produzione specializzata ed estensiva di seminativi (prevalentemente cereali e proteiche) e soprattutto colture arboree come l'actinidia ed i vigneti. L'evoluzione di questo contesto territoriale ha portato inevitabilmente ad una semplificazione delle componenti vegetazionali (sia erbacee che arboree ed arbustive) e del livello di biodiversità. Come già citato la presenza di superfici boschive è quasi relittuale, relegata agli ambiti ripariali lungo i fossi ed è assente lungo le linee di confine fra i poderi.

Il fitoclima locale è favorevole all'insediamento delle seguenti specie arboree: cerro - *Quercus cerris* L., farnietto - *Quercus farnietto* Ten., leccio - *Quercus ilex* L., sughera - *Quercus suber* L., farnia - *Quercus robur* L., carpino bianco - *Carpinus betulus* L., alloro - *Laurus nobilis* L., ciavardello - *Sorbus torminalis* L., nespolo - *Mespilus germanica* L., olmo - *Ulmus minor* Mill., frassino - *Fraxinus oxycarpa* M- Bieb. e salice - *Salix alba* L. e dei seguenti arbusti e cespugli: cisto - *Cistus salvifolium* L., clematide fiammella - *Clematis flammula* L., biancospino - *Crataegus monogyna* Jacq., citiso trifloro - *Cytisus villosus* Pourret, mirto - *Myrtus communis* L., ilatro - *Phillyrea latifolia* L., robbia selvatica - *Rubia peregrina* L., cervone - *Smilax aspera* L.. In realtà, come già accennato, la composizione vegetazionale è stata nel tempo sensibilmente semplificata e modificata riducendo la numerosità delle specie allignanti e l'estensione delle macchie da esse popolate. Attualmente si riscontra sul terreno una notevole frequenza (fra le arboree) di olmo, frassino, farnietto, di meno il leccio ed anche l'acero campestre e l'acacia; fra i cespugli ed arbusti si nota di frequente il biancospino ed anche il corniolo, l'oleandro ed il rovo.

In passato era frequente la presenza di una pianta caratteristica e simbolica come la quercia da sughero ai lati delle strade oppure di esemplari isolati nella campagna (reliitto di impianti per la produzione di sughero o boschi naturali) in quanto resistenti alla siccità ed alla calura estiva (*La flora dei Castelli Romani - 2006*). Ad oggi è difficile apprezzarne la presenza.

In sintesi si tratta di un comprensorio intaccato, nell'arco del tempo, dall'attività antropica dove l'attività agricola (anche osservando un'area più vasta) occupa gli spazi liberi compresi fra numerose aree urbanizzate ed è necessariamente organizzata per ricercare la miglior resa produttiva possibile al fine di ottenere una redditività accettabile.

### **3.0 Partenariati di progetto**

Il fondo destinato alla realizzazione dell'impianto è di proprietà ed è coltivato da Cappelli Fabio imprenditore agricolo a titolo principale. Quest'azienda conduce una superficie complessiva di circa 100 ettari irrigabili, coltivati a seminativi (cereali autunno vernini come il frumento, foraggiere fra cui erbai annuali spontanei e seminati), colture frutticole (actinidia, certificata Globalgap) ed in minima parte anche orticole secondo le richieste di mercato (cocomero). Particolarmente dotata di attrezzature per la gestione delle lavorazioni agronomiche l'azienda Cappelli è orientata all'innovazione e soprattutto alla gestione della filiera produttiva con metodi sostenibili dal punto di vista ambientale attuando specifiche tecniche agronomiche come:

- minima lavorazione del terreno (minimum tillage) mediante l'uso del ripuntatore combinato con erpice rotante per ridurre l'eccessiva lavorazione e il continuo rivoltamento degli orizzonti pedologici superficiali specie ai fini della preparazione del letto di semina delle colture; l'attuazione di questa tecnica consente di evitare in maniera decisiva la crescita delle infestanti evitando il ricorso al diserbo chimico;
- interrimento dei residui colturali delle foraggiere al fine di arricchire il suolo di sostanza organica, di azoto naturale, aumentarne la capacità di ritenzione idrica e favorire il sequestro di carbonio nel suolo.

La collaborazione fra lo sviluppatore del progetto fotovoltaico e l'azienda Cappelli pone le premesse per un ottimale partenariato che potrebbe proseguire, oltre il semplice affidamento del terreno, anche per

assicurare nel tempo la manutenzione del suolo (comunque da coltivare) tramite la sottoscrizione di un accordo bilaterale da definire al momento opportuno. L'azienda è già dotata infatti di macchine ed attrezzature per la coltivazione di colture foraggere che caratterizzeranno l'uso del suolo dopo la costruzione dell'impianto e conosce il mercato di questo genere di prodotto commercializzabile "in piedi" nella filiera zootecnica locale caratterizzata da allevamenti bovini, bufalini e seppur con minore frequenza, ovini.

Ulteriori collaborazioni col tessuto produttivo agricolo locale potranno essere attivate nel caso si rendesse necessario l'apporto di contoterzisti per l'effettuazione di lavorazioni specifiche (es.: sfalcio e imballaggio) allargando l'indotto economico derivante dalla gestione dell'area dedicata all'impianto fotovoltaico. Esso costituisce infatti un'opportunità importante per facilitare l'approvvigionamento di fieni ad alto valore nutritivo e prodotti secondo criteri di agricoltura integrata (come descritto nei successivi paragrafi) contribuendo a ridurre i costi di produzione nell'ambito della filiera zootecnica costantemente colpita da criticità economica.

I partenariati che potranno svilupparsi nel contesto descritto rendono questo progetto decisamente virtuoso in quanto in grado di ottenere una serie di risultati significativi sotto il profilo della sostenibilità nei termini più concreti possibili:

- produzione di energia rinnovabile da fonte solare, la più importante fonte di energia pulita disponibile ad libitum;
- prosecuzione dell'attività di produzione agricola con coltivazioni ecosostenibili (SQNPI);
- integrazione tecnico-economica della filiera zootecnica locale;
- assoggettabilità a possibili contribuzioni per superficie (PSR/PAC) di una superficie di oltre 60 ettari.

#### **4.0 Caratteristiche del progetto agri-fotovoltaico**

Il progetto agri-fotovoltaico oggetto di interesse promuove l'integrazione fra la produzione di energia elettrica ottenuta da fonte rinnovabile (luce solare) tramite pannelli fotovoltaici e l'uso del sedime del medesimo impianto produttivo per lo svolgimento di attività agricole complementari volte a valorizzare il ruolo ecologico dell'area interessata dall'intervento. Va detto che queste tipologie impiantistiche realizzate mediante costruzione di pannelli montati su supporti metallici infissi nel terreno nudo, secondo una disposizione in filare, consente l'utilizzo delle corsie interfilari per attuare colture da reddito previa valutazione degli spazi disponibili e la necessità di mantenere indenni da danneggiamenti i pannelli fotovoltaici. A valle delle considerazioni fatte si è scelto di proporre nella fase di avviamento del progetto un modello agri-fotovoltaico volto a rilanciare il sito innanzitutto dal punto di vista ecologico sfruttando la riduzione dell'insistenza antropica generate dalla realizzazione dell'impianto e l'attuazione di attività agricole appartenenti a filiere ritenute economicamente minori, ma sicuramente più ricche di contenuto culturale, storico, di competenze agronomiche specialistiche e di un significativo ruolo ecologico. Un piccolo modello di agricoltura contenente il germe della sostenibilità economica strettamente legata con quella ecologica. L'area interessata dalla realizzazione degli impianti costituisce un elemento ambientale significativo in termini di estensione che nel medio lungo periodo (25/30 anni), potrà portare a ottenere

risultati decisamente apprezzabili equivalenti, di fatto, alla progressiva rinaturalizzazione di luoghi ecologicamente molto semplificati.

## **5.0 Orientamento delle politiche agro-ambientali dell'Unione Europea**

### **5.1 Il Green Deal europeo**

Nel dicembre 2019 la Commissione Europea ha dato avvio all'attuazione di una serie di misure finalizzate a raggiungere obiettivi estremamente importanti per portare l'UE a diventare il primo continente ad impatto climatico zero.

*"I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l'Europa e il mondo. Per superare queste sfide, il Green Deal europeo trasformerà l'UE in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, garantendo che:*

- *nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra*
- *la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse*
- *nessuna persona e nessun luogo siano trascurati.*

Per questi scopi e a seguito degli effetti dovuti alla pandemia da COVID-19 un terzo delle risorse economiche riferibili al piano per la ripresa NextGenerationEU e al bilancio settennale dell'UE finanzieranno il Green Deal europeo.

Forti e soprattutto vincolanti obiettivi che verranno tradotti in pratica attraverso un piano d'azione volto a:

- promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare
- ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento
- sostenere l'innovazione
- decarbonizzare il settore energetico


Nell'ambito del Green Deal europeo sono inoltre previste misure destinate specificamente all'agricoltura in quanto attività fortemente legata alla gestione dell'ambiente e del territorio (cfr. Biodiversity Strategy 2030, Farm to Fork).

Uno degli obiettivi primari dell'intera strategia riguarda la salvaguardia dei suoli e della sostanza organica in essi contenuta.

La sostanza organica del suolo, composta per circa il 60 per cento da carbonio organico, è una componente essenziale del suolo e del ciclo globale del carbonio. Nonostante rappresenti in percentuale solo una piccola parte del suolo (costituisce generalmente una percentuale compresa tra l'1 e il 5 per cento), controlla molte delle proprietà chimico-fisiche-biologiche del suolo e risulta l'indicatore chiave del suo stato di qualità.

La sostanza organica, infatti, favorisce l'aggregazione e la stabilità delle particelle del terreno, entrambe importanti ai fini della riduzione dell'erosione, del compattamento e della formazione di croste superficiali nei suoli. Inoltre, la presenza di sostanza organica nel suolo contribuisce a

immobilizzare la CO<sub>2</sub>, oltre a migliorare la fertilità del suolo e l'attività microbica che contribuisce alla disponibilità di elementi come azoto, carbonio, potassio e fosforo per le piante. In generale, il contenuto di carbonio organico dovrebbe essere superiore all'1 per cento nei suoli agrari per favorire l'assorbimento di elementi nutritivi da parte delle piante. Il 2% di Carbonio organico nel suolo viene considerato dall'UE il target minimo a cui puntare per assicurare fertilità ottimale dei suoli ed efficacia della strategia di riduzione della CO<sub>2</sub> nell'atmosfera tramite il trasferimento progressivo del carbonio nel suolo mediante adeguate pratiche agronomiche e l'attuazione di colture o piantagioni virtuose (es.: prati e boschi) definite "pozzi" di assorbimento del carbonio.



Da questo punto di vista, secondo la mappa europea della concentrazione di carbonio organico (fonte LUCAS Dataset - European Soil Data Centre) ovvero di sostanza organica nel suolo, la regione Lazio appare caratterizzata da concentrazioni prevalenti comprese fra 0,01 e 2,0% e più raramente > 2%. Il territorio più utilizzato dalle attività agricole risulta pertanto sofferente di sostanza organica in conseguenza della progressiva ossidazione dovuta alle tecniche agronomiche tradizionali (fatte di ripetute lavorazioni meccaniche con rimescolamento del suolo), alla coltivazione di colture esigenti in termini nutrizionali, che depauperano progressivamente il suolo stesso, al dilavamento conseguente alla carenza di copertura permanente del terreno. Un sistema produttivo che porta ad impiegare una quantità di input (specie fertilizzanti di sintesi chimica) sempre maggiore e palesemente sempre meno sostenibile. Per fornire un utile elemento di valutazione per capire quale metodo produttivo consenta di mantenere un buon equilibrio nutritivo nel suolo (in termini di sostanza organica, macro e micro nutrienti) si riporta un



caso concreto attraverso il report dell'analisi del suolo effettuata in un'azienda cerealicola zootecnica (con un allevamento di 300 capi di bovini da latte e 325 ettari di superficie coltivata) dove la rotazione agraria, cioè l'avvicendamento periodico delle colture e la concimazione organica sono di regola fin dal 1942, anno della fondazione della stessa. Dal documento si può evincere che il tasso di carbonio organico è ottimale al 1,95% e inoltre la dotazione di fosforo assimilabile e potassio scambiabile sono abbondanti, come il magnesio (fondamentale per ottimizzare la fotosintesi clorofilliana) ed il calcio scambiabile.

RAPPORTO DI ANALISI DEL SUOLO			
<b>CAMPIONE N.</b>	<b>GADS139871</b>	<b>SCHEDE AGRONOMICA</b>	159004
<b>DATA ANALISI</b>	06/06/18	<b>APPEZZAMENTO TESA</b>	LUNGA
<b>DA RESTITUIRE A</b>	C01599374	<b>LAT.</b>	LONG.
		<b>SUPERFICIE (ha)</b>	17,00
		<b>COLTURA PRECEDENTE</b>	Mais trinciato
		<b>CONCIMI DISTRIBUITI (kg/ha)</b>	N 0 P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 0 K <sub>2</sub> O 0
		<b>FERTILIZZANTI ORGANICI DISTRIBUITI</b>	
		<b>Dig. TQ</b>	(g/ha) 300
<b>33075 MORSANO AL TAGLIAMENTO PN</b>		<b>DATA CAMPIONAMENTO</b>	28/03/18
<b>PRELEVATO DA TECNICO</b>			
<b>TEL. CELLULARE</b>			
<b>GRANULOMETRIA</b>	Ø		
Scheletro (> 2 mm)	0 %	Assente	
Sabbia (2.0 - 0.05 mm)	25,5 %		
Limo (0.05 - 0.002 mm)	53,3 %	(Limo Grosso 13,7% Limo Fine 39,6%)	
Argilla (< 0.002 mm)	21,2 %		
Tessitura (secondo classificazione USDA)	FRANCO-LIMOSA (50)		
<b>PARAMETRI ANALITICI</b>			
pH (H <sub>2</sub> O)	7,9	Subalcalino	
Calcare totale	42,3 %	Fortemente calcareo	
<b>Carbonio organico</b>	<b>1,95 %</b>		
Rapporto C/N	11,5	Equilibrato	
Rapporto Ca/Mg	7,9	Medio	
Rapporto Mg/K	4,3	Medio	
Azoto totale	1,70	g/kg	
Fosforo assimilabile	42,8	ppm P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	
Potassio scambiabile	224,4	ppm K <sub>2</sub> O	
Sostanza organica	3,37	%	
CSC Calcolata	20,3	meq/100g	
Ca scambiabile	3292,6	ppm Ca <sup>2+</sup>	
Mg scambiabile	251,5	ppm Mg <sup>2+</sup>	
Na scambiabile	16,4	ppm Na <sup>+</sup>	
		<b>Dotazione</b>	
		BASSA MEDIA ALTA MOLTO ALTA	
<b>QUOTA DISPONIBILE DAL CAMPO</b>	<b>NOTE CONCIMAZIONE FOSFORO POTASSIO</b>	<b>NOTE DEL SERVIZIO AGRONOMICO PIONEER</b>	
<b>N</b> 72 kg/ha	<b>DOSE ARRICCHIMENTO FOSFORO</b> Non aggiungere dose di arricchimento nei prossimi anni		
<b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b> 93 kg/ha	<b>DOSE ARRICCHIMENTO POTASSIO</b> Non aggiungere dose di arricchimento nei prossimi anni		
<b>K<sub>2</sub>O</b> 307 kg/ha			



Questo assetto permette di evitare ogni anno a quest'azienda l'impiego di input chimici pari a 90 t di concimi chimici azotati e concimi fosfo-potassici per un valore economico complessivo di circa 40.000 Euro/anno. L'azienda agraria cerealicola zootecnica (correttamente dimensionata e gestita) rappresenta un esempio di virtuosità ambientale, legata da sempre al concetto di circolarità ecologica: tanto viene raccolto in campo (foraggi e granelle) e tanto viene restituito al medesimo sotto forma di sostanza organica. Purtroppo però, le aziende agricole cerealicola-zootecniche sono ormai una rarità e l'equilibrio del contenuto di sostanza organica e nutrienti naturali non è possibile mantenerlo come accade probabilmente anche nei suoli del sito oggetto di interesse.

Il Green Deal europeo per l'agricoltura si pone inoltre il raggiungimento entro il 2030 di ulteriori e

significativi obiettivi come:

- la riduzione del 50% dell'uso di fitofarmaci
- la riduzione del 20% dei fertilizzanti chimici
- l'attuazione di pratiche agronomiche sostenibili (lavorazioni poco profonde, la conversione della terra arabile in colture di copertura mediante creazione di ampi prati e l'attuazione del sovescio)
- l'utilizzo di ammendanti organici di origine ligno-cellulosica (es: letame o digestato da biogas agricolo, S.O. pellettata)
- creazione di "pozzi" di assorbimento del carbonio grazie alla realizzazione di ampie e superfici prative e alla piantagione intensiva di piante arboree nell'ambito delle fasce dedicate alla mitigazione.

## **5.2 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

Il PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta il progetto per il rilancio dell'economia italiana varato per superare la crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19. La Missione 2 del PNRR è intitolata "Rivoluzione verde e transizione ecologica" che riguarderà anche il settore primario attraverso azioni finalizzate allo sviluppo di filiere agroalimentari sostenibili, l'incremento della produzione di energie rinnovabili, l'innovazione dei processi produttivi.

## **5.3 Il Programma di Sviluppo Rurale 2021/2028**

Il PSR 2021/2028 è lo strumento normativo mediante il quale vengono concretamente sostenuti sul territorio (attraverso fondi UE, nazionali e regionali) gli investimenti delle imprese agricole orientandole di fatto verso il raggiungimento di obiettivi strategici. Avviata la nuova programmazione settennale 2021/2028, i nuovi obiettivi del PSR convergono verso l'introduzione di cambiamenti strutturali nelle zone rurali, in linea con il Green Deal europeo, per raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici e ambientali della "Strategia sulla Biodiversità" e della "Strategia Farm to fork". Ai fondi del PSR verranno aggiunti quelli addizionali NGEU - Next Generation EU, secondo le strategie del PNRR, finalizzati ad accelerare il superamento della crisi generata dalla pandemia nel settore agricolo secondo la seguente ripartizione:

- 8% per il sostegno di misure esistenti riguardanti i raggiungimenti di requisiti minimi di sostenibilità ambientale;
- 37% sostegno alla transizione ecologica tramite incentivazione della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dall'agricoltura; conservazione del suolo, compreso l'aumento della fertilità del suolo mediante sequestro del carbonio; miglioramento dell'uso e della gestione delle risorse idriche, incluso il risparmio di acqua; creazione, conservazione e ripristino di habitat favorevoli alla biodiversità; riduzione dei rischi e degli impatti dell'uso di pesticidi e antimicrobici;
- 55% innovazione e transizione digitale mediante l'incentivazione, fra l'altro, di interventi che promuovano lo sviluppo economico e sociale nelle zone rurali e contribuiscano a una ripresa resiliente, sostenibile e digitale, in particolare anche grazie all'innovazione, la produzione di energie rinnovabili,

sviluppo di economia circolare e bioeconomia.

In conclusione, pare chiaro che le politiche agro-ambientali dell'Unione Europea e di conseguenza dell'Italia, sia nel breve che nel lungo periodo, saranno fortemente indirizzate verso l'incremento della sostenibilità ambientale e dell'innovazione del settore primario; una spinta decisamente poderosa che vedrà l'avvio di modelli di sviluppo ad oggi inconsueti o non ancora applicati seppure utili all'ambiente e alla comunità.


#### 5.4 - PAC - Politica Agricola Comune - UE

Nella programmazione 2023-2027 della PAC, principale strumento di orientamento dell'agricoltura nell'ambito dell'Unione Europea (tramite contribuzioni "per superficie"), sono in via di definizione nuovi ed accresciuti impegni ambientali a carico degli agricoltori. Le buone prassi agronomiche passeranno infatti da 7 a 9 e verrà sostanzialmente vietato il ricorso alla monosuccessione. Uno degli aspetti più significativi della nuova PAC è però il riconoscimento del ruolo del riposo colturale combinato con attività di valenza ecologica. Verrà infatti istituita la Bcaa n° 8 (Buona condizione agronomica ambientale) volta a destinare il 4% della superficie a seminativo aziendale (escluse le foraggere) alla creazione di aree ecologiche attraverso il ritiro dalla produzione e al mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio. A questi fini vengono esentate dall'obbligo quelle aziende che coltivano piante erbacee da foraggio permanenti (es.: erba medica) che già svolgono un importante ruolo nell'ecosistema agrario (*Terra e Vita* - 21/02/2022).

#### 6.0 Cenni sulla situazione socio-economica del settore primario della regione Lazio

Il potenziale produttivo del settore agricolo è strettamente correlato con la superficie di terreno utilizzabile ai fini produttivi (SAU - Superficie Agricola Utilizzata). I dati disponibili più recenti indicano che in Lazio essa ammonta ad ettari 610.288 destinata a un'estesa tipologia di colture come rappresentato nella tabella che segue

Utilizzazione del suolo agricolo, per tipologia di coltivazione in ettari di SAU, anno 2016 (%)



(fonte: *L'agricoltura nel Lazio in cifre - 2021* - CREA - Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia).

I dati esposti indicano che le colture di pregio, quelle specializzate, con una redditività più significativa (es.: orticole, oliveti, vigneti, frutteti e vivai) incidono solo per il 18% sul totale della SAU in quanto gran parte di essa è dedicata alle colture a seminativo (77%). Delle 68.295 imprese agricole operanti in ambito regionale la netta prevalenza (94%) è rappresentata da piccole aziende costituite da imprese individuali, dirette coltivatrici con manodopera familiare o prevalentemente familiare. Questo tessuto produttivo (seppure in sensibile declino, che ha visto una riduzione del numero di aziende del 24% nel triennio 2013/2016) è in fase di profonda trasformazione grazie al ricambio generazionale e ai giovani neoimprenditori che ricorrono a forme di gestione aziendale di tipo manageriale o comunque in forma aggregata (es.: in cooperativa). Un orientamento embrionale seppure positivo che combinato con l'introduzione di nuove tecnologie produttive dovrebbe contribuire al disimpegno progressivo dalla produzione di sole materie prime (specialmente di cereali e semi oleosi) atavicamente legata alle criticità di mercato tipiche delle commodity con alti costi di produzione e prezzi di vendita minimi e molto volatili. Un sistema produttivo tendenzialmente comunque fragile che, unitamente alle difficoltà del settore zootecnico che ha visto una riduzione del patrimonio dei capi allevati del 4,30% (2016/2020), pone nelle condizioni gli imprenditori di valutare necessariamente nuove forme di attività economiche remunerative in modo certo e nel lungo periodo.

### **7.0 Politica ecologica del parco agri-fotovoltaico**

Il progetto agri-voltaico è stato realizzato in aderenza alle politiche agro-ambientali citate al par. 5.0 intendendo trasformare i parchi fotovoltaici in vere e proprie isole di riequilibrio agro-ecologico nelle quali si svolgono attività antropiche a bassa intensità (pochi interventi agronomici), limitati apporti di input esterni, creazione di valore ecosistemico e di biodiversità (postazioni apistiche abbinate alla coltivazione di prati nettariferi), alto valore socio economico attraverso forme di agricoltura di nicchia molto specializzata (produzione apistica).

Se da un lato le correnti prevalenti di pensiero, attualmente alla base della progettazione di queste forme di investimento volte alla produzione di energia elettrica rinnovabile da fonte solare, puntano all'integrazione con attività complementari che ne aumentino il potenziale di sostenibilità ambientale complessiva (secondo forme decisamente diversificate) dall'altro sono molte le tracce scientifiche che accreditano la validità del metodo.

Uno spunto in tal senso proviene da un interessante studio di metanalisi intitolato "Opportunità per migliorare la biodiversità degli impollinatori nei parchi fotovoltaici" svolto dall'Università di Lankaster (UK), dal Centro inglese per la ricerca agroambientale ed altri partner (Opportunities to enhance pollinator biodiversity in solar parks - Blaydes, H., Potts, S.G., Whyatt, J.D. & Armstrong, A. - Nov. 2019). Sono stati analizzati 185 articoli scientifici di provenienza internazionale pubblicati dal 1945 al 2018 con la finalità di studiare gli effetti degli impianti fotovoltaici realizzati a terra in ambiti caratterizzati da diverse tipologie di uso del suolo. Uno studio interessante che, sulla base di quanto già valutato in esperienze del passato, consente di aggregare le informazioni e fornire un'analisi predittiva

sugli effetti della diffusione di una tecnologia destinata a diventare la principale fonte di energia rinnovabile nel breve periodo. Se implementati e gestiti in modo strategico, i parchi solari possono offrire opportunità importanti per migliorare l'ambiente locale e favorire la biodiversità, specialmente nei casi in cui la conversione dell'uso del suolo verso il fotovoltaico riguarda le superfici agricole. Gli effetti della conversione vengono di seguito sintetizzati.

- Diversificazione delle fonti di foraggiamento dei pronubi. La ricchezza di essenze floreali (erbacee ed arbustive), la quantità di fiori singoli/infiorescenze disponibili, la presenza diffusa di ricompensa in termini di polline/nettare determinano un positivo impatto sulla presenza e la diffusione degli impollinatori (es.. bombi, api, farfalle, sirfidi) nel 93% degli studi analizzati. La variabilità di foraggiamento (erbacea ed arbustiva) influisce inoltre positivamente sulla riproduzione ovvero sulla produzione di nidi e lo sviluppo delle larve durante il ciclo di accrescimento di talune specie. L'attività di gestione delle essenze dedicate al foraggiamento dei pronubi (es.: prati polifiti) a bassa intensità (2-3 sfalci all'anno) favoriscono ulteriormente la diversificazione delle famiglie di impollinatori variando l'habitus vegetativo dei vegetali favorendo di volta in volta gli impollinatori secondo le specifiche abitudini.

- Diversificazione del territorio e rinaturalizzazione. La diversificazione del paesaggio attraverso la ricostituzione di ambiti semi naturali, di ampia dimensione (da un raggio di m 250 a km 5), eterogenei rispetto al contesto (caratterizzato da terreni coltivati), aumenta la disponibilità di risorse critiche di foraggiamento, di habitat adatti per la riproduzione, riduce la distanza per l'approvvigionamento di dette specifiche risorse. In questo senso diventa importantissima la presenza di superficie prative polifite integrate da elementi lineari costituiti da piante arboree, siepi, specialmente al margine delle ampie aree prative per moltiplicare la diversificazione degli habitat favorendo il flusso degli insetti dall'uno all'altro che incide direttamente sul rafforzamento dei comportamenti (minore suscettibilità alle perturbazioni ambientali, riduzione della consanguineità, aumento della variabilità genetica e riduzione del pericolo di estinzione delle colonie).

- Microclima. Gli habitat che offrono variazioni nella struttura della vegetazione o nella topografia forniscono una gamma di condizioni termiche per gli impollinatori che possono essere sfruttate per sopperire ai cambiamenti climatici e quindi una varietà di microclimi potrebbe fungere da rifugio per gli impollinatori dal riscaldamento climatico.





Lo studio conclude con una serie di azioni destinate a gestire correttamente la progettazione e il mantenimento dei parchi fotovoltaici al fine di aumentare la biodiversità e favorire lo sviluppo di una molteplicità di specie di impollinatori utili per svolgere un servizio ecosistemico locale a vantaggio delle specie vegetali agrarie comprese:

1) semina estesa di un mix di specie erbacee specifiche (nettarifere) ed eventuale risemina negli anni per assicurare la diversificazione del foraggiamento;

1.1) favorire la fioritura scalare e comunque ripetuta delle specie utilizzate per garantire disponibilità nell'arco dell'anno di foraggiamento dei pronubi;

2) creazione di habitat diversificati (con specie erbacee, cespugliose ed arboree) per favorire la nidificazione e la riproduzione;

3) mantenere limitato il numero degli sfalci delle aree prative per assicurare la disponibilità di foraggiamento e ridurre la presenza antropica;

3.1) sfalciare se possibile in periodi diversi a file alterne per assicurare la variabilità della statura della vegetazione erbacea;

3.2) ridurre al minimo l'uso di prodotti agrochimici;

4) creare elementi lineari plurispecifici composti da essenze arboree, cespugliose ed arbustive lungo i margini del campo fotovoltaico;

4.1) inserire preferibilmente i parchi fotovoltaici nell'ambito di contesti utilizzati dall'agricoltura in quanto generatori di aree semi naturali utili quali rifugio per gli insetti impollinatori

5) creare variabilità di habitat per favorire la difesa dalle variazioni microclimatiche.

Seppure lo studio riguardi specificamente l'interazione fra campi fotovoltaici a terra e pronubi, è giusto sottolineare quanto gli effetti di una strategia integrata come quella descritta porti al miglioramento delle interazioni fra l'ambiente semi naturalizzato dei campi fotovoltaici e le ulteriori forme di vita.

### **7.1 Modalità di attuazione delle politiche agroambientali nel parco fotovoltaico.**

Il progetto dell'impianto fotovoltaico oggetto di interesse, prevede l'attuazione di una serie di azioni che puntano innanzitutto a convertire l'attuale uso del suolo (caratterizzato da terreno agrario soggetto a coltivazione intensiva) verso colture che comportino la riduzione degli elementi critici che incidono sull'ambiente promuovendo un nuovo equilibrio ecologico.

Innanzitutto, si prevede la progressiva riduzione della pressione antropica e la riduzione al minimo di ogni input rilevante mediante:

- contenimento della presenza fisica dell'uomo;
- impiego limitato di mezzi agricoli a motore con relative attrezzature e inoltre di dimensioni più contenute;
- distribuzione di input (diserbanti, prodotti fitosanitari, concimi chimici) solo in caso di effettiva necessità dopo una valutazione delle soglie di intervento;
- adozione dei criteri di produzione integrata previsti dallo standard SQNPI “Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata” di cui al DM 4890/2014 e dai relativi disciplinari.



Si intende inoltre agire sul miglioramento della qualità del suolo mediante le seguenti attività di tipo agronomico:

- recupero della fertilità naturale riavviando il ciclo della sostanza organica volto a migliorarne la dotazione negli orizzonti attivi, la micro/macro porosità, lo scambio gassoso con l'atmosfera, la capacità di ritenzione idrica naturale e l'ecosistema microbiologico (microbiota) del suolo stesso;
- riduzione della compattazione degli orizzonti superficiali;
- metabolizzazione progressiva di eventuali residui di prodotti chimici accumulati nel tempo a seguito della coltivazione intensiva;
- aumento dell'accumulo di sostanza organica e quindi di carbonio nel terreno;
- riduzione dell'uso dell'acqua.

Si prevede infine l'attuazione di colture ed attività produttive che contemperino in maniera ottimale le esigenze finora descritte.


Il modello proposto punta pertanto ad integrare le tecnologie per la generazione energetica da fonti sostenibili, tramite fotovoltaico a terra, con opere di diversificazione ambientale ed attività agricole di

nicchia, ma di alta specializzazione e di valore ecologico. A seguito della realizzazione dell'impianto e delle opere correlate si prevede l'avvio di un'attività di monitoraggio, preferibilmente in collaborazione con enti di ricerca specializzati, al fine di poter valutare gli effetti nel lungo periodo di questa sostanziale rinaturalizzazione di ampie porzioni di territorio agrario sia rispetto a parametri biologici (censimento e frequenza delle specie di insetti pronubi, presenza di frequenza di altre specie animali come microfauna e avifauna) che chimico-fisico (tasso di SO nel suolo, capacità di ritenzione idrica, fertilità del suolo generale).

## 7.2 Integrazione delle attività agricole nel campo fotovoltaico a terra

La realizzazione di un impianti fotovoltaico a terra è caratterizzato dall'installazione di inseguitori solari monoassiali ovvero ampi pannelli montati su supporti metallici infissi nel terreno, senza necessità di alcun basamento, posti in filari paralleli con orientamento nord-sud e distribuiti nell'ambito di una determinata superficie. I pannelli, opportunamente comandati tramite specifici software, ruotano progressivamente sull'asse longitudinale seguendo istantaneamente la posizione del sole onde assorbire la massima quantità di energia.

**7.2.1 L'impianto.** Nel caso specifico si prevede la posa in opera di pannelli la cui altezza raggiungerà un massimo di m 4,70 (alla massima inclinazione), una distanza media fra pannello e pannello di m 3,50 (in posizione orizzontale) e una distanza fra supporto e supporto di m 8,25.



Sezione trasversale

L'integrazione di un impianto fotovoltaico con le attività di coltivazione deve essere preliminarmente valutata tenendo conto dei seguenti aspetti: l'incidenza dell'opera sui parametri climatici e le modalità di meccanizzazione delle lavorazioni agronomiche.

### **7.2.2 I parametri climatici**

La luce. Come ampiamente noto le piante (esseri viventi autotrofi) si sviluppano grazie ad un eccezionale processo biochimico costituito dalla fotosintesi clorofilliana attraverso il quale vengono sintetizzati polisaccaridi che vanno a costituire le pareti cellulari dei tessuti vegetali consentendone l'accrescimento. E' l'unico processo biochimico in grado di trasformare materia inorganica (acqua e anidride carbonica) in materia organica (tessuti vegetali, biomassa). E da essa consentire agli organismi eterotrofi (animali) di cibarsene dando struttura decisiva alla catena alimentare.

Alla base della fotosintesi clorofilliana è altrettanto noto che vi è la luce solare ovvero la radiazione solare entro un intervallo ben definito compreso fra 400 e 700 nm (lunghezza d'onda della fotosintesi attiva) che colpisce le pagine fogliari degli organismi vegetali innescando tale processo. Lo spettro luminoso utile diretto è pari al 40% della radiazione globale tenuto conto che un 25% di esso viene comunque riflesso. Inoltre la radiazione diretta rappresenta il 50% del totale che raggiunge il suolo mentre il rimanente 50% è rappresentato da radiazione diffusa ovvero priva di una direzione prevalente.

Questa premessa giova a dimostrare che le colture agrarie si sviluppano normalmente in un contesto ove la luce è sia diretta che diffusa. Un tanto perchè alla base della possibilità di integrare coltivazioni agrarie erbacee ed impianti fotovoltaici a terra vi è proprio la tipologia di "ambiente luminoso" che si viene a creare al di sotto delle attrezzature fotovoltaiche, dei "pannelli".

I filari di pannelli incidono sulla quantità di radiazione diretta riducendola in funzione della distanza fra i filari stessi, dell'orientamento longitudinale, della stagione e dell'ora diurna. Aumenta invece la luce diffusa ovvero riflessa dagli stessi pannelli. L'orientamento longitudinale dei filari di pannelli e l'applicazione della tecnologia ad inseguimento (che consente la rotazione dei medesimi per raccogliere il massimo di energia dal sole durante l'intero arco del giorno) massimizzano la penetrazione della luce al suolo durante il periodo primaverile estivo.

Le specie vegetali che giungono al picco produttivo in questo periodo vi sono sicuramente le grandi colture a seminato eliofile, con un elevato fabbisogno di luce, come i cereali (il mais in particolare), le proteaginose (la soia), le piante da frutto (es.: melo, pero, pesco), l'olivo e la vite. Mentre nella stessa epoca trovano uno stato produttivo ottimale anche le importantissime specie sciafile (con minore fabbisogno luminoso) come le piante da fibra ovvero le foraggere. Grazie alle tecniche agronomiche, le foraggere vengono in genere seminate con un'elevata densità per creare artificialmente un ambiente luminoso sub-ottimale tale da favorire (grazie alla maggior produzione di auxine - ormoni della crescita) la distensione degli steli e quindi una maggior quantità di biomassa prodotta.

La temperatura. Uno dei problemi climatici più evidenti, percepiti nettamente da chiunque negli ultimi 30 anni, è dato dalle variazioni climatiche con particolare evidenza nelle temperature medie che hanno segnato, a livello globale, un innalzamento di 1,5 °C (GISS NASA) che si traduce in inverni miti e

soprattutto estati molto calde con frequenza di colpi di calore. Questi ultimi, abbinati a prolungate siccità, ma non solo e non sempre, stanno mettendo a repentaglio l'intera flora endemica nostrana. Osservando con attenzione le specie arboree si nota ormai in maniera ricorrente il disseccamento, in piena estate, dei ciliegi selvatici, delle roverelle, degli olmi e il deperimento addirittura delle acacie. Sta venendo progressivamente meno un vero e proprio patrimonio vegetazionale.

Al di sotto di un impianto fotovoltaico a terra è prevedibile una riduzione della T di circa 3-4°C dovuto all'ombreggiamento generato dai pannelli a cui si aggiunge una probabile modificazione del tasso di umidità relativa specie la mattina (maggiore) e verso sera (minore). Questa condizione microclimatica consente di rendere favorevole la coltivazione sia di specie microterme (colture autunno vernine come frumento, orzo e foraggiere graminacee) sia quelle macroterme (colture primaverile estive come mais, soia, erba medica e trifoglio) che sfrutterebbero un ambiente più riparato dagli effetti dei colpi di calore e comunque delle temperature più elevate.

L'ombreggiamento prodotto dai pannelli fotovoltaici rappresenta un utile ausilio per la difesa delle colture sottostanti dagli eccessi termici e allo stesso tempo uno strumento per valutare nel lungo periodo il grado di contenimento dei danni da eccesso di calore sulle colture agrarie praticabili nei campi fotovoltaici.

### **7.2.3 La meccanizzazione**

Come già accennato il livello di meccanizzazione delle colture agrarie attuate nell'ambito di un impianto fotovoltaico a terra è variabile secondo le caratteristiche della coltura. La dimensione degli spazi disponibili nell'interfilare generata dall'altezza dei pannelli, dalla distanza fra i sostegni combinata con la necessità di evitare l'urto delle infrastrutture, impone scelte diverse.

Le lavorazioni agromeccaniche normalmente necessarie per la coltivazione di seminativi possono essere sommariamente così sintetizzate:

- concimazione chimica o organica del terreno (1)
- aratura o ripuntatura per il dissodamento del suolo e l'interramento del concime (2)
- frangizollatura (1)
- semina (1)
- trattamenti fitosanitari (1)
- raccolta con mietitrebbiatura (3)

oppure nel caso delle foraggiere:

- sfalcio con fanciaccondizionatrice (1)
- ranghianatura per il rivoltamento e l'essiccazione naturale del fieno, andanatura (1)
- imballaggio (2)
- raccolta (1)

Nel caso infine delle colture legnose (frutta, olivo e vite) le operazioni colturali salienti sono:


- concimazioni (1)
- trattamenti fitosanitari (2)



- raccolta meccanica (nel caso della vite e dell'olivo) (3)

Gli interventi di tipo (1) possono essere effettuati con trattrici di limitata potenza e dimensioni in quanto destinate al traino di attrezzature relativamente ingombranti e pesanti. Nel caso delle attività di tipo (2) la trattrice deve possedere potenza e dimensioni maggiori in quanto soggetta a maggior sforzo dovendo trainare attrezzature più impegnative. Infine le attività di tipo (3) dedicate alla raccolta meccanica dei prodotti, devono essere realizzate con macchine di dimensioni ben maggiori e certamente incompatibili con gli spazi disponibili negli interfilari dell'impianto fotovoltaico.

Pertanto il modello di meccanizzazione delle attività di coltivazione all'interno di un impianto fotovoltaico si ritiene compatibile con quello attinente alle coltura a seminativo in primis e da fienagione in particolare.



Ingombro di una trattrice di media/elevata potenza (125/180 CV)

#### 7.2.4 Sintesi delle modalità di integrazione

Dall'analisi svolta, emerge che la coltivazione del suolo impegnato da un impianto fotovoltaico e l'impianto stesso sono integrabili seppure con alcune limitazioni dovute agli spazi disponibili fra i pannelli e per le condizioni microclimatiche che si creano al di sotto dei medesimi. In particolare si ritiene decisamente disagiata la coltivazione di piante legnose come l'olivo, la vite e i fruttiferi in genere da un lato per la ristrettezza degli spazi disponibili (insufficienti per l'attuazione di un ottimale sistema di allevamento delle piante e per manovrare in maniera razionale con mezzi dedicati come atomizzatori a recupero, vendemmiatrici, scuotitrici meccaniche) e dall'altro per l'effetto di ombreggiamento indotto dall'impianto che provocherebbe ritardi di maturazione, parametri di qualità meno performanti come grado zuccherino e colorazione dei frutti. Inoltre, certi fruttiferi non potrebbero essere protetti dalla grandine con reti impossibili da montare. Non si considera peraltro praticabile neppure la coltivazione di

certe colture a seminativo come il grano o il mais in quanto, seppure di facile meccanizzazione, non consentirebbero l'ottimizzazione dei costi di produzione causa probabile rilevanza dei tempi morti dovuti alla necessità di rallentare i ritmi di lavoro per evitare danneggiamenti ai pannelli moltiplicati dalla numerosità di operazioni colturali da effettuare nell'arco della stagione produttiva. Soprattutto, le macchine per la raccolta (le mietitrebbie) non disporrebbero di spazi sufficienti per effettuare la raccolta. Inoltre, nel caso del mais, l'ombreggiamento ne ridurrebbe considerevolmente la capacità vegetativa e la produttività.

Diversa conclusione si può trarre nel caso in cui si ricorra alla coltivazione di foraggere di specie annuali e poliennali i cui vantaggi vengono di seguito elencati:

- l'accrescimento e la produttività vengono favoriti dall'ombreggiamento dei pannelli;
- la gestione meccanica risulta molto più semplice, realizzabile con macchine di dimensioni più contenute e da impiegare con frequenza più limitata;
- consentono un'accessibilità continua al fondo di persone e mezzi, durante tutto l'arco dell'anno, per assicurare la manutenzione e la pulizia dei pannelli nonché l'intervento rapido in caso di guasti o di emergenze in tutti i punti del medesimo grazie al consolidamento del terreno svolto dal tappeto di profondi ed intrecciati apparati radicali.

Inoltre le specie utilizzate, scelte fra quelle maggiormente nettariifere, possono svolgere un ruolo essenziale nell'ambito del ciclo produttivo del miele e dei prodotti complementari dell'attività apistica.

### **7.2.5 Scelta delle colture e delle attività agricole**

In questo contesto e tenuto conto che uno degli obiettivi di questo progetto è anche quello di consentire all'interno dell'impianto fotovoltaico lo svolgimento di attività agricole ed anche di servizi ecologici, sono state individuate 2 attività agricole in linea con le politiche agro-ambientali del Green Deal europeo e delle strategie di sostenibilità alla base della realizzazione dei parchi fotovoltaici in quanto ecologicamente miglioratrici, economicamente significative e promotrici di un modello di sviluppo innovativo così rappresentate:

- coltivazione estensiva di un miscuglio di essenze erbacee foraggere nettariifere sull'intera superficie dell'impianto;
- creazione di postazioni apistiche per la produzione specializzata di miele abbinata alla coltivazione di ulteriori essenze erbacee ed arbustive nettariifere;
- ulteriore coltivazione a foraggere dell'area sottoposta a vincolo archeologico da avviare a prato stabile al fine di evitare interferenze con eventuali resti presenti nel suolo.



A Impianto fotovoltaico con suolo coltivato a foraggiere

B Superficie coltivata a foraggiere da avviare a prato stabile

C Postazioni apistiche

### 8.0 La coltivazione dei prati, la fertilità dei suoli agrari e il ruolo di habitat

Negli ultimi 60/70 anni, la fertilità dei suoli è stata accostata alla produttività. Tanto più produce tanto più è fertile. Tanto più è reattivo all'integrazione fatta con i concimi chimici (principalmente a base di azoto, fosforo e potassio) e più risponde alle esigenze di accelerare la risposta produttiva necessaria per assecondare le richieste del mercato. In realtà il suolo agrario è l'habitat di microrganismi, alghe, funghi, insetti, acqua, che assieme alle caratteristiche pedologiche del medesimo (la tessitura, la granulometria, la porosità) interagisce con gli agenti climatici crea un equilibrio unico la cui stabilità nel tempo genera la fertilità. In un suolo fertile gli organismi trasformano con efficienza le sostanze nutritive e la sostanza organica rendendoli disponibili alle piante, proteggono queste da malattie e danno struttura al terreno. Un terreno fertile può essere coltivato facilmente, assorbe meglio la pioggia, preserva la porosità riducendo la migrazione delle particelle fini e resiste all'erosione. Filtra e neutralizza gli acidi che vi ricadono dall'atmosfera, degrada i fitofarmaci. La fertilità del suolo è il risultato di processi biologici complessi rendendolo capace di rigenerarsi nel tempo.

L'agricoltura "moderna", intensiva, prevalentemente monocolturale, senza rotazioni periodiche significativa e priva di sovesci, ovvero di apporto di sostanza organica vegetale, ha portato a semplificare questa complessità riducendo certamente le rese produttive, aumentando i fenomeni di *stanchezza* del terreno.

La rigenerazione della fertilità attraverso la coltivazione prativa prolungata nel tempo, specialmente con leguminose, contribuisce ad arricchire il suolo di sostanza organica e a rigenerarlo; ne aumenta il contenuto di azoto fissandolo dall'atmosfera, ne migliora la struttura glomerulare e colonizza il suolo contrastando la diffusione delle erbe infestanti.

Questa scelta agronomica si ritiene adatta al sito oggetto di interesse proprio per contribuire a ridurre ricorrenti prassi caratterizzate da ripetuta monocoltura o rotazioni molto limitate fra cereali e oleaginose con limitate intercalazione con prati avvicendati (es.: trifogli o erba medica) stabili sul suolo per almeno 3/4 anni. Infine, le colture prative, contribuiscono a trasferire il carbonio nel suolo in quantità significativa. Tale positivo effetto diviene apprezzabile specialmente se misurato in funzione della variazione dell'uso del suolo ovvero quando una coltura prevalente viene sostituita da un'altra. In particolare l'avvicendamento di colture a seminativo o permanenti con prati stabili porta ad accumulare nei primi 30 cm di suolo, nel lungo periodo, una maggior quantità di CO fino a 12,2 t/ha rendendolo il più virtuoso.

Variazioni di STOCK CO per variazioni di uso suolo (t/ha) - primi 30 cm di suolo				PIANURA
DA				
Seminativi \ colture permanenti	0	12,2	5,3	- 55,7
Prati stabili	-12,2	0	-6,9	- 67,9
Boschi di latifoglie \ boschi misti	-5,3	6,9	0	- 61,0
A	Seminativi \ colture permanenti	Prati stabili	Boschi di latifoglie \ boschi misti	Aree urbane

Tabella 2.5 – Stock di carbonio organico nei primi 30 cm suddiviso per categorie di uso del suolo. Regione pedologica: Pianura (variazioni positive rappresentate con gradazioni di colore verde, negative con gradazioni di colore arancio).

(ERSAF - Regione Lombardia - Il ruolo dell'agricoltura conservativa nel bilancio del carbonio - 2013)

Stima dello stock di Carbonio Organico accumulato nei primi 30 cm di suolo prativo nell'arco di 30 anni sulla superficie a FV	Superficie ha 10,68	Accumulo annuale t/ha 12,2	Accumulo in 30 anni t 130,30
---	------------------------	-------------------------------	---------------------------------

La realizzazione di un'ampia superficie prativa dedicata a essenze erbacee poliennali, polifite e nettarifere (in luogo del normale seminativo) consente inoltre di creare un elemento di diversificazione del territorio agrario tipico con l'inserimento di specie floristicamente importanti per l'insediamento e la riproduzione di insetti pronubi (sia api che altre specie) costituendo una fonte di foraggiamento ricca di varietà di fiori, di tipi di fiori ed infiorescenze, di pollini e nettare, di habitat adatti a creare microclimi ottimali e ponti ecologici verso ulteriori tipologie di habitat costituiti dalle formazioni arboree e cespugliose allignanti sui perimetri del sito realizzate a fini di mitigazione ambientale.

## 8.1 Realizzazione della coltura prativa

Le attività agronomiche per la semina del prato prenderanno avvio dopo la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, nel periodo autunnale e si svolgeranno secondo la seguente sequenza:

- a) concimazione di fondo di origine organica (preferibilmente liquiletame bovino o digestato da biogas ottenuto esclusivamente da impianti agricoli da interrare con ancorette oppure ancora S.O. pellettata) in ragione di 30 ton/ha;
- b) preparazione del terreno mediante aratura poco profonda (max cm 20) oppure utilizzo di ripper con l'attenzione di evitare eventuali condotte elettriche interrate, frangizollatura ed erpicatura per l'affinamento della zollosità e la preparazione ottimale del terreno alla semina;
- c) acquisto di semente di essenze erbacee nettarifere (in via esemplificativa e non esaustiva: 6% trifoglio bianco - *Trifolium repens*, 6% facelia - *Phacelia tanacetifolia*, 1% tarassaco - *Taraxacum officinale*, 6% meliloto - *Melilotus officinalis*, 81% erba medica - *Medicago sativa*) in ragione di kg/ha 40, adatte a colonizzare rapidamente il suolo e mantenere il medesimo coperto da vegetazione fitta e rigogliosa per contrastare in maniera naturale le erbe infestanti; le abbondanti fioriture scalari contribuiranno nel tempo a costituire un pascolo interessante per le api ed altri pronubi e contribuiranno a rendere gradevole il paesaggio locale; la scelta di puntare principalmente sull'erba medica è supportata dal fatto che essa rappresenta la più virtuosa fra le specie erbacee foraggere in quanto è ricca di valore nutritivo in ambito zootecnico, ha un titolo proteico elevato (produce la quantità più elevata di proteine per unità di superficie coltivata), fissa l'azoto atmosferico nel terreno, migliora la struttura del terreno grazie alle radici fittonanti e profonde, richiede una ridotta quantità di input, favorisce il sequestro del carbonio nel suolo ed incide quindi favorevolmente sulla qualità ecologica dell'ambiente; dal punto di vista economico la coltivazione della medica genera inoltre una PLV (Produzione Lorda Vendibile) di circa €/ha 1.155,00 a fronte di costi per €/ha 900,00 ed un utile di circa €/ha 255,00 totalizzando, sulla SAU dell'impianto di ha 57,00, un utile complessivo di €14.535,00. Un risultato coerente con il risultato economico conseguibile col frumento duro che produce una PLV (al netto del contributo PAC) di circa €/ha 1.450,00, costi per circa €/ha 1.165,00 ed un utile stimato di €/ha 285 per un totale (su 57 ettari) di € 16.245,00.
- d) semina delle specie erbacee foraggere a fasce o in miscuglio con idonei mezzi agricoli;
- e) effettuazione di una rullatura per il compattamento della superficie del suolo finalizzato a garantire il rapido attecchimento del prato appena seminato.



Trifoglio

Tarassaco

Facelia

Meliloto

Erba Medica



## 8.2 Manutenzione del prato successivamente alla semina

Successivamente alla semina seguirà l'effettuazione di opportune attività agronomiche necessarie a garantire il corretto sviluppo e mantenimento del prato così rappresentate:

a) sfalcio periodico del cotico erboso (2-3 volte l'anno) da eseguire dopo la piena fioritura (per favorire l'utilizzo mellifero dei fiori da parte dei pronubi) e ad un'altezza di cm 15; l'operazione, facilmente meccanizzabile, verrà svolta preferibilmente con falciacondizionatrici laterali o frontali (per favorire il pre-appassimento e la qualità del fieno) portate con trattrici di media potenza;

b) essiccazione all'aria tramite rivoltamento con ranghinatore nella parte centrale dell'interfilare fra i pannelli per sfruttare la disponibilità di radiazione solare nell'interfilare dell'impianto fotovoltaico, andanatura, imballaggio, caricamento su carro porta balloni autocaricante ed avvio a mercato della biomassa prodotta.

Ogni 4 anni, qualora il prato tenda a ridurre la capacità vegetativa, si prevede la possibilità di attuare le seguenti diverse soluzioni alternative:

- ripuntatura superficiale del terreno per l'arieggiamento del cotico erboso;
- sovescio mediante aratura con interrimento della biomassa vegetale per l'arricchimento del suolo di sostanza organica con successiva risemina di un miscuglio di essenze foraggere nettarifere;
- risemina su sodo oppure ancora trasemina di un miscuglio di essenze foraggere nettarifere.

## 8.3 Macchine e attrezzature necessarie per la gestione della coltura

La coltivazione delle foraggere necessiterà dell'impiego di una serie di mezzi ed attrezzature meccaniche normalmente reperibili presso un'azienda agricola specializzata salvo eventuale ricorso a contoterzisti per specifiche esigenze. Nella seguente tabella si riportano i fabbisogni di meccanizzazione la periodicità in cui se ne verifica la necessità e le criticità che possono verificarsi rispetto all'infrastruttura realizzata.

	Lavorazione agronomica	Mezzi da impiegare	Periodicità	Frequenza	Criticità	Reperibilità servizio
	<b>Realizzazione della coltura prativa</b>					
1	Concimazione di fondo con liquiletame di origine zoot., digestato o S.O. in pellet	Trattrice di potenza elevata e botte con interratori	1° anno	1 intervento	Danneggiamento pannelli	Partner di progetto
2	Aratura (profondità cm 20) o impiego di ripper	Trattrice di potenza elevata con aratro polivom. o ripper	1° anno	1 intervento	Danneggiamento pannelli Intercettazione cavi interrati	Partner di progetto
3	Frangizollatura per l'affinamento del terreno	Trattrice di media potenza con frangizolle	1° anno	1 intervento	Danneggiamento pannelli	Partner di progetto
4	Erpicatura per la preparazione del letto di semina	Trattrice di media potenza con frangizolle	1° anno	1 intervento	Danneggiamento pannelli	Partner di progetto
5	Semina delle essenze foraggere	Trattrice di media potenza con seminatrice	1° anno	1 intervento	Danneggiamento pannelli	Partner di progetto
6	Rullatura	Trattrice di media potenza con rullo	1° anno	1 intervento	Danneggiamento pannelli	Partner di progetto

<b>Manutenzione annuale</b>						
1	Sfalcio periodico	Trattrice di media potenza con falciacondizionatrice preferibilmente anteriore	Ogni anno	3 interventi	Danneggiamento pannelli	Partner di progetto
2	Rivoltamento per l'essiccazione e successiva andanatura per la raccolta	Trattrice di media potenza con voltafieno e andanatore	Ogni anno	3 interventi	Danneggiamento pannelli	Contoterzisti
3	Imballaggio	Trattrice di media potenza con rotoimballatrice	Ogni anno	3 interventi	Danneggiamento pannelli	Contoterzisti
4	Caricamento e trasporto a mercato	Trattrice di potenza elevata con carrello portaballoni autocaricante	Ogni anno	3 interventi	Danneggiamento pannelli	Contoterzisti

<b>Manutenzione poliennale</b>						
1	Ripuntatura o aratura per sovescio	Trattrice di potenza elevata con ripuntatore o aratro polivomere	Ogni 4 anni*	1 intervento	Danneggiamento pannelli Intercettazione cavi interrati	Partner di progetto
2	Trasemina su sodo o semina su terreno arato di foraggiere nettarifere	Trattrice di media potenza con seminatrice	Ogni 4 anni*	1 intervento	Danneggiamento pannelli	Partner di progetto

\*: la periodicità è prevedibilmente di 4 anni, ma potrà essere modificata sulla base di valutazioni agronomiche puntuali dello stato vegetativo del manto erboso

Di seguito invece si espone, in via del tutto esemplificativa, la tipologia di macchine ed attrezzature necessarie per la realizzazione della coltivazione foraggera.



Botte per liquami con interratori



Aratro polivomere



Erpice rotante per frangizollatura



Seminatrice di precisione



Seminatrice per terreno sodo



Falciacondizionatrice



Voltafieno



Andanatore



Rotoimballatrice



Carrello porta balloni autocaricante



Ripuntatore multiplo

## 8.4 Computo metrico estimativo dei costi di realizzazione e manutenzione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE AGRARIE					
N.	Descrizione dei lavori	U.M.	Quantità	Prezzo unit. €	Totale €
<b>A) Realizzazione di un prato di essenze nattarifere sull'intera superficie destinata alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.</b>					
1	Concimazione di fondo con sostanza organica (letame bovino o digestato ottenuto esclusivamente da impianti a biogas agricoli o S.O. pellettata); comprensivamente dell'approvvigionamento della s.o. e della distribuzione con idonei mezzi agricoli. t/ha 30 x ha 57,92 = t 1.737,60				
	Totale	ton	1.737,60	4,50	7.819,20
2	Effettuazione di un'aratura della profondità di cm 20.				
	Totale	ha	57,92	140,00	8.108,80
3	Effettuazione di una frangizollatura per l'affinamento della zollosità del terreno.				
	Totale	ha	57,92	85,00	4.923,20
4	Effettuazione di un'erpicazione volta all'ulteriore affinamento e pareggiamento del terreno e la preparazione del letto di semina.				
	Totale	ha	57,92	85,00	4.923,20
5	Acquisto di semente di essenze erbacee nattarifere (es.: 6% trifoglio bianco - Trifolium repens, 6% facelia - Phacelia tanacetifolia Benth., 1% tarassaco - Taraxacum officinale Weber, 6% meliloto Melilotus officinalis L., 81% di erba medica - Medicago sativa L.) per creare un tappeto erboso volto a garantire una rapida e fitta copertura del suolo (dose di semente di 40 kg/ha) ad evitare da subito la proliferazione di infestanti e favorire l'attrazione delle api durante le fioriture, la suzione del nettare e la produzione di miele. Erba medica seminata in purezza, le altre in purezza o miscuglio. ha 57,92 x kg/ha 40 = kg 2.316,80				
	Totale	kg	2.316,80	2,50	5.792,00
6	Semina con idonea seminatrice per semi di piccole dimensioni portata da trattrice agricola.				
	Totale	ha	57,92	65,00	3.764,80
7	Effettuazione di una rullatura per il compattamento superficiale del suolo volto finalizzato a garantire il rapido attecchimento del prato appena seminato.				
	Totale	ha	57,92	42,00	2.432,64
<b>TOTALE A)</b>					<b>37.763,84</b>

<b>B) Spese di gestione durante il 1° anno successivo alla realizzazione</b>					
8	Effettuazione di 4 interventi di sfalcio e raccolta della biomassa con adeguati mezzi agricoli sull'intera superficie impegnata dall'impianto fotovoltaico.				
	ha 57,92 x 4 = ha 231,68				
	Totale	ha	231,68	373,33	86.493,87
	<b>TOTALE B)</b>				<b>86.493,87</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>				<b>124.257,71</b>

## 9.0 La funzione dell'apicoltura in agricoltura e nell'ecosistema

L'attività apistica, regolata dalla L. 313/2004, è attività agricola a tutti gli effetti ed è inoltre considerata un'attività di "interesse pubblico".

Trattasi di un primato riconosciuto dalla legge e noto a pochi, che merita un approfondimento sulle motivazioni ecologiche e ed economiche. In Europa la produzione di miele è in costante aumento (23% negli ultimi 10 anni) e l'Italia è il 4° produttore con 1.400.000 alveari e 23,3 mila tonnellate di prodotto annuo per un fatturato che supera i 250 milioni di Euro. Nella Regione Lazio operano circa 2.838 apicoltori (fonte: *Annuario dell'Agricoltura italiana - CREA - 2018*), 1.228 professionali e 1.610 per autoconsumo, che attuano i metodi produttivi: nomade (25%), stanziale (75%), convenzionale (92%) e biologico (8%); producono miele e derivati di pregio (es.: propoli e cere) e sempre più affiancano alla propria attività il servizio di impollinazione specie nelle zone vocate alla frutticoltura o per il monitoraggio dello stato della biodiversità e degli indicatori ambientali nelle zone dedicate a vigneto intensivo. Dal punto di vista storico l'apicoltura affonda le proprie origini nella storia più lontana. Nell'antico Egitto l'apicoltura, raffigurata in numerosi bassorilievi rinvenuti nelle tombe dei faraoni (XVIII° e XXVI° dinastia), era molto sviluppata ed era praticata anche la transumanza degli alveari. Infatti gli antichi apicoltori spostavano i favi per mezzo di barche che sul Nilo seguivano le fioriture dall'Alto Egitto fino al Basso Egitto, percorrendo la moderna concezione dell'allevamento "nomade" delle api. Un altissimo grado di specializzazione, raggiunto in secoli di adattamento, fa delle api il migliore agente impollinatore esistente, impareggiabile per efficienza e scrupolosità nel lavoro svolto quotidianamente: possiamo affermare, senza timore di smentita, che le api sono il principale fattore per la conservazione della biodiversità.

La graduale scomparsa degli altri insetti pronubi che vivono allo stato selvatico causa l'invasione delle pratiche agricole e dell'uso di fitofarmaci hanno reso le api allevate, largamente distribuite e protette dall'uomo, il principale insetto impollinatore e un vero e proprio strumento di produzione agricola; sono infatti moltissime le specie vegetali che non possono dare frutti in assenza di impollinazione incrociata entomofila (melo, pero, pesco, ciliegio, numerose orticole, ecc.).



Apis Mellifera Ligustica su melo (Foto G.C. - 2006)

A differenza di tutti gli altri insetti le api, essendo fedeli al tipo di fiore prescelto, consentono la fecondazione tra stesse specie vegetali, questo è molto importante perché, ad esempio, il polline di un fiore di melo non potrebbe mai fecondare un fiore di pero.

L'apicoltura, quindi, si inserisce con pieno diritto non solo nel processo produttivo agricolo, ma costituisce fonte di reddito per gli apicoltori professionisti.

Chi non ha mai avvicinato le api può pensare che l'apicoltura sia un'attività marginale, quasi un divertimento rispetto a chi alleva altri animali in cattività, ma invece si tratta di un'attività che ha attinenza con un largo ventaglio di discipline diverse fra le quali la biologia, la botanica, la medicina veterinaria, la chimica, la genetica, la meteorologia, la geografia. Affrontare l'apicoltura comporta un approccio di tipo innanzitutto culturale.

L'ape (*Apis Mellifera Ligustica Spinola*) è una specie animale non addomesticabile, che non si può confinare in un recinto o in una stalla. Alle api non si può imporre niente, si può solo proporre ovvero si possono creare le condizioni perché abbiano un pascolo abbondante per le loro esigenze. Un apiario copre un'estensione fino a tremila ettari (enorme rispetto ad altri allevamenti zootecnici) in maniera che possano produrre il "surplus" di miele che verrà raccolto dall'apicoltore senza condizionare in nessun modo il normale sviluppo della famiglia. L'apicoltura è una delle rare forme di allevamento il cui frutto non contempla né la sofferenza né il sacrificio animale e che ha una ricaduta molto positiva sull'ambiente e sulle produzioni agricole e forestali.

Gli apicoltori si dividono sostanzialmente in tre figure professionali: hobbisti, semiprofessionisti e professionisti. Gli hobbisti assicurano per la loro capillare distribuzione sul territorio un servizio di impollinazione gratuito a tutte le specie di piante entomogame; i semiprofessionisti sono ben rappresentati come numero ed in costante crescita, in quanto l'allevamento delle api concorre a determinare un'importante fonte di integrazione del reddito principale; i professionisti attraverso l'apicoltura trovano occasione di lavoro e di reddito. Tutti assieme questi operatori concorrono a recuperare e capitalizzare una ricchezza, il nettare, che diversamente andrebbe inevitabilmente perduta con la caduta dei fiori.



### 9.1 Realizzazione delle postazioni apistiche

Il progetto propone la creazione di postazioni per l'installazione di alveari posti all'interno dell'impianto fotovoltaico da arricchire con essenze erbacee e arbustive nettariifere con lo scopo di favorire il pascolamento delle api nelle superfici circostanti con limitata interferenza antropica. La popolazione apistica ivi insediata potrà inoltre interagire con le ulteriori specie arbustive e arboree già previste nella fascia di mitigazione ambientale e mascheramento lungo il perimetro dell'impianto (ulteriore fonte nettariifera), con le alberature spondali del Fosso della Ficocchia e di quelle dell'articolata rete di Fossi ubicati nel raggio di 3/4 chilometri corrispondente al raggio d'azione delle esplorazioni svolte da questi insetti. L'insediamento apistico costituirebbe infine un importante elemento di servizio ecosistemico volto a favorire l'impollinazione di tipo entomofilo delle specie erbacee, arbustive ed arboree selvatiche, di quelle agrarie ed anche di quelle presenti negli orti domestici molto diffusi nell'area situata a nord-est dell'impianto.

L'attività proposta persegue i seguenti obiettivi:

- significativo miglioramento della biodiversità ambientale contribuendo ad arricchire lo spettro floristico del sito;
- potenziamento dell'interazione fra le componenti dell'ecosistema locale in un sito semplificato dal punto di vista ecologico a seguito delle diversificate attività antropiche svolte nel tempo;
- contribuire a diffondere ed affermare sul territorio l'ape italiana (*Apis mellifera ligustica Spinola*);
- creare una modello di economia sostenibile mediante la sinergia con gli apicoltori locali i quali potranno utilizzare le postazioni ubicate in un pascolo già predisposto ed al sicuro da possibili furti di alveari o vandalismi (ricorrenti negli ultimi anni) grazie al fatto che il perimetro dell'impianto fotovoltaico sarà protetto da recinzione e videosorveglianza.



Esemplificazione di postazione apistica

## 9.2 Descrizione dei lavori di realizzazione e manutenzione

Le postazioni apistiche saranno 6, costituite da aree quadrate con lato di m 10 per una superficie di mq 100 ciascuna collocate negli spazi liberi da tracker. Le postazioni verranno delimitate su tre lati da uno steccato protettivo in legno e corredate da supporti in legno al suolo per la posa degli alveari. Si prevede la posa di 5 alveari per postazione per un totale potenziale di 30. In fase iniziale l'approccio all'attività apistica sarà di carattere sperimentale che potrà svilupparsi ed ampliarsi sulla base della disponibilità e numerosità degli operatori apistici che intenderanno insediarsi. In ogni caso le postazioni sono già dimensionate per ospitare fino a 30 arnie ciascuna. Le postazioni verranno integrate dalla posa a dimora di arbusti nettariiferi nel raggio di 22,5 metri (o superficie equivalente) intorno alle postazioni con lo scopo di attrarre le api (ed altri pronubi) e fornire materia prima per produrre miele e suoi derivati. Di seguito e più in dettaglio si riporta la descrizione dei lavori di quanto anticipato.

### 9.2.1 Realizzazione

- a) concimazione di fondo di origine organica (letame bovino o digestato da biogas ottenuto esclusivamente da impianti agricoli oppure ancora S.O. pellettata) in ragione di 30 ton/ha;
- b) preparazione del terreno mediante aratura della profondità di cm 20 oppure utilizzo di ripper, frangizollatura ed erpicatura per l'affinamento della zollosità e la preparazione ottimale del terreno per il trapianto delle piante arbustive;
- c) Creazione di 6 postazioni apistiche con perimetro quadrato di lato m 10 da recintare su 3 lati con steccato in legno di altezza m 1,40 costituito da morali infissi al suolo e 2 correnti in tavolame della larghezza di cm 15 fissati fra loro mediante chiodatura in ferro; posa in opera di 3 supporti in legno necessari per il posizionamento degli alveari della larghezza di circa cm 40 e della lunghezza di m 10 ciascuno;
- d) Acquisto di semenzali di diverse specie arbustive mellifere da porre a dimora in un raggio di 22,50 metri intorno alle postazioni apistiche per arricchire lo spettro floristico stagionale e l'attrazione delle api per la raccolta del nettare e la produzione del miele. Il materiale vivaistico dovrà essere sano, ben conformato, certificato, dell'età di 1 max 2 anni, fornito a radice nuda o paper-pot; sesto d'impianto di m 1,50 x 1,50 ovvero 0,44 piante per mq. Specie da impiegare: rosmarino - *Rosmarinus officinalis*, caprifoglio - *Lonicera caprifolium*, prugnolo - *Prunus spinosa*. L.; altezza cm 60/80 salvo diverse determinazioni in fase di esecuzione alla luce delle specifiche condizioni stagionali o di valutazioni migliorative volte ad aumentare il potenziale nettariifero della composizione floristica ipotizzata;
- e) posa a dimora dei semenzali arbustivi con mezzi manuali ad una profondità il cui reinterro avvenga comunque fino al colletto e non oltre e con la formazione di una conca finalizzata alla raccolta di acqua piovana utile per l'irrigazione naturale;
- f) acquisto e posa in opera di shelter per la protezione delle piantine dalle rosure da selvaggina (es.: lepri);
- g) interventi di irrigazione di soccorso (in ragione di 5 interventi post trapianto) tramite l'impiego di botte agricola contenente acqua di pozzo o comunque acqua pulita da distribuire tramite a pioggia tramite deflettore.



### **9.2.2 Manutenzione al primo anno dopo l'impianto**

Gli arbusti circostanti necessiteranno di manutenzione specifica durante il primo anno successivo all'impianto per promuovere la vigoria vegetativa e l'affrancamento definitivo. Fra gli interventi prevedibili si elencano i seguenti:

- a) interventi di irrigazione di soccorso delle essenze arbustive (in ragione di 3 interventi in un anno) tramite l'impiego di botte agricola contenente acqua di pozzo o comunque acqua pulita da distribuire a pioggia tramite deflettore;
- b) Potatura di formazione degli arbusti o ceduzione di rinforzo sopra la prima gemma basale (dei soggetti deperienti o poco sviluppati) per favorirne il ricaccio e lo sviluppo vigoroso durante il secondo anno.

Dopo l'affrancamento verrà favorito lo sviluppo naturale degli arbusti fino alla naturalizzazione, senza quindi ulteriori interventi agronomici salvo controllo delle infestanti erbacee da effettuare con mezzi manuali o decespugliatore.

### **9.3 Scelta delle essenze mellifere erbacee ed arbustive**

Le postazioni apistiche e il pascolo apistico sono stati progettati per dare modo alle api (ed altri pronubi) di disporre di un'opportunità in più per reperire nettare funzionale alla produzione mellifera a più breve distanza. E' noto infatti che esse sono in grado di spingersi fino a 3/4 chilometri dall'alveare di origine in cerca di nettare e che sono specializzate in singoli fiori ovvero un'ape potrebbe cercare il fiore del trifoglio e disinteressarsi di tutti gli altri e le sue colleghe parimenti con altre specie floristiche. Pertanto, da un lato è necessario diversificare adeguatamente la varietà specifica di essenze sia erbacee che arbustive nell'ampio sito e dall'altro favorire la diffusione di specie comunemente presenti nel territorio locale volte a migliorare il contesto paesaggistico grazie alle ricorrenti fioriture. Tra le specie erbacee nettariifere (come già citato) si prevede la semina di trifoglio ladino - *Trifolium repens*, facelia - *Phacelia tanacetifolia*, tarassaco - *Taraxacum officinale* e meliloto - *Melilotus officinalis*, erba medica - *Medicago sativa* mentre fra le arbustive (scelte anche per il loro portamento contenuto ma rigoglioso) rosmarino - *Rosmarinus officinalis*, caprifoglio - *Lonicera caprifolium*, prugnolo - *Prunus spinosa*, lantana - *Viburnum lantana* L. .



Rosmarino

Caprifoglio

Prugnolo

Viburno

## 9.4 Computo metrico estimativo dei lavori di realizzazione e manutenzione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE AGRARIE					
N.	Descrizione dei lavori	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Totale
				€	€
<b>A) Realizzazione di postazioni apistiche</b>					
1	Creazione di postazioni apistiche con perimetro quadrato di lato m 10 delimitata su 3 lati da steccato in legno di altezza m 1,40 costituito da morali morali infissi al suolo e 2 correnti in tavolame della larghezza di cm 15 fissati fra loro mediante chiodatura in ferro; posa in opera di 3 supporti in legno necessari per il posizionamento degli alveari della larghezza di circa cm 40 e della lunghezza di m 10 ciascuno. Comprensivamente della fornitura dei materiali e della posa in opera; Staccionata m 10,00 x n° 3 = m 30,00 x €/m 35,00 = €1.050,00 + supporti per arnie m 10 x n° 3 = m 60,00 x €/m 11,5 = € 345,00 = €/post. 1.395,00				
	Totale	cad	6,00	1.395,00	8.370,00
2	Acquisto di semenzali di diverse specie arbustive mellifere da porre a dimora in un raggio di 22,5 metri (o per una superficie equivalente) intorno alle postazioni apistiche per arricchire lo spettro floristico stazionario e l'attrazione delle api per la raccolta del nettare e la produzione del miele. Il materiale vivaistico dovrà essere sano, ben conformato, certificato, con età di 1 max 2 anni, fornito a radice nuda o paper-pot; sesto d'impianto di m 1,50 x 1,50 ovvero 0,44 piante per mq. Specie da impiegare: rosmarino - Rosmarinus officinalis L, caprifoglio - Lonicera caprifolium L, viburno - Viburnum lantana L), prugnolo - Prunus spinosa L; altezza cm 60/80. mq/postazione 1.590 x n° piante 0,44 = 700 x n° 6 = n° piante 4.200				
	Totale	cad.	4.200	2,00	8.400,00
3	Posa a dimora dei semenzali con mezzi manuali ad una profondità il cui reinterro avvenga comunque fino al colletto e non oltre e con la formazione di una conca finalizzata alla raccolta di acqua piovana utile per l'irrigazione naturale; comprensivamente delle misurazioni e della segnatura del punto di impianto e dell'impiego di mezzi agricoli per il trasporto dei materiali.				
	Totale	cad.	4.200	1,70	7.140,00
4	Acquisto e posa in opera di shelter in polipropilene h cm 40 per la difesa dalla rosura delle piantine da parte della selvaggina (es.: lepri)				
	Totale	cad.	4.200	1,20	5.040,00
5	Irrigazione di soccorso tramite l'impiego di botte agricola contenente acqua di pozzo o altra fonte pulita da distribuire a pioggia tramite deflettore per un totasle di 5 interventi dopo il trapianto. n° postazioni 6 x 5 = 30 interventi				
	Totale	cad.	30,00	33,50	1.005,00
<b>TOTALE A)</b>					<b>29.955,00</b>

<b>B) Spese di gestione durante il 1° anno successivo alla realizzazione</b>					
6	Irrigazione di soccorso delle essenze arbustive collocate in prossimità delle postazioni apistiche con l'impiego di botte agricola e acqua di pozzo o altra fonte pulita da distribuire a pioggia tramite deflettore.				
	n° postazioni 6 x 3 interventi = n° interventi 18				
	Totale	cad.	18,00	65,00	1.170,00
7	Potatura di formazione o ceduzione di rinforzo sopra la prima gemma basale delle piantine poste intorno alle postazioni apistiche mediante l'uso di attrezzature manuali.				
	n° postazioni 6 x mq 1590 = mq 9.540				
	Totale	mq	9.540,00	0,50	4.770,00
<b>TOTALE B)</b>					<b>5.940,00</b>
<b>TOTALE A) + B)</b>					<b>35.895,00</b>

### 9.5 Business plan dell'attività apistica

L'attività agricola apistica proposta è organizzata in modo tale da fornire ad apicoltori esperti 6 postazioni per l'installazione di 30 arnie ed un pascolo composto da specie nettariifere erbacee, arbustive e arboree specificamente dedicato con la possibilità di svolgere tale l'attività in un contesto ambientale comunque interessante per la produzione di diverse tipologie di miele grazie alla presenza di corsi d'acqua con relative fasce alberate spondali, prati polifiti e colture agrarie.

Pertanto, l'apicoltore potrà operare collocando i propri alveari nelle postazioni e svolgere l'attività senza essere gravato da costi di investimento (realizzazione delle postazioni) oppure di utilizzazione delle postazioni (affitti). Per motivi legati alla normativa veterinaria e amministrativa, l'apicoltore dovrà portare con sé unicamente gli alveari e le attrezzature normalmente necessarie per la conduzione degli apiari. Quindi, l'analisi economico-finanziaria che seguirà terrà conto del fatto che non saranno a carico del produttore costi di investimento iniziale e costi d'uso/affitto delle postazioni.

Più complessa in questo caso l'analisi economico-finanziaria per la quale si è preferito riportarne solo le risultanze in termini di redditività annuale senza il calcolo di TIR, VAN e PbP dando per scontato sin da principio che i costi dell'investimento iniziale non graveranno sul gestore delle postazioni come si è dato per scontato che l'apicoltore sarà dotato nella propria sede aziendale dei locali e delle attrezzature per l'estrazione e confezionamento del miele già ammortizzati.

#### Ricavi

Per quanto riguarda i ricavi si ipotizza una produzione media annua prudenziale di miele pari a 15 kg/arnia e un prezzo medio di vendita all'ingrosso, tenuto conto della notevole quantità prodotta, di €/kg

7,50 (valore prudenziale che non tiene conto della quantità ceduta tramite vendita diretta presso il punto vendita aziendale che spunterà valori sicuramente più elevati, fino a €/kg 11,00/12,00).

### Spese

Per quanto riguarda le spese sono stati stimati gli ammortamenti delle nuove arnie e delle attrezzature usate normalmente per gestire le stesse (650 €/anno), le spese correnti da sostenere per il funzionamento degli apiari (circa 1.970,00 Euro), le imposte calcolate forfaitariamente pari a 500 €/anno dato il regime esistente in agricoltura.

<b>costo iniziale</b>	<b>n° arnie</b>	<b>€/pz</b>	<b>€ totale</b>	<b>ammortamento</b>
Arnia	30	150,00 €	4.500,00 €	450,00 €
famiglia	30	65,00 €	1.950,00 €	
supporti arnie			2.000,00 €	200,00 €
<b>Totale</b>			<b>8.450,00 €</b>	<b>650,00 €</b>

<b>Spese vive</b>	<b>n°</b>	<b>€arnia</b>	<b>€ totale</b>
cambio regine	15	15,00 €	225,00 €
trattamento varroa	30	10,00 €	300,00 €
nutrizione	30	6,00 €	180,00 €
spese di invasettamento			600,00 €
trasporto/ spese di commercializzazione			665,00 €
<b>Totale</b>			<b>1.970,00 €</b>

### Utile

Anche in questo caso si raggiungerà un significativo risultato economico di circa € 1.990,00 (€/arnia 66,00) tenuto conto che, grazie alla vendita diretta di una parte del miele ad un prezzo unitario più elevato, di una produzione più elevata rispetto a quella prudenzialmente stimata e della vendita di coprodotti come il propoli, si potrà raggiungere un utile ancor più interessante.

Anno	N° arnie	kg arnia	kg miele	€/kg	Ricavi	Ammortamenti	Spese correnti	imposte	Tornaconto	tornaconto/n° arnie
1	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
2	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
3	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
4	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
5	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
6	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
7	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
8	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
9	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
10	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
11	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
12	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
13	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
14	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
15	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
16	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
17	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
18	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
19	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
20	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
21	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
22	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
23	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
24	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
25	30	15	450	7,50	3.375,00	520,00	-1.405,00 €	-500,00 €	1.990,00 €	66,33 €
<b>Totale</b>										

## 10.0 Calcolo degli input evitati.

Il disimpegno dell'area oggetto di interesse dall'attività agricola intensiva comporterà diversi effetti fra cui un'importante riduzione degli "input" (es.: concimi chimici, prodotti fitosanitari, acqua irrigua, carburanti agricoli) che, si badi bene, sono necessari per garantire l'ottenimento delle produzioni agricole tradizionali (diversamente non si otterrebbero i raccolti), ma non necessari per condurre foraggiere sui suoli sui quali viene installato un impianto fotovoltaico a terra contribuendo in questo modo alla riduzione degli impatti sull'ambiente locale. Indubbiamente un vantaggio in più se il punto di osservazione diventa quello legato alla creazione di un ambito nel quale promuovere una sostanziale rinaturalizzazione del territorio.

In questa ottica sono state censite le principali colture presenti territorio circostante il sito di interesse e, per quelle maggiormente rappresentative (frumento, actinidia e vigneto) è stato analizzato l'insieme delle attività agronomiche ivi svolte, la quantificazione stimata dei mezzi tecnici, delle risorse impiegate e delle emissioni di gas ad effetto serra con particolare riguardo alla CO<sub>2</sub> sulla base di dati caratteristici medi. Inoltre sono stati effettuati analoghi conteggi sulle colture foraggiere che caratterizzeranno l'uso del suolo

durante l'esercizio dell'impianto fotovoltaico. In particolare sono state individuate le principali lavorazioni agronomiche che comportano l'uso di macchine a motore per la conduzione di tali colture (es.: potature meccanizzate, distribuzione di concimi granulari, raccolta, trattamenti fitosanitari, sfalcio degli interfilari, trinciatura di sarmenti, operazioni per la fienagione) di cui è stato stimato il consumo di carburante di fonte fossile; è stato stimato ulteriormente il consumo di mezzi tecnici (diserbanti, anticrittogamici e insetticidi per la difesa delle produzioni, concimi), di risorse come l'acqua irrigua ed infine la produzione di gas ad effetto serra come la CO<sub>2</sub> derivata dall'impiego delle trattrici con motore endotermico. I dati calcolati per unità di superficie sono stati poi moltiplicati per 25 ovvero il numero di anni pari alla durata minima prevedibile dell'impianto fotovoltaico.

Di seguito vengono riassunte le risultanze.

<b>FRUMENTO</b>					
<b>Input</b>	<b>Caratteristiche</b>	<b>Principi attivi usati</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità media annua/ha</b>	<b>Quantità su 1 ha</b>
Prodotti fitosanitari	Diserbante (solo principio attivo)	2	kg	0,268	0,268
Prodotti fitosanitari	Anticrittogamico (solo principio attivo)	1	kg	0,248	0,248
Concimi chimici	Azoto/fosforo/potassio	3	kg	233	233
Carburante agricolo*	5 tipi di lavorazioni e 5 interventi		kg	160	160
* CO2 prodotta	1 Kg gasolio = 2,64 kg CO2		kg	422,40	422,40

<b>ACTINIDIA</b>					
<b>Input</b>	<b>Caratteristiche</b>	<b>Principi attivi usati</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità media annua/ha</b>	<b>Quantità su 1 ha</b>
Prodotti fitosanitari	Diserbante (solo principio attivo)	0	kg	0,00	0,00
Prodotti fitosanitari	Anticrittogamico (solo principio attivo)	1	kg	3,34	3,34
Prodotti fitosanitari	Insetticida (solo principio attivo)	1	kg	0,03	0,03
Concimi chimici	Azoto/fosforo/potassio	3	kg	300	300
Acqua ad uso irriguo	20 mm x 4 interv. di soccorso estivo		hl	8.000	8.000
Carburante agricolo*	5 tipi di lavorazioni e 16 interventi		kg	177	177
* CO2 prodotta	1 Kg gasolio = 2,64 kg CO2		kg	467	467

<b>VIGNETO</b>						
<b>Input</b>	<b>Caratteristiche</b>	<b>Principi attivi usati</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità media annua/ha</b>	<b>Quantità su 1 ha</b>	<b>Quantità in 25 anni</b>
Prodotti fitosanitari	Diserbante (solo principio attivo)	1	kg	0,32	0,32	8
Prodotti fitosanitari	Anticrittogamico (solo principio attivo)	20	kg	7,45	7,45	186
Prodotti fitosanitari	Insetticida (solo principio attivo)	2	kg	0,07	0,07	2
Concimi chimici	Azoto/fosforo/potassio	3	kg	165	165	4.125
Acqua ad uso irriguo	20 mm x 4 interventi di soccorso estivo		hl	8.000	8.000	200.000
Carburante agricolo*	6 tipi di lavorazioni e 24 interventi		kg	240	240	6.000
* CO2 prodotta	1 Kg gasolio = 2,64 kg CO2		kg	634	634	15.840

<b>FORAGGERE (Erba Medica)</b>						
<b>Input</b>	<b>Caratteristiche</b>	<b>Principi attivi usati</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità media annua/ha</b>	<b>Quantità su 1 ha</b>	<b>Quantità in 25 anni</b>
Prodotti fitosanitari	Diserbante (solo principio attivo)	1	kg	0,037	0,04	1
Prodotti fitosanitari	Anticrittogamico (solo principio attivo)	0	kg	0,00	0,00	0
Prodotti fitosanitari	Insetticida (solo principio attivo)	0	kg	0,00	0,00	0
Concimi chimici	Fosforo/potassio	2	kg	210	210	5.250
Acqua ad uso irriguo	20 mm x 4 interventi di soccorso estivo		hl	0	0	0
Carburante agricolo*	5 tipi di lavorazioni e 7 interventi		kg	165	165	4.125
* CO2 prodotta	1 Kg gasolio = 2,64 kg CO2		kg	436	436	10.890


E' stata poi calcolata la quantificazione degli input in relazione alle diverse opzioni di destinazione d'uso agricolo del suolo raffrontate con la coltura di foraggere integrate nell'impianto fotovoltaico. Le stime sono state commisurate alla superficie occupata dall'impianto, pari a 57 ettari di SAU, sempre nell'arco di 25 anni.

#### RAFFRONTO FRA USI DEL SUOLO DIVERSI SU ha 57 NELL'ARCO DI 25 ANNI

<b>Input</b>	<b>U.M.</b>	<b>FRUMENTO</b>	<b>ACTINIDIA</b>	<b>VIGNETO</b>	<b>FORAGGERE</b>
Diserbanti	kg	382	0	456	53
Anticrittogamici	kg	353	4.760	10.616	0
Insetticidi	kg	0	5	100	0
Concimi chimici	kg	332.025	427.500	235.125	299.250
Acqua ad uso irriguo	hl	0	11.400.000	11.400.000	0
Carburante agricolo*	kg	228.000	252.225	342.000	235.125
* CO2 prodotta	kg	601.920	665.874	902.880	620.730

Visti i volumi utilizzati nelle colture di pregio vale la pena soffermarsi sul tema relativo all'accumulo di fitofarmaci nel suolo. Vi è da dire che non tutti vi residuano in quanto vengono metabolizzati e scomposti in molecole più semplici e degradabili e la scelta progettuale di coltivare foraggere con metodo SQNPI va proprio nella direzione di limitarne al minimo l'impiego per evitare che ciò avvenga.

A questo proposito risulta di notevole interesse un recentissimo studio americano (Widespread Occurrence of Pesticides in Organically Managed Agricultural Soils—the Ghost of a Conventional Agricultural Past? - American Chemical Society - 2021) che ha misurato la concentrazione di sostanze fitosanitarie nel terreno di 100 siti coltivati (su diversi suoli, tipologie di colture e tecniche colturali) con metodo sia convenzionale che biologico. Dalle risultanze emerge che sono stati riscontrati residui di prodotti fitosanitari in tutti i 100 siti anche dopo 20 anni di conduzione biologica; nei terreni coltivati con metodo convenzionale la concentrazione di sostanze fitosanitarie era 9 volte superiore rispetto ai terreni condotti con metodo biologico ed in questi sono stati comunque riscontrati residui di 16 sostanze.



La permanenza di tali sostanze nel suolo influiscono sulla vitalità biologica del medesimo ovvero sulla flora batterica che costituisce un elemento essenziale per la rigenerazione naturale del suolo e sul mantenimento/accrecimento della sua fertilità. In buona sostanza la riduzione degli effetti della coltivazione intensiva sul suolo si ottiene riducendo l'apporto di sostanze vuoi attraverso metodi di produzione almeno integrata o biologica se non mettendo di fatto a riposo significative superfici come si intende fare in abbinamento alla creazione degli impianti fotovoltaici a terra.

Non meno importante è la riduzione di ulteriori input inevitabili ed importanti per la produzione agraria tradizionale come: i concimi di sintesi chimica, l'acqua irrigua (i cui quantitativi utilizzati sono decisamente rilevanti) ed i carburanti impiegati per il funzionamento delle macchine agricole il cui consumo favorisce il perpetuarsi del fabbisogno di combustibili di origine fossile e dall'altro generano gas ad effetto serra fra i quali è facile calcolare la quantità della CO<sub>2</sub>.

Da quanto esposto si può evincere la limitata quantità di input richiesti dalle colture foraggere rispetto a quelle legnose di pregio ovvero la sostanziale equivalenza rispetto un'altra coltura "povera di input" come il frumento (il seminativo più ricorrente) seppure le foraggere siano ancor più virtuose in termini d'impiego di prodotti fitosanitari. Con buona probabilità, la scelta colturale delle foraggere, oltre a possedere una valenza economica significativa, concorre decisamente al riequilibrio ecosistemico del comprensorio.



## **11.0 Monitoraggio agro-ambientale tramite sistemi IOT agritech 4.0**

Le attività agricole svolte all'interno del campo fotovoltaico avranno un ruolo sia produttivo che ecosistemico grazie ad un'adeguata gestione delle stesse nel lungo periodo. Data la complessità del progetto e l'interazione fra diversi soggetti nell'ambito della conduzione dell'impianto (fra i quali i manutentori delle attrezzature fotovoltaiche ed i partner agricoli) si ravvisa l'utilità di favorire in modo innovativo la raccolta e l'elaborazione di informazioni provenienti "dal campo". Ciò al fine di facilitare la formulazione di decisioni funzionali all'organizzazione del lavoro e della produzione nonché al monitoraggio di parametri ambientali. A questo proposito si intende ricorrere ai sistemi IOT (Internet of things) applicati attraverso tecnologie 4.0 ovvero installazione di sensoristica a controllo remoto.

Nel settore agricolo sono ormai molteplici le cosiddette applicazioni "agritech 4.0" che concorrono all'ottimizzazione dei processi produttivi mediante il rilevamento di informazioni con tecnologie elettroniche, la trasmissione a distanza attraverso la rete informatica e la produzione di reportistica decisiva per avviare/modificare/migliorare l'operatività lungo le filiere. Basti pensare ai processori installati su trattori agricoli o macchine da esse portate o trainate con cui è possibile effettuare lavorazioni del terreno o distribuzione di concimi e fitofarmaci con una precisione puntuale secondo i fabbisogni dei diversi tipi di terreno o delle colture.

Nel caso specifico le attività da monitorare sono quelle relative alla produzione apistica e foraggera. All'attività produttiva va aggiunto il monitoraggio di taluni parametri ambientali utili per acquisire esperienza nell'evoluzione microclimatica che interviene in un campo fotovoltaico a terra nel lungo periodo. La si ritiene un'opportunità decisamente interessante vista l'attuale carenza di dati in tal senso ed utile per selezionare sempre meglio le colture più adatte alle nuove condizioni di climax.

### **11.1 Agritech 4.0 nell'attività apistica**

Il monitoraggio in remoto dell'attività apistica ha generato numerosi prodotti tecnologici volti a misurare molteplici parametri fra i quali:

- la produzione di miele (l'incremento produttivo viene misurato mediante una bilancia elettronica posta al di sotto delle singole arnie che registra così il progressivo aumento della produzione nell'arco del tempo);
- lo stato dell'habitat interno all'alveare ed il grado di benessere delle api (in questo caso vengono installati dei sensori all'interno delle arnie per rilevare la temperatura, umidità e la quantità di CO<sub>2</sub> ivi presenti in quanto, se mantenute entro certi limiti grazie alla corretta ventilazione, determinano l'ottimale stato di benessere delle api stesse);
- numero di api presenti nella colonia e presenza/assenza della regina nell'arnia;
- frequenza del suono emesso (in base al suono emesso dalle api - volume e frequenza - è possibile capire l'avvento di una sciamatura - fra 500 e 800 Hz - o lo stato della famiglia indicando l'orfanità, uno stato patologico, un attacco di parassiti, quando la regina è prossima a deporre - 200 Hz - oppure sta deponendo le uova - 170 Hz);
- furto delle arnie, danni causati da animali o dal vento (es.: ribaltamento);

- raffronto della produttività fra colonie;
- condizioni meteorologiche del sito (pressione atmosferica, pioggia, temperatura e umidità);
- localizzazione satellitare delle arnie;
- dati per la determinazione della tracciabilità del miele a garanzia dell'origine del prodotto una volta sul mercato.

I sensori opportunamente installati nelle arnie e in prossimità delle postazioni apistiche invieranno all'operatore tramite la rete le informazioni (dati e allarmi) che potrà comodamente gestire su PC/tablet o smartphone. L'insieme dei dati rilevati ed elaborati consentirà di migliorare la gestione degli apiari, ridurre i trattamenti sanitari sulle api, la necessità di presenza fisica dell'operatore attenuando in questo modo i costi di esercizio e la presenza antropica in sito.

### **11.2 Agritech 4.0 nell'attività foraggera**

L'attività di produzione foraggera può essere monitorata con tecnologia hardware e software ormai consolidata attraverso centraline IOT agrometeorologiche. Esse consentono il monitoraggio delle condizioni climatiche funzionali all'ottimizzazione della produzione foraggera. Quelle più evolute consentono di misurare ed archiviare dati relativi a precipitazioni piovose, umidità e temperatura dell'aria, pressione atmosferica, radiazione solare, bagnatura fogliare, temperatura e umidità del suolo. Ad esempio la misurazione della bagnatura fogliare abbinata all'umidità dell'aria, applicata al caso specifico, consente di poter valutare a distanza il preciso momento in cui effettuare lo sfalcio o la ranghiantura per voltare il fieno durante l'essiccazione; una fase importantissima della fienagione che, se svolta al momento giusto, evita il distacco delle foglioline dagli steli e la relativa dispersione; esse infatti rappresentano la parte più ricca di nutrienti per il bestiame a cui verrà destinato il foraggio. Le centraline dedicate a questo genere di monitoraggio dovranno essere installate sia in campo aperto, libero dall'ombreggiamento generato dai pannelli fotovoltaici sia in luoghi ombreggiati con lo scopo di valutare gli effetti sulle specie coltivate (velocità di accrescimento e produttività per unità di superficie). Risulta di notevole interesse capire in quale modo incida l'ombreggiamento dei pannelli sul suolo e sulle colture specialmente per mitigare l'intenso irraggiamento e l'aumento delle temperature medie indotte dai cambiamenti climatici ormai abbondantemente dimostrati.

### **11.3 Agritech 4.0 e monitoraggio ambientale**

All'intensa acquisizione di dati microclimatici generata dalle attrezzature IOT applicate all'attività apistica e foraggera diverrà utile abbinare un'ulteriore fonte di misurazione attraverso tecnologie dedicate a rilevare parametri ambientali finalizzati alla valutazione della qualità dell'aria. Proprio per il fatto che l'area del campo fotovoltaico godrà della sostanziale riduzione delle attività antropiche e dell'apporto degli input classici applicati ai grandi seminativi potranno essere raccolte informazioni sulla composizione e sulla pulizia dell'aria da confrontare con i dati storici disponibili presso le fonti istituzionali. Fra i parametri rilevabili tramite tecnologie IOT vi sono: monossido di carbonio (CO),

anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), ossigeno molecolare (O<sub>2</sub>), ozono (O<sub>3</sub>), ossido nitrico (NO), biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), anidride solforosa (SO<sub>2</sub>), ammoniaca (NH<sub>3</sub>) e particelle (PM<sub>1</sub> / PM<sub>2.5</sub> / PM<sub>10</sub>).

L'insieme dei dati meteorologici, produttivi e della qualità dell'aria consentiranno di creare un insieme di informazioni la cui analisi statistica potrà contribuire a correlarli fra loro per analizzare le modalità di integrazione della generazione di energia elettrica tramite fotovoltaico a terra e l'attività agricola specializzata, ma a bassa intensità.

Naturalmente tutte le diverse componenti delle applicazioni IOT descritte nei paragrafi precedenti verranno alimentate autonomamente con energia elettrica autoprodotta da pannelli fotovoltaici e batterie dedicate incorporati ai dispositivi.

#### 11.4 Computo metrico estimativo della sensoristica IOT Agritech 4.0

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SENSORISTICA IOT AGRITECH 4.0					
N.	Descrizione dei lavori	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Totale
<b>IOT - Agritech 4.0 - Postazioni apistiche</b>					
1	Fornitura e posa in opera di attrezzature tecnologiche (hardware e software specifico) autoalimentate con pannello fotovoltaico integrato da batteria di accumulo per il monitoraggio di parametri microclimatici e produttivi presso le singole arnie:				
	a) bilancia per la pesatura dell'alveare e della produzione	n°	1	280,00	
	b) monitoraggio del cuore dell'alveare (temperatura, umidità, suono, perdita della regina	n°	1	90,00	
	c) contatore di api in uscita ed entrata, conta delle api morte	n°	1	250,00	
	d) posizionamento GPS	n°	1	40,00	
	Totale per n° 1 arnia			660,00	
	Totale per un massimo di n° 30 ospitabili nelle 3 postazioni apistiche	n°	30	660,00	19.800,00
	presso le singole postazioni apistiche:				
	a) stazione agrometeorologica per il monitoraggio di temperatura, umidità, pressione atmosferica, CO <sub>2</sub>	n°	1	140,00	140,00
	b) Gateway per l'invio delle informazioni ai device remoti	n°	1	250,00	250,00
	<b>Totale</b>				<b>20.190,00</b>
<b>IOT - Agritech 4.0 - Foraggiere</b>					
3	Fornitura e posa in opera di stazione agrometeorologica per il rilevamento di: umidità, temperatura, pioggia, punto di rugiada, pressione atmosferica; radiazione solare, umidità e temperatura del suolo; da installare una in campo aperto ed una in zona ombreggiata dai pannelli fotovoltaici; rilevamento almeno 1 volta all'ora; completa di asta di supporto, GPS per il posizionamento georeferenziato, SIM per l'invio dei dati, hardware e software specifico per la produzione di reportistica di sintesi.	n°	2	9.500,00	19.000,00
<b>IOT - Agritech 4.0 - Monitoraggi ambientali</b>					
4	Fornitura e posa in opera di stazione per il rilevamento di parametri di qualità dell'aria fra cui: ossido di carbonio, anidride carbonica, ossigeno molecolare, ozono, ossido nitrico, biossido di azoto, anidride solforosa, ammoniaca e polveri sottili (PM <sub>1</sub> /2,5/10); completa di posizionamento georeferenziato, SIM per l'invio dei dati raccolti, hardware e software dedicato per il rilevamento, la produzione di report e l'invio dei dati a device remoti.	n°	1	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE ATTREZZATURE IOT AGRITECH 4.0</b>					<b>59.190,00</b>

## 12.0 Cronoprogramma dei lavori

Le numerose attività agronomiche previste per la realizzazione del progetto dovranno rispettare la cadenza stagionale essendo legate alla necessità di effettuare le lavorazioni del suolo in condizioni di tempera e nel rispetto del ritmo biologico delle essenze vegetali da seminare o trapiantare. La cura e l'attenzione alla giusta calendarizzazione dei lavori, consentiranno di ottenere risultati efficaci e duraturi.

Descrizione dei lavori	autunno	inverno	primavera	estate	autunno	inverno	primavera	estate
Concimazioni	x							
Preparazione del terreno	x							
Semina essenze erbacee	x							
Trapianto essenze arbustive			x					
Realizzazione postazioni apistiche			x					
Irrigazioni di soccorso			x	x				x
Sfalcio delle infestanti			x	x			x	x
Potature					x			
Sfalcio prati			x	x				

## 13.0 Quadro economico riassuntivo delle opere agrarie

Di seguito i valori economici riguardanti i costi comprensivi della realizzazione e della manutenzione al 1° anno.

Descrizione dei lavori	Importo Euro
Realizzazione dei prati polifiti nettariiferi	125.257,71
Postazioni apistiche e opere complementari	35.895,00
Sensoristica IOT Agritech 4.0	59.190,00
<b>TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>220.342,71</b>

## 14.0 Opere di mitigazione, descrizione sommaria e computazione dei costi

Data l'affinità dei lavori di tipo vivaistico, legati alla realizzazione delle opere di mitigazione dell'impianto fotovoltaico, con quelli prettamente inerenti le attività agronomiche di cui ai paragrafi precedenti, verrà di seguito sommariamente descritta l'idea progettuale sottesa alla scelta delle specie arbustive ed arboree e della composizione in diverse tipologie.

Dall'analisi dell'uso del suolo effettuata in sito si è provveduto a suddividere il perimetro dell'area oggetto di interesse in tre tratti caratterizzati dai seguenti elementi:

- presenza di superfici arborate ed arbustive lungo le sponde del Fosso della Ficocchia (a ovest) e superfici in aperta campagna comunque caratterizzate dalla presenza di un fosso minore parzialmente imboschito sempre lungo le sponde (a sud-ovest);
- violetto di accesso ad un fabbricato rustico (a nord);
- tratto di contatto con un'area urbanizzata (a sud-est) e in adiacenza a Via Campomorto.

Alla luce di un tanto si è provveduto a differenziare la composizione della fascia di mitigazione al fine di evitare il più possibile un effetto di monotona omogeneità favorendo una sostanziale coerenza con le caratteristiche dei tratti descritti. A questo scopo sono state scelte specie arboree ed arbustive innanzitutto capaci di generare mascheramento in tempi sufficientemente rapidi e adatte a caratterizzare i tratti individuati secondo le seguenti modalità:

1) lungo il tratto a): tipologia di mascheramento "naturaliforme" con presenza prevalente di specie già presenti in sito come olmo, roverella, frassino ossifilo, beretta del prete, prugnolo e viburno; introduzione di leccio e olivo (da allevare in forma cespugliosa) per garantire la presenza di elementi vegetali sempreverdi anche durante il periodo invernale;

2) lungo il tratto b): tipologia "rustica" in cui l'elenco delle specie di cui al punto 1) viene arricchito dalla presenza dell'olivo potato con forma di allevamento produttiva (ne è previsto un filare dedicato in purezza) e del cipresso; un tanto per conferire maggiore tipicità ad un contesto caratteristicamente agricolo come il vialetto di accesso al fabbricato rurale padronale;

3) lungo il tratto c): tipologia "peri-urbana", caratterizzata dall'introduzione di un ulteriore specie caratteristica come il pino domestico a formare col cipresso gruppetti distanziati fra loro in maniera irregolare in modo tale da inserire (grazie all'ulteriore presenza del leccio) elementi di paesaggio affini più possibile a luoghi di pregio come i giardini delle ville storiche o siti di rilevanza archeologica. Si è infine inteso rendere coerente la scelta delle specie con la tradizione di epoca storica legata agli *arbores urbanae* ovvero delle piante utilizzate dai Romani in ambito urbano per motivi legati all'estetica e alla produzione di frutti (l'olivo, il pino domestico, l'olmo e il cipresso).

Segue la descrizione dei lavori da realizzare e dei relativi computi metrici estimativi.

COMPUTO DEGLI INSERIMENTI ARBOREI ED ARBUSTIVI

CONDIZIONE AMBIENTALE DEI LUOGHI DI INTERVENTO



PERIMETRO DELL'AREA DESTINATA A PARCO FOTOVOLTAICO



Mappa dell'area di intervento con l'indicazione delle diverse tipologie di mitigazione ambientale

Tipologia	Lung. m	Larg. m	Tipologia	Lung. m	Larg. m	Tipologia	Lung. m	Larg. m
Naturaliforme	1.315,00	7,00	Rustica	1.200,00	7,00	Peri Urbana	1.190,00	7,00

## Tipologia "Naturaliforme"

Descrizione	Largh. m	Lungh. m	Superficie m <sup>2</sup>
La mitigazione ambientale si compone di un'area complessiva di m <sup>2</sup> 9.450,00, della larghezza complessiva di m 7,00, articolata al suo interno con formazioni lineari arboreo arbustivi. L'intera larghezza della fascia verrà preventivamente seminata a prato utilizzando specie erbacee idonee al contesto dei luoghi, utilizzando e possibilmente fiorume generato dai prati stabili presenti nella zona.	7,00	1.315,00	9.450,00

Descrizione	Largh. m	Lungh. m	Superficie m <sup>2</sup>
Partendo dalla recinzione del Parco fotovoltaico, viene inserita una prima fascia di arbusti misti con specie a foglia caduca e persistente, m. 3,00 di larghezza. Distanza sulla fila, fra pianta e pianta m 2,00. Ingombro per singola pianta m <sup>2</sup> 6,00	3,00	1.315,00	3.945,00

Specie arbustive	%	Superficie m <sup>2</sup>	Ingombro per pianta	N° tot. piante	N° piante per specie
<i>Berretta da prete</i> ( <i>Euonymus europeaus</i> )	10	3.945,00	6,00	658	66
<i>Ligustro</i> ( <i>Ligustrum ovalifolium</i> )	15				99
<i>Frangola</i> ( <i>Frangula alnus</i> )	15				99
<i>Olivo (cesp.)</i> ( <i>Olea europaea var. aut.</i> )	15				99
<i>Prugnolo</i> ( <i>Prunus spinosa</i> )	15				98
<i>Leccio (cesp)</i> ( <i>Quercus ilex</i> )	15				99
<i>Viburno</i> ( <i>Viburnum tinus</i> )	15				98
<b>Totali</b>	<b>100</b>				

Descrizione	Largh. m	Lungh. m	Superficie m <sup>2</sup>
A seguire una seconda fascia con specie arboree poste in filare, con distribuzione randomizzata. Distanza tra le piante sulla fila m. 4,00 Ingombro per singola pianta m <sup>2</sup> 16,00.	4,00	1.315,00	5.260,00

Specie arboree	%	Superficie m <sup>2</sup>	Ingombro per pianta	N° tot. piante	N° piante per specie
<i>Roverella</i> ( <i>Quercus pubescens</i> )	20	5.260,00	12,00	328	66
<i>Frassino ossifillo</i> ( <i>Fraxinus oxycarpa</i> )	20				65
<i>Leccio</i> ( <i>Quercus ilex</i> )	20				65
<i>Bagolaro</i> ( <i>Celtis australis</i> )	20				66
<i>Olmo campestre</i> ( <i>Ulmus minor</i> )	20				66
<b>Totali</b>	<b>100</b>				



## Tipologia "Rustica"

Descrizione	Largh. m	Lungh. m	Superficie m <sup>2</sup>
La mitigazione ambientale si compone di un'area complessiva di m <sup>2</sup> 8.890,00, della larghezza complessiva di m 7,00, articolata al suo interno con formazioni lineari arboreo arbustivi. L'intera larghezza della fascia verrà preventivamente seminata a prato utilizzando specie erbacee idonee al contesto dei luoghi, utilizzando fiorume generato dai prati stabili presenti nella zona.	7,00	1.200,00	8.400,00

Descrizione	Largh. m	Lungh. m	Superficie m <sup>2</sup>
Partendo dalla recinzione del Parco fotovoltaico, viene inserita una prima fascia della larghezza di m. 2,00, composta da varie specie di arbusti con elementi a foglia caduca e persistente, con alternata una presenza di una specie arborea (ogni m 20,00). Distanza sulla fila, fra pianta e pianta m 3,00. Ingombro per singola pianta m <sup>2</sup> 6,00	2,00	1.200,00	2.400,00 totale
	Di cui ad arbusti misti		2.040,00
Come indicato all'interno della fascia viene previsto ogni m 20,00 l'inserimento di una pianta di cipresso ( <i>Cupressus sempervirens</i> ) a caratterizzare una alterna volumetria vegetale (n° piante m 1.200,00 : 20 = 60 piante).			A cipresso 360,00

Specie arbustive	%	Superficie m <sup>2</sup>	Ingombro per pianta	N° tot. piante	N° piante per specie
<i>Berretta da prete (Euonymus europeaus)</i>	10	2.040,00	6,00	340	34
<i>Ligustro (Ligustrum ovalifolium)</i>	15				51
<i>Frangola (Frangula alnus)</i>	15				51
<i>Olivo (cesp.) (Olea europaea var. aut.)</i>	15				51
<i>Prugnolo (Prunus spinosa)</i>	15				51
<i>Leccio (cesp) (Quercus ilex)</i>	15				51
<i>Viburno (Viburnum tinus)</i>	15				51
<b>Totali</b>	100				340

Specie arboree	%	Superficie m <sup>2</sup>	Ingombro per pianta	N° tot. piante	N° piante per specie
<i>Cipresso (Cupressus sempervirens)</i>	100	360,00	6,00	60	60

Descrizione	Largh. m	Lungh. m	Superficie m <sup>2</sup>		
Una seconda fascia della larghezza complessiva di m 5,00, caratterizzata da un impianto di Olivo ( <i>Olea europaea var. autoctone</i> ). Si precisa che le piante verranno inserite alla distanza di m 3,00 dal ciglio stradale, nel rispetto delle distanze legali dai confini. Distanza tra le piante sulla fila m. 5,00 Ingombro per singola pianta m <sup>2</sup> 25,00.	5,00	1.200,00	6.000,00		
Specie arboree	%	Superficie m <sup>2</sup>	Ingombro per pianta	N° tot. piante	N° piante per specie
<i>Olivo (Olea europaea var. autoctone).</i>	100	6.000,00	25,00	240	240
<b>Totali</b>				240	



## Tipologia "Peri Urbana"


Descrizione	Largh. m	Lungh. m	Superficie m <sup>2</sup>
La mitigazione ambientale si compone di un'area complessiva di m <sup>2</sup> 13.090,00, della larghezza complessiva di m 11,00, articolata al suo interno in due porzioni:	11,00	1.190,00	13.090,00
Una prima parte della larghezza di m 3,00 occupata da una capezzagna che verrà comunque inerbita.	3,00	1.190,00	3.570,00
Una seconda area all'interno della larghezza di m 8,00 in cui viene previsto l'impianto di formazioni lineari arboreo arbustive. L'intera larghezza di questa seconda porzione verrà seminata a prato utilizzando specie erbacee idonee al contesto dei luoghi, utilizzando e possibilmente fiorume generato dai prati stabili presenti nella zona.	8,00	1.190,00	9.520,00

Descrizione	Largh. m	Lungh. m	Superficie m <sup>2</sup>
Partendo dalla recinzione del Parco fotovoltaico, viene inserita una prima fascia di arbusti misti con specie a foglia caduca e persistente della larghezza di m. 2,00. Distanza sulla fila, fra pianta e pianta m 3,00. Ingombro per singola pianta m <sup>2</sup> 6,00	2,00	1.190,00	2.380,00
<b>Specie arbustive</b>	<b>%</b>	<b>Superficie m<sup>2</sup></b>	<b>Ingombro per pianta</b>
<i>Olmo campestre (Ulmus minor)</i>	10	2.380,00	6,00
<i>Acer campestre (Acer campestre)</i>	15		
<i>Ligustro (Ligustrum ovalifolium)</i>	15		
<i>Alloro (Laurus nobilis)</i>	15		
<i>Olivo (cesp.) (Olea europaea var. aut.)</i>	15		
<i>Leccio (cesp) (Quercus ilex)</i>	15		
<i>Viburno (Viburnum tinus)</i>	15		
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>N° tot. piante</b>
			<b>N° piante per specie</b>
			397
			40
			60
			60
			59
			59
			59
			60
			397


Descrizione	Largh. m	Lungh. m	Superficie m <sup>2</sup>
Una seconda fascia della larghezza complessiva di m 6,00, oggetto di impianto arboreo formato da due specie tipiche dei luoghi: pino domestico e cipresso. Si precisa che le piante verranno inserite alla distanza di m 3,00 dal ciglio della capezzagna e che l'impianto sarà attuato con nuclei monospecifici alternati di 6 esemplari ciascuno. Distanza tra le piante sulla fila m. 6,00 Ingombro per singola pianta m <sup>2</sup> 30,00.	5,00	1.190,00	5.950,00

Specie arboree	%	Superficie m <sup>2</sup>	Ingombro per pianta	N° tot. piante	N° piante per specie
<i>Cipresso (Cupressus sempervirens)</i>	50	5.950,00	30,00	198	99
<i>Pino domestico (Pinus pinea)</i>	50				99
<b>Totali</b>	<b>100</b>				<b>198</b>


## SCHEMATIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI



m 1,50	m 2,50	m 3,00	Distanza impianti
m 2,00	m 5,00		Dimensione fasce
m 7,00			Larghezza mitigazione



m 1,50	m 3,00	m 3,00	Distanza impianti
m 2,00	m 5,00		Dimensione fasce
m 7,00			Larghezza mitigazione



m 1,50	m 3,00	m 3,00		Altra proprietà
Distanza impianti				
m 2,00	m 6,00	m 3,00		
Dimensione fasce				
m 11,00				
Larghezza mitigazione				

## QUADRO COMPLESSIVO DEGLI IMPIANTI

Specie arboree	Numero piante per tipologia di mitigazione			N° Piante
	"Naturaliforme"	"Rustica"	"Peri Urbana"	
<i>Roverella (Quercus pubescens)</i>	66			66
<i>Frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa)</i>	65			65
<i>Leccio (Quercus ilex)</i>	65			65
<i>Bagolaro (Celtis australis)</i>	66			66
<i>Olmo campestre (Ulmus minor)</i>	66			66
<i>Cipresso (Cupressus sempervirens)</i>		60	99	159
<i>Olivo (Olea europaea var. autoctone)</i>		240		240
<i>Pino domestico (Pinus pinea)</i>			99	99
<b>Totale alberi</b>	<b>328</b>	<b>300</b>	<b>198</b>	<b>826</b>
Specie arbustive	Numero piante per tipologia di mitigazione			N° Piante
	"Naturaliforme"	"Rustica"	"Peri Urbana"	
<i>Olmo campestre (Ulmus minor)</i>			40	40
<i>Acero campestre (Acer campestre)</i>			60	60
<i>Alloro (Laurus nobilis)</i>			59	59
<i>Berretta da prete (Euonymus europaeus)</i>	66	34		100
<i>Ligustro (Ligustrum ovalifolium)</i>	99	51	60	210
<i>Frangola (Frangula alnus)</i>	99	51		150
<i>Olivo (cesp.) (Olea europaea var. aut.)</i>	99	51	59	209
<i>Prugnolo (Prunus spinosa)</i>	98	51		149
<i>Leccio (cesp) (Quercus ilex)</i>	99	51	59	209
<i>Viburno (Viburnum tinus)</i>	98	51	60	209
<b>Totale arbusti</b>	<b>658</b>	<b>340</b>	<b>397</b>	<b>1.395</b>
Aree destinate alla semina del prato	Superficie m <sup>2</sup>			Totale m <sup>2</sup>
	"Naturaliforme"	"Rustica"	"Peri Urbana"	
	9.450,00	8.400,00	13.090,00	<b>30.940,00</b>
Numero complessivo di elementi vegetali di nuovo impianto				
Specie	"Naturaliforme"	"Rustica"	"Peri Urbana"	N° Piante
Arboree	<b>328</b>	<b>300</b>	<b>198</b>	<b>826</b>
Arbustive	<b>658</b>	<b>340</b>	<b>397</b>	<b>1.395</b>
<b>Totale impianti</b>				<b>2.221</b>

**COMPUTO METRICO**

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	Quantità	Prezzo Unitario Euro	IMPORTO in Euro
01		Esecuzione di lavori di preparazione del terreno per l'impianto e l'inerbimento delle superfici, compreso trattamento diserbante preventivo, frangizollatura o erpicatura del terreno su superficie piana o inclinata, eseguita con idoneo mezzo meccanico, compreso ogni onere per l'esecuzione dell'operazione a perfetta regola d'arte	€/m <sup>2</sup>	<b>30.940,00</b>	0,35	<b>10.829,00</b>
02		In presemina, fornitura in cantiere di concime della tipologia indicata per ettaro di terreno trattato: concime composto da perfosfato minerale 46/48 3 qli e solfato potassico 52/50 3qli, comprensiva di distribuzione e spargimento di concime di fondo sul terreno preventivamente preparato all'accoglimento dello stesso in maniera uniforme sull'area da trattare con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso ogni onere, esclusa la preparazione del terreno	€/ha	<b>3,094</b>	400,00	<b>1.237,60</b>
03		Esecuzione dei tracciamenti e picchettamenti sul terreno necessari per la completa localizzazione planimetrica ed altimetrica dei filari e delle buchette per la messa a dimora delle piante di vario tipo e dimensioni, eseguiti con strumenti topografici adeguati da personale qualificato,	€/ha	<b>3,094</b>	450,00	<b>1.392,30</b>

N.	Cod. elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI		U.M	Quantità	Prezzo Unitario Euro	IMPORTO in Euro
04		FORNITURA DI SPECIE ARBOREE AUTOCTONE Completa di manutenzione periodica necessaria, compresi oneri ed accessori fino a collaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione gratuita delle essenze eventualmente morte, compreso ogni onere e mezzo per l'impianto delle fallanze					
		<i>Roverella (Quercus pubescens)</i>	Pianta ad altofusto in zolla, circ. 14 - 16 cm, H ml 3,00-3,50	€/cad	<b>66</b>	180,00	11.880,00
		<i>Frassino (Fraxinus oxycarpa)</i>	Pianta ad altofusto in zolla, circ. 10 - 12 cm, H ml 3,00-3,50	€/cad	<b>65</b>	75,00	4.875,00
		<i>Leccio (Quercus ilex)</i>	Pianta ad altofusto in zolla, circ. 10 - 12 cm, H ml 3,00-3,50	€/cad	<b>65</b>	75,00	4.875,00
		<i>Bagolaro (Celtis australis)</i>	Pianta ad altofusto in zolla, circ. 10 - 12 cm, H ml 3,00-3,50	€/cad	<b>66</b>	75,00	4.950,00
		<i>Olivo (Olea europaea var. autoctone)</i>	Pianta ad altofusto in zolla, circ. 10 - 12 cm, H ml 3,00-3,50	€/cad	<b>240</b>	130,00	31.200,00
		<i>Olmo (Ulmus minor)</i>	Pianta ad altofusto in zolla, circ. 10 - 12 cm, H ml 3,00-3,50	€/cad	<b>66</b>	65,00	4.290,00
		<i>Pino domestico (Pinus pinea)</i>	Pianta ad altofusto in zolla, circ. 20 - 22 cm, H ml 3,00-3,50	€/cad	<b>99</b>	250,00	24.750,00
		<i>Cipresso (Cupressus sempervirens)</i>	Pianta ad altofusto in zolla, H ml 3,00-3,50	€/cad	<b>159</b>	70,00	11.130,00
					<b>826</b>		<b>97.950,00</b>

N.	Cod. elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro	
05		MESSA A DIMORA DI ALBERI IN AREA VERDE Esecuzione di messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'Impresa, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi ed una bagnatura con 50 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante.	€/cad	<b>826</b>	50,00	<b>41.300,00</b>	
06		FORNITURA DI SPECIE ARBUSTIVE AUTOCTONE Completa di manutenzione periodica necessaria, compresi oneri ed accessori fino a collaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione gratuita delle essenze eventualmente morte, compreso ogni onere e mezzo per l'impianto delle fallanze					
		<i>Olmo campestre (Ulmus minor)</i>	Pianta in zolla, circ. 6 - 8 cm, H ml 1,50-2,00	€/cad	<b>40</b>	35,00	1.400,00
		<i>Acer campestre (Acer campestre)</i>	Pianta in zolla, circ. 6 - 8 cm, H ml 1,50-2,00	€/cad	<b>60</b>	30,00	1.800,00
		<i>Ligustro (Ligustrum ovalifolium)</i>	pianta a cespuglio forte ramificato h, 1,00 – 1,50	€/cad	<b>59</b>	30,00	1.770,00
		<i>Viburno (Viburnum tinus)</i>	pianta a cespuglio forte ramificato h, 1,00 – 1,50	€/cad	<b>100</b>	35,00	3.500,00
		<i>Frangola (Frangula alnus)</i>	pianta a cespuglio forte ramificato h, 1,00 – 1,50	€/cad	<b>210</b>	40,00	8.400,00
		<i>Alloro (Laurus nobilis)</i> 63	pianta a cespuglio forte ramificato h, 1,00 – 1,50	€/cad	<b>150</b>	40,00	6.000,00
		<i>Olivo (cesp.) (Olea europaea var. aut.)</i>	pianta a cespuglio forte ramificato h, 1,00 – 1,50	€/cad	<b>209</b>	50,00	10.450,00
		<i>Berretta da prete (Euonymus europeaus)</i>	pianta a cespuglio forte ramificato h, 1,00 – 1,50	€/cad	<b>149</b>	35,00	5.215,00
		<i>Leccio (cesp) (Quercus ilex)</i>	pianta a cespuglio forte ramificato h, 1,00 – 1,50	€/cad	<b>209</b>	75,00	15.675,00
		<i>Prugnolo (Prunus spinosa)</i>	pianta in zolla, circ. 8- 10 cm, H ml 1,50-2,00	€/cad	<b>209</b>	20,00	4.180,00
					<b>1.395</b>		<b>58.390,00</b>

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
07		MESSA A DIMORA DI ARBUSTIVE AUTOCTONE Comprensiva di impianto e posa di tela pacciamante sulla fila, completa di manutenzione periodica necessaria, compresi oneri ed accessori fino a collaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione gratuita delle essenze eventualmente morte, compreso ogni onere e mezzo per l'impianto delle fallanze	€/cad	<b>1.395</b>	20,00	<b>27.900,00</b>
08		Esecuzione di inerbimento con idrosemina potenziata, su superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina, compresa la fornitura delle sementi (40 g/m <sup>2</sup> ), e la rullatura del terreno.	€/m <sup>2</sup>	<b>30.940,00</b>	0,90	<b>27.846,00</b>
09		Esecuzione di sfalcio degli interfilari nell'area boscata da eseguire almeno due volte nel primo anno di impianto, con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, con utilizzo di mezzi meccanici e completamento manuale del taglio ove occorra, senza raccolta del materiale, valutata per ettaro di bosco trattato	€/m <sup>2</sup>	<b>30.940,00</b>	0,70	<b>21.658,00</b>
10		Esecuzione di potatura di formazione da effettuare nel primo anno di impianto, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento, valutata per ettaro di impianto	€/pianta	<b>2.221</b>	1,50	<b>3.331,50</b>

Riepilogo computo per voce	N.	IMPORTI PARZIALI Euro	IMPORTO COMPLESSIVO Euro
	01	10.829,00	<b>291.834,40</b>
02	1.237,60		
03	1.392,30		
04	97.950,00		
05	41.300,00		
06	58.390,00		
07	27.900,00		
08	27.846,00		
09	21.658,00		
10	3.331,50		



N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	Prezzo Unitario in Euro	
06		FORNITURA DI SPECIE ARBUSTIVE AUTOCTONE Completa di manutenzione periodica necessaria, compresi oneri ed accessori fino a collaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione gratuita delle essenze eventualmente morte, compreso ogni onere e mezzo per l'impianto delle fallanze			
		<i>Olmo campestre (Ulmus minor)</i>	Pianta in zolla, circ. 6 - 8 cm, ml 1,50-2,00	€/cad	35,00
		<i>Acer campestre (Acer campestre)</i>	Pianta in zolla, circ. 6 - 8 cm, H ml 1,50-2,00	€/cad	30,00
		<i>Ligustro (Ligustrum ovalifolium)</i>	pianta a cespuglio forte ramificato h, 1,00 – 1,50	€/cad	30,00
		<i>Viburno (Viburnum tinus)</i>	pianta a cespuglio forte ramificato h, 1,00 – 1,50	€/cad	35,00
		<i>Frangola (Frangula alnus)</i>	pianta a cespuglio forte ramificato h, 1,00 – 1,50	€/cad	40,00
		<i>Alloro (Laurus nobilis)</i> 63	pianta a cespuglio forte ramificato h, 1,00 – 1,50	€/cad	40,00
		<i>Olivo (cesp.) (Olea europaea var. aut.)</i>	pianta a cespuglio forte ramificato h, 1,00 – 1,50	€/cad	50,00
		<i>Berretta da prete (Euonymus europeaus)</i>	pianta a cespuglio forte ramificato h, 1,00 – 1,50	€/cad	35,00
		<i>Leccio (cesp) (Quercus ilex)</i>	pianta a cespuglio forte ramificato h, 1,00 – 1,50	€/cad	75,00
		<i>Prugnolo (Prunus spinosa)</i>	pianta in zolla, circ. 8- 10 cm, H ml 1,50-2,00	€/cad	20,00
07		MESSA A DIMORA DI ARBUSTIVE AUTOCTONE Comprensiva di impianto e posa di tela pacciamante sulla fila, completa di manutenzione periodica necessaria, compresi oneri ed accessori fino a collaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione gratuita delle essenze eventualmente morte, compreso ogni onere e mezzo per l'impianto delle fallanze	€/cad	20,00	
08		Esecuzione di inerbimento con idrosemina potenziata, su superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina, compresa la fornitura delle sementi (40 g/m <sup>2</sup> ), e la rullatura del terreno.	€/m <sup>2</sup>	0,90	
09		Esecuzione di sfalcio degli interfilari nell'area boscata da eseguire almeno due volte nel primo anno di impianto, con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, con utilizzo di mezzi meccanici e completamento manuale del taglio ove occorra, senza raccolta del materiale, valutata per ettaro di bosco trattato	€/m <sup>2</sup>	0,70	
10		Esecuzione di potatura di formazione da effettuare nel primo anno di impianto, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento, valutata per ettaro di impianto	€/pianta	1,50	

## ELENCO PREZZI

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	Prezzo Unitario in Euro	
01		Esecuzione di lavori di preparazione del terreno per l'impianto e l'inerbimento delle superfici, compreso trattamento diserbante preventivo, frangizollatura o erpicatura del terreno su superficie piana o inclinata, eseguita con idoneo mezzo meccanico, compreso ogni onere per l'esecuzione dell'operazione a perfetta regola d'arte	€/m <sup>2</sup>	0,35	
02		In presemina, fornitura in cantiere di concime della tipologia indicata per ettaro di terreno trattato: concime composto da perfosfato minerale 46/48 3 qli e solfato potassico 52/50 3qli, comprensiva di distribuzione e spargimento di concime di fondo sul terreno preventivamente preparato all'accoglimento dello stesso in maniera uniforme sull'area da trattare con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso ogni onere, esclusa la preparazione del terreno	€/ha	400,00	
03		Esecuzione dei tracciamenti e picchettamenti sul terreno necessari per la completa localizzazione planimetrica ed altimetrica dei filari e delle buchette per la messa a dimora delle piante di vario tipo e dimensioni, eseguiti con strumenti topografici adeguati da personale qualificato,	€/ha	450,00	
04		<b>FORNITURA DI SPECIE ARBOREE AUTOCTONE</b> completa di manutenzione periodica necessaria, compresi oneri ed accessori fino a collaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione gratuita delle essenze eventualmente morte, compreso ogni onere e mezzo per l'impianto delle fallanze			
		<i>Roverella (Quercus pubescens)</i>	Pianta ad altofusto in zolla, circ. 14 - 16 cm, H ml 3,00-3,50	€/cad	180,00
		<i>Frassino (Fraxinus oxycarpa)</i>	Pianta ad altofusto in zolla, circ. 10 - 12 cm, H ml 3,00-3,50	€/cad	75,00
		<i>Leccio (Quercus ilex)</i>	Pianta ad altofusto in zolla, circ. 10 - 12 cm, H ml 3,00-3,50	€/cad	75,00
		<i>Bagolaro (Celtis australis)</i>	Pianta ad altofusto in zolla, circ. 10 - 12 cm, H ml 3,00-3,50	€/cad	75,00
		<i>Olivo (Olea europaea var. autoctone)</i>	Pianta ad altofusto in zolla, circ. 10 - 12 cm, H ml 3,00-3,50	€/cad	130,00
		<i>Olmo (Ulmus minor)</i>	Pianta ad altofusto in zolla, circ. 10 - 12 cm, H ml 3,00-3,50	€/cad	65,00
		<i>Pino domestico (Pinus pinea)</i>	Pianta ad altofusto in zolla, circ. 20 - 22 cm, H ml 3,00-3,50	€/cad	250,00
		<i>Cipresso (Cupressus sempervirens)</i>	Pianta ad altofusto in zolla, H ml 3,00-3,50	€/cad	70,00
05		<b>MESSA A DIMORA DI ALBERI IN AREA VERDE</b> Esecuzione di messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'Impresa, compreso il rinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi ed una bagnatura con 50 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante.	€/cad	50,00	

Udine, 25/02/2022

Il Tecnico  
Per. Agr. Giovanni Cattaruzzi

