

# REGIONE BASILICATA

## COMUNE DI CRACO

ELABORATO  
A.12.a.10  
Carta idrogeologica

fg.33  
part.15-21-27-91-106-166-168-704

fg.21  
part. 30-31-32



### COMPLESSI DEI DEPOSITI MARINI PLIO-QUATERNARI

	<p><b>Complesso sabbioso-conglomeratico:</b> Depositi clastici sabbioso-ghisiosi da incoerenti a scarsamente cementati, ascrivibili alle fasi regressive iniziate nel Pleistocene inferiore (del ciclo bradanico: Sabbie di Monte Marano, Calcareniti di Monte Castiglione, Conglomerato di Irsina). Costituiscono acquiferi anche di buona trasmissività, ma in genere, per il frazionamento della circolazione idrica sotterranea, danno luogo a sorgenti di portata modesta, in corrispondenza di limiti di permeabilità indefiniti o definiti con i sottostanti terreni argillosi.</p>	
	<p><b>Complesso argilloso:</b> Depositi costituiti da argille ed argille siltose e sabbiose marine ascrivibili alla trasgressione che ha interessato estesamente la Fossa Bradanica, tra il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore. Costituiscono limiti di permeabilità, al contatto con i depositi del complesso sabbioso-conglomeratico, ai quali sono sottoposti stratigraficamente, o con gli altri acquiferi ai quali essi sono giustapposti verticalmente e/o lateralmente.</p>	

Estratto da mappa  
Scala 1:150.000

