


Corine Land Cover anno 2012 IV Livello

- 1.1.1 Tessuto urbano continuo
- 1.1.2 Tessuto urbano discontinuo
- 1.2.1 Aree industriali e commerciali
- 1.2.2 Reti stradali e ferroviarie
- 1.2.3 Aree portuali
- 1.2.4 Aeroporti
- 1.3.1 Aree esterne
- 1.3.2 Discariche
- 1.3.3 Cantieri
- 1.4.1 Aree verdi urbane
- 1.4.2 Aree sportive e ricreative
- 2.1.1 Seminati in aree non irrigue
- 2.1.2 Seminati in aree irrigue
- 2.2.1 Prati
- 2.2.1.1 Vigneti
- 2.2.2 Prati e tutti secolari
- 2.2.3 Oliveti
- 2.2.4 Colture da legno
- 2.3.1 Prati stabili
- 2.4.1 Colture annuali associate a colture permanenti
- 2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi
- 2.4.3 Aree prevalentemente occupate da colture agrarie
- 2.4.4 Aree agroforestali
- 3.1.1 Boschi di latifoglie
- 3.1.2 Boschi di conifere
- 3.1.3 Boschi misti
- 3.2.1 Aree a pascolo naturale
- 3.2.2 Steppe e cespugliati
- 3.2.3 Aree a vegetazione sclerofilla
- 3.2.4 Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione
- 3.3.1 Praterie, praterie e prati
- 3.3.2 Rocce nude, fessure, rupi e affioramenti
- 3.3.4 Aree percorse da incendi
- 3.3.5 Chiazze e neri perenni
- 4.1.1 Paludi interne
- 4.1.2 Torbire
- 4.2.1 Paludi salmastre
- 4.2.2 Saline
- 4.3.1 Zone intertidali
- 5.1.1 Corsi d'acqua, canali e sbocchi
- 5.1.2 Bacini d'acqua
- 5.2.1 Lagune
- 5.2.2 Estuari
- 5.2.3 Marea
- 1.2.1.1 Impedimento industriale o artigianale con spazi annessi
- 2.1.1.1 Colture estensive
- 2.1.1.2 Colture intensive
- 2.2.4.1 Poponatura
- 2.2.4.2 Colture stagionali
- 2.2.4.3 Eucalipti
- 2.2.4.4 Conifere
- 2.2.4.5 Impianti misti di latifoglie e conifere
- 3.1.1.1 Boschi a prevalenza di querce e altre latifoglie sempreverdi (quasi liscio e sughero)
- 3.1.1.2 Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (carro aio roverella aio farnetto aio rovero aio farnia)
- 3.1.1.3 Boschi misti a prevalenza di altre latifoglie sudoccidentali (latifoglie mesofite e mesomediterranee quali acero-farnasio, carpino)
- 3.1.1.4 Boschi a prevalenza di castagno
- 3.1.1.5 Boschi a prevalenza di faggio
- 3.1.1.6 Boschi a prevalenza di igrofilo (quasi salici aio pioppo aio ontano, ecc.)
- 3.1.1.7 Boschi ad associazioni a prevalenza di latifoglie esotiche (quasi robinia, « alaterno »)
- 3.1.2.1 Boschi a prevalenza di pini mediterranei e cipressi (pino domestico, pino maritimo, pino d'Aleppo)
- 3.1.2.2 Boschi a prevalenza di pini nord-mediterranei e montani (pino nero e lacio, pino silvestre, pino siciliano)
- 3.1.2.3 Boschi a prevalenza di abeti (quasi bianco aio rosso)
- 3.1.2.4 Boschi a prevalenza di larice aio pino cembro
- 3.1.2.5 Boschi ad associazioni a prevalenza di conifere esotiche (quasi douglasia, pino insignis, pino strobo)
- 3.2.1.1 Praterie continenti
- 3.2.1.2 Praterie mediterranee
- 3.2.1.3 Macchia alta
- 3.2.1.4 Macchia bassa e garrigue
- 3.2.4.1 Cespugliati con presenza significativa di specie arbustive alla ed arborea
- 3.3.1.1 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di querce e altre latifoglie sempreverdi (quasi liscio e sughero)
- 3.3.1.2 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di querce caducifoglie (carro aio roverella aio farnetto aio rovero)
- 3.3.1.3 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di altre latifoglie sudoccidentali (latifoglie mesofite e mesomediterranee qu)
- 3.3.1.4 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di castagno
- 3.3.1.5 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di faggio
- 3.3.1.6 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di igrofilo (quasi salici aio pioppo aio ontano, ecc.)
- 3.3.1.7 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di specie esotiche
- 3.3.2.1 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini mediterranei e cipressi (pino domestico, pino maritimo, pino)
- 3.3.2.2 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini nord-mediterranei e montani (pino nero e lacio, pino silvestre, pino siciliano)
- 3.3.2.3 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di abeti (quasi bianco aio rosso)
- 3.3.2.4 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di larice aio pino cembro
- 3.3.2.5 Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di douglasia, pino insignis, pino strobo

USO DEL SUOLO

- Limite scheda di riferimento
- Oliveti
- Seminaio
- Buffer 10 metri dalla linea di connessione uso del suolo Oliveto
- Buffer 10 metri dalla linea di connessione uso del suolo Seminaio

LEGENDA



- Limite ISTAT Regioni
- Limite ISTAT Comuni
- Limite impianto FV
- Limite lotto



Sfondo Immagine Satellitare

 DS ITALIA 1 SRL	DS ITALIA 1 S.R.L. Via del Plebiscito 112, 00186 Roma (RM) P. IVA - 15926361005 dsitalia1sr@legalmail.it	REGIONE MOLISE
		PROVINCIA CAMPOBASSO
		COMUNI ROTELLO
PROGETTO		
Impianto Agrosolare Rotello 52.7		
Identificatore	Titolo	Scala
AG052RT-20	Carta dell'Uso del Suolo	1:15.000
PROFESSIONISTI		Data
Firma digitale		Aprile 2022
Dott. Geologo Giancarlo Rocco Di Berardino g.diberardino@proes.it		
Dotto.ssa Biologa Claudia Nuzzi c.nuzzi@proes.it		
RESPONSABILE TECNICO PROES SRL		Firma digitale
Ing. Maurizio Elisio m.elisio@proes.it		
PROPONENTE		Firma digitale
DS ITALIA 1 S.R.L.		