



- Conte Land Cover anno 2012 IV Livello
- 1.1.1. Tessuto urbano continuo
  - 1.1.2. Tessuto urbano discontinuo
  - 1.2.1. Aree industriali o commerciali
  - 1.2.2. Reti stradali e ferroviarie
  - 1.2.3. Aree portuali
  - 1.2.4. Aeroporti
  - 1.3.1. Aree estrattive
  - 1.3.2. Discariche
  - 1.3.3. Cantieri
  - 1.4.1. Aree verdi urbane
  - 1.4.2. Aree sportive e ricreative
  - 2.1.1. Seminali in aree non irrigue
  - 2.1.2. Seminali in aree irrigue
  - 2.1.3. Risaie
  - 2.2.1. Vigneti
  - 2.2.2. Frutteti e frutti minori
  - 2.2.3. Oliveti
  - 2.2.4. Arboricoltura da legno
  - 2.3.1. Prati stabili
  - 2.4.1. Colture annuali associate a colture permanenti
  - 2.4.2. Sistemi colturali e partecellari complessi
  - 2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie
  - 2.4.4. Aree agroforestali
  - 3.1.1. Boschi di latifoglie
  - 3.1.2. Boschi di conifere
  - 3.1.3. Boschi misti
  - 3.2.1. Aree a pascolo naturale
  - 3.2.2. Brughiere e cespuglieti
  - 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla
  - 3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione
  - 3.3.1. Spiagge, dune e sabbie
  - 3.3.2. Rocce nude, faliese rupi e affioramenti
  - 3.3.3. Aree con vegetazione rada
  - 3.3.4. Aree percorse da incendi
  - 3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni
  - 4.1.1. Paludi interne
  - 4.1.2. Torbiere
  - 4.2.1. Paludi salmastre
  - 4.2.2. Salme
  - 4.2.3. Zone intertidali
  - 5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie
  - 5.1.2. Bacini d'acqua
  - 5.2.1. Lagune
  - 5.2.2. Estuari
  - 5.2.3. Mare
  - 1.2.1.1. Insediamento industriale o artigianale con spazi annessi
  - 2.1.1.1. Colture intensive
  - 2.1.1.2. Colture estensive
  - 2.2.4.1. Pioppicoltura
  - 2.2.4.2. Latifoglie pregiate
  - 2.2.4.3. Eucalipti
  - 2.2.4.4. Conifere
  - 2.2.4.5. Impianti misti di latifoglie e conifere
  - 3.1.1.1. Boschi a prevalenza di querce e altre latifoglie sempreverdi (quali leccio e sughero)
  - 3.1.1.2. Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (corno a rovesello e/o farnetto e/o rovero e/o farnia)
  - 3.1.1.3. Boschi misti a prevalenza di altre latifoglie autoctone (latifoglie mesofite e mesotermofite quali acero-frassino, carpino, ecc.)
  - 3.1.1.4. Boschi a prevalenza di castagno
  - 3.1.1.5. Boschi a prevalenza di faggio
  - 3.1.1.6. Boschi a prevalenza di igrofilie (quali salici e/o pioppi e/o ontani, ecc.)
  - 3.1.1.7. Boschi ed ex-plantazioni a prevalenza di latifoglie esotiche (quali robinia, e ailanto)
  - 3.1.2.1. Boschi a prevalenza di pini mediterranei e cipressi (pino domestico, pino marittimo, pino d'Aleppo)
  - 3.1.2.2. Boschi a prevalenza di pini oro-mediterranei e montani (pino nero e laricio, pino silvestris, pino torquato)
  - 3.1.2.3. Boschi a prevalenza di abeti (quali bianco e/o rosso)
  - 3.1.2.4. Boschi a prevalenza di larici e/o pino cembro
  - 3.1.2.5. Boschi ed ex-plantazioni a prevalenza di conifere esotiche (quali douglasia, pino insignis, pino strobo)
  - 3.2.1.1. Praterie continue
  - 3.2.1.2. Praterie discontinue
  - 3.2.3.1. Macchia alta
  - 3.2.3.2. Macchia bassa e garighe
  - 3.2.4.1. Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree
  - 3.1.3.1.1. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di querce e altre latifoglie sempreverdi (quali leccio e sughero)
  - 3.1.3.1.2. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di querce caducifoglie (corno a rovesello e/o farnetto e/o rovero)
  - 3.1.3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di altre latifoglie autoctone (latifoglie mesofite e mesotermofite quali acero-frassino, carpino, ecc.)
  - 3.1.3.1.4. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di castagno
  - 3.1.3.1.5. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di faggio
  - 3.1.3.1.6. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di igrofilie (quali salici e/o pioppi e/o ontani, ecc.)
  - 3.1.3.1.7. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di specie esotiche
  - 3.1.3.2.1. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini mediterranei e cipressi (pino domestico, pino marittimo, pino d'Aleppo)
  - 3.1.3.2.2. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini oro-mediterranei e montani (pino nero e laricio, pino silvestris, pino torquato)
  - 3.1.3.2.3. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di abeti (quali bianco e/o rosso)
  - 3.1.3.2.4. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di larici e/o pino cembro
  - 3.1.3.2.5. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di conifere esotiche (quali douglasia, pino insignis, pino strobo)

PLANIMETRIA SOTTOSTAZIONE AT/MT UTENTE - STAZIONE TERNA "Troia" 1:1000



**REGIONE PUGLIA**

## COMUNE DI TROIA (FG)

Progettazione della Centrale Solare "Frutti Antichi Troia" da 21.890,40 kWp



Proponente:



**Pacifico Ametista s.r.l.**

Piazza Walther-von-der-Vogelweide,8 - 32100 (BZ)

Titolo: Layout su carta acclività e uso del suolo AT- C.02



N° Elaborato: 71

Cod: PT\_41

Scala: 1: 5000

**Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione**

**Progettista:**  
Agr. Fabrizio Cembalo Sambiasi  
Arch. Alessandro Visalli

**Collaboratori:**  
Ing. Rosa Verde  
Ing. Patrizia Ruggiero  
Ing. Anna Sirica  
Ing. Sara De Rogatis  
Ing. Rosanna Annunziata

**Progettazione elettrica e civile**

**Progettista:**  
Ing. Rolando Roberto  
Ing. Marco Balzano

**Collaboratori:**  
Ing. Simone Bonacini  
Ing. Giselle Roberto

**Consulenza geologia**  
Geol. Gaetano Ciccarelli

**Consulenza archeologia**  
Archeol. Concetta Costa





**tipo di progetto:**

RILIEVO

PRELIMINARE

DEFINITIVO

ESECUTIVO

Rev.	descrizione	data	formato	elaborato da	controllato da	approvato da
R0	Layout acclività	Luglio 2021	A1			
R1	Modifica Layout	16/02/2022	A1	MBG	MBG	MBG
R2	Modifica Layout	08/09/2022	A1	MBG	MBG	MBG
R3	Modifica Layout	22/12/2022	A1	MBG	MBG	MBG
R4	Nuova Consegna	Feb. 2023	A1	MBG	MBG	MBG