



REGIONE PUGLIA



COMUNE DI POGGIO  
IMPERIALE



COMUNE DI LESINA



COMUNE DI SAN PAOLO  
CIVITATE



COMUNE DI APRICENA

Nome Progetto / Projct Name

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO,  
DENOMINATO POGGIO 1  
POTENZA INSTALLATA 37,68 MW  
CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER  
AD ASSE ORIZZONTALE IN AGRO DI  
POGGIO IMPERIALE, SAN PAOLO DI CIVITATE, APRICENA  
E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE**

committente	Titolo documento / Document title		
	PIANO CULTURALE		
GC POGGIO IMP I	Tavola / Pannel		Codice elaborato / Code processed
	PNO		PG1_PNO_CLT_004

00	12/2022	PROGETTO DEFINITIVO			
N.	Data Revisione	Descrizione revisione	Preparato	Vagliato	Approvato

Specialista / Specialist	Sviluppatore / Developer	
Dott.ssa Agr. Francesca De Santo		RENEWABLE CONSULTING

Progettisti / Planner	Renewable Consulting Srl		
	Nome file	Dimensione cartiglio	Scala
	PG1_PNO_CLT_004	A4	/

## Sommario

<b>1.PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2.DESCRIZIONE DEL PROGETTO .....</b>	<b>3</b>
2.1 Definizioni.....	4
<b>3. EFFETTI MICROCLIMATICI DEL SISTEMA AGRIVOLTAICO .....</b>	<b>6</b>
3.1 Radiazione Solare .....	6
3.2 Temperatura.....	7
3.3 Evapotraspirazione .....	7
<b>4.ESPERIENZE DI COLTIVAZIONE CON IL SISTEMA AGRIVOLTAICO .....</b>	<b>8</b>
<b>5.STATO ATTUALE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA INTERESSATA DALL’IMPIANTO AGRIVOLTAICO.....</b>	<b>9</b>
<b>6. COLTIVAZIONE FUTURA .....</b>	<b>13</b>
6.1 Superficie effettiva a scopo agricolo .....	13
6.2 Suddivisione delle coltivazioni per area di impianto.....	13
6.2.1 Area 1 .....	13
6.2.2 Area 2 .....	15
6.2.3 Area 3 .....	16
6.2.4 Area 4 .....	16
6.3 Coltivazione del suolo coperto dalle stringhe d’impianto .....	23
6.4 Coltivazione delle fasce ecologiche .....	23
<b>7.TECNICHE AGRONOMICHE .....</b>	<b>25</b>
7.1 Avvicendamenti colturali .....	25
7.2 Consociazioni .....	26
7.3 Lavorazioni.....	27
7.3.1 Lavori preparatori principali .....	28
7.3.2. Lavorazioni complementari e di coltivazione.....	28
7.4 Irrigazione .....	31
7.5 Trapianto e semina .....	31
7.6 Concimazione.....	32
7.7 Difesa integrata.....	33
<b>8.MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI .....</b>	<b>33</b>
8.1 Definizioni.....	33
8.2 Misure per incremento e tutela della fauna e biodiversità.....	34
8.3 Misure a protezione del suolo dagli inquinanti di origine agricola .....	35
<b>9.MONITORAGGIO DELLA COLTIVAZIONE.....</b>	<b>37</b>
9.1 Sensore di Bagnatura fogliare .....	37
9.2 Sensori di Umidità, Temperatura e Conducibilità elettrica del suolo .....	37

<b>10. ANALISI MULTICRITERIO .....</b>	<b>38</b>
<b>11. CONCLUSIONI .....</b>	<b>40</b>
<b>12. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA .....</b>	<b>41</b>

## 1.PREMESSA

Con la presente relazione si vuole illustrare il piano colturale relativo al progetto riguardante la realizzazione di un sistema agrivoltaico di 37,68 MW in agro di Apricena e Poggio Imperiale (FG), su una superficie totale di 80 ha. L'impianto è incluso nel progetto denominato "Agripuglia", che prevede la realizzazione di cinque sistemi agrivoltaici ubicati in siti differenti, con il coinvolgimento di più partner come Legambiente Puglia, CIA Agricoltori Italiani Capitanata, Università degli Studi di Foggia Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, la Diocesi di San Severo e Anffas Torremaggiore.

## 2.DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto riguarda la realizzazione di un sistema integrato agrivoltaico, caratterizzato dalla realizzazione di un impianto ad inseguimento solare monoassiale orizzontale e la coltivazione del suolo sottostante l'impianto. La superficie interessata dal progetto, in agro di Poggio Imperiale e Apricena (FG) è suddivisa in 4 aree (**Tab.1**), ed è relativa alle particelle di seguito indicate (**Tab.2**). (**Fig.1**)

L'impianto è costituito da pannelli incernierati a 1,65 m di altezza su piloni inseriti nel terreno. La distanza interfilare, calcolata tra un pilone e l'altro è di 5 m.

Essendo il raggio di rotazione di ciascun asse di  $\pm 55^\circ$ , la copertura fotovoltaica lascia tra i filari una zona priva di ingombro (in proiezione verticale) di larghezza variabile in funzione dell'orario del giorno, da un minimo di 2,83 m (mezzogiorno, ora solare) ad un massimo di 3,73 m (alba e tramonto). Tale larghezza consente ai mezzi meccanici di passare per la gestione delle ordinarie attività di coltivazione del terreno. (**Fig.2**)

La superficie tra le stringhe di moduli, identificata come interfila, può essere coltivata scegliendo opportunamente le colture, nel rispetto dell'agroecosistema locale. Le specie oggetto di interesse saranno specie dal portamento basso (h minore di 0,80 m), caratterizzate da facile coltivazione ed elevata adattabilità. La scelta sarà orientata verso colture tipiche del territorio locale in modo da favorire la biodiversità e da contribuire alla conservazione del materiale genetico, che a causa dei sempre più diffusi sistemi monocolturali è in crescente perdita. Detto fenomeno è meglio conosciuto con il termine di "erosione genetica".

Direttamente al di sotto delle stringhe di moduli verranno coltivate specie tipiche del territorio; tali specie favoriscono la crescita delle coltivazioni da reddito soprattutto grazie alla presenza di fiori che attraggono gli insetti pronubi e favoriscono gli antagonisti di molti patogeni ed insetti dannosi per la coltura.

Ai lati dell'impianto è predisposta la fascia ecologica dalla larghezza di 2 m, al termine della quale verrà posto un recinto.

All'interno di detta fascia ecologica saranno coltivate specie selezionate in base alla capacità di adattamento, alle caratteristiche pedoclimatiche territoriali e caratterizzate da portamento arbustivo. Tali specie avranno una triplice funzione:

- 1) Favorire la biodiversità;
- 2) Creare reddito per l'agricoltore;
- 3) Mascherare la presenza dell'impianto tramite la creazione di un muro vegetale dell'altezza di minimo 2 m, in modo da ridurre il possibile impatto visivo dell'impianto.

## 2.1 Definizioni

Ai fini del calcolo delle superfici risulta utile riportare alcune definizioni delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici (Giugno 2022), di cui all'art. 2 del decreto legislativo n.199 del 2021:

- Volume Agrivoltaico (o Spazio poro): spazio dedicato all'attività agricola, caratterizzato dal volume costituito dalla superficie occupata dall'impianto agrivoltaico (superficie maggiore tra quella individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna del profilo esterno di massimo ingombro dei moduli fotovoltaici e quella che contiene la totalità delle strutture di supporto) e dall'altezza minima dei moduli fotovoltaici rispetto al suolo;
- Superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico ( $S_{pv}$ ): somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l'impianto (superficie attiva compresa la cornice);
- Superficie di un sistema agrivoltaico ( $S_{tot}$ ): area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico;
- Altezza minima dei moduli fotovoltaici rispetto al suolo: altezza misurata da terra fino al bordo inferiore del modulo fotovoltaico; in caso di moduli installati su strutture a inseguimento l'altezza è misurata con i moduli collocati alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile.
- LAOR (*Land Area Occupation Ratio*): rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico ( $S_{pv}$ ), e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico ( $S_{tot}$ ). Il valore è espresso in percentuale.
- Indice di coltivabilità: rapporto tra la superficie disponibile per le coltivazioni e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico ( $S_{tot}$ ).

Aree	Altezza minima moduli	Spazio poro (m <sup>3</sup> )	$S_{pv}$ (m <sup>2</sup> )	$S_{tot}$ (m <sup>2</sup> )	Superficie coltivabile (m <sup>2</sup> )	LAOR	Indice di coltivabilità
Area 1	0,80 m	491.534	142.150	614.418	472.268		
Area 2	0,80 m	72.950	28.755	91.188	62.433		
Area 3	0,80 m	35.512	11.469	44.390	32.921		
Area 4	0,80 m	54.800	13.588	68.500	54.912		
<b>Totale</b>	/	/	195.962	818.496	622.534	<b>23,94%</b>	<b>76,05%</b>


**Tabella 1:** Tabella indicante la suddivisione delle aree di progetto. Le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici (Giugno 2022), definiscono il limite massimo di LAOR del 40%, dal calcolo delle superfici si evince che l'impianto in oggetto è caratterizzato da un valore LAOR pari a 23,94%. Essendo invece l'indice di coltivabilità il rapporto tra la superficie coltivabile e la superficie totale dell'intero sistema agrivoltaico, questo deve essere maggiore del 70%, in particolare il valore che ne risulta è pari a 76,05%.

Foglio	Particella	Comune
8	19-202-445-446-449-450-514-515	Poggio Imperiale
14	6-220-168	Apricena
15	5-104-105-98	Apricena

**Tabella 2:** Tabella indicante le particelle interessate dalla realizzazione del progetto.



**Figura 1:** Ortofoto delle aree interessate dal progetto, in rosso la superficie interessata dall'impianto in verde la superficie che non riguarderà l'istallazione dell'impianto.



**Figura 2:** Immagine illustrante le dimensioni caratteristiche dell'impianto.

### 3. EFFETTI MICROCLIMATICI DEL SISTEMA AGRIVOLTAICO

La presenza dei pannelli fotovoltaici influisce su alcune caratteristiche microclimatiche come la radiazione solare, la temperatura e l'umidità. Dette influenze possono avere sia effetti positivi che negativi che nulli sulle specie selezionate per la coltivazione. È dimostrato come alcune specie giovano dell'ombreggiamento creato dall'impianto, in quanto dimostrano una maggiore superficie fogliare, il che è riferibile a una maggiore presenza di auxine (Fitormone della crescita) che risulta essere fotolabile. La presenza dei pannelli influisce anche sull'evapotraspirazione della pianta, in quanto una posizione maggiormente ombreggiata comporta una minore evapotraspirazione, incidendo anche sulle richieste irrigue. Inoltre, la copertura generata dai pannelli potrebbe proteggere le coltivazioni dall'effetto abbattente di alcuni fenomeni atmosferici, tra cui la grandine.

#### 3.1 Radiazione Solare

La fotosintesi clorofilliana è il metabolismo principale delle piante.

Il fattore essenziale per far sì che avvenga questo processo è la radiazione solare. Le piante utilizzano solo una minima parte della radiazione solare riferibile al 2-5%, corrispondente alla frazione visibile, definita PAR (*Photosynthetically active radiation*), compresa tra 400 e 700 nm di lunghezza d'onda. In condizioni normali di pieno sole, la radiazione globale si compone per il 50% di radiazione diretta e per l'altro 50% di radiazione diffusa. La percentuale di radiazione diretta è ridotta per la presenza del pannello fotovoltaico; essa si riduce con intensità variabile in funzione della distanza dal filare fotovoltaico, del momento del giorno e del periodo dell'anno.

In base alla richiesta di intensità luminosa le piante vengono classificate in eliofile e sciafile. Le prime (dal greco *hélíos* "sole" e *phílos* "amico") richiedono un'elevata quantità di radiazione solare, mentre le sciafile

(dal greco σκιά "ombra" e φίλος "amico") soffrono per un eccesso di illuminazione, prediligendo al contrario luoghi ombreggiati. La maggior parte delle piante coltivate devono essere considerate sciafile facoltative, dato che le elevate densità di semina creano condizioni di ombreggiamento che non permettono alle piante di ricevere una corretta intensità luminosa. In generale vengono considerate eliofile i cereali, le piante da zucchero e le specie oleaginose, da fiore e da frutto. Sono invece considerate sciafile, le specie da fibra, le piante foraggere e alcune piante orticole.

### 3.2 Temperatura

La temperatura dell'aria rappresenta la diretta conseguenza della radiazione solare. In condizioni di ombreggiamento ci si aspetta una riduzione dei valori termici anche di 3-4°C rispetto alle zone di pieno sole. Al di sotto dell'impianto, inoltre, si potrebbe rilevare una maggiore umidità relativa al mattino e minore nel tardo pomeriggio-sera, rispetto alle zone di pieno sole.

Ciascuna specie vegetale è caratterizzata da una temperatura ottimale di crescita e da temperature minime e massime che è in grado di tollerare; al di sotto o al di sopra di queste temperature la pianta smette di crescere e subisce danni a volte irreversibili. L'esposizione della pianta al di sopra della sua temperatura massima di crescita per un periodo più o meno prolungato, causa uno stress più o meno grave; a questo si associa anche lo stress idrico che comporta quindi una maggiore richiesta di acqua. Una delle pratiche agronomiche maggiormente utilizzata per ovviare a questo tipo di problematiche è l'utilizzo di reti ombreggianti.

L'impianto fotovoltaico grazie al suo effetto ombreggiante potrebbe quindi giovare alle specie orticole limitando così i danni da elevate temperature.


In funzione delle esigenze termiche le piante vengono raggruppate in microterme, generalmente ciclo autunno-primaverile, con modeste esigenze termiche e macroterme, piante estive che necessitano di temperature più elevate. In un modo o nell'altro tutte e due i gruppi di piante potrebbero trarre vantaggio dalla situazione di ombreggiamento creata dall'impianto. In ultimo, il parziale ombreggiamento ha degli effetti positivi anche sul suolo e sulle sue caratteristiche, in quanto, in estate, si presenta con una maggiore umidità e di conseguenza una minore tenacità, indice del fatto che anche i fenomeni di mineralizzazione della sostanza organica sono ridotti, con conseguente minore perdita di essa e successiva minore erosione del suolo. Nel periodo invernale, durante la notte, la presenza dell'impianto potrebbe riflettere i raggi infrarossi al suolo, evitando un raffreddamento totale del suolo. Questa condizione potrebbe giovare alle piante, dato che in migliori condizioni di temperatura si caratterizzano di un maggior accrescimento.

### 3.3 Evapotraspirazione

L'evapotraspirazione è definita come la somma delle perdite di acqua dovute all'evaporazione dal suolo e alla traspirazione fogliare. Quest'ultima avviene grazie all'apertura degli stomi che consentono gli scambi gassosi durante la fotosintesi. In condizione di ombreggiamento, diminuendo la radiazione luminosa e lo stress termico a cui la pianta è sottoposta ci si aspetta minore traspirazione ed anche una minore evaporazione di acqua dal suolo. Tutto questo si traduce con una maggiore efficienza d'uso delle risorse idriche del suolo, con duplice vantaggio: diminuzione dei costi delle spese idriche e diminuzione di consumo di acqua.

#### 4.ESPERIENZE DI COLTIVAZIONE CON IL SISTEMA AGRIVOLTAICO

Le esperienze di agrivoltaico nel mondo sono molteplici. (**Fig.3**) Alcuni progetti sono ancora in fase di sperimentazione altri invece, come in Giappone, sono diventati il pilastro fondante dell'economia locale. In Cina è stato realizzato l'impianto agrivoltaico più grande al mondo (640 MW) dal gruppo Baofeng e la divisione Solar di Huawei, al di sotto di esso vengono coltivate le bacche di Goji, la coltivazione sembrerebbe giovare molto dalla presenza dell'impianto. Altri progetti di agrivoltaico si rilevano in Germania dove vengono coltivati i mirtilli e lamponi; in Francia, leadership europea in termini di agrivoltaico, viene applicato soprattutto nella viticoltura; i moduli riescono a proteggere le viti fornendo un po' d'ombra e migliorando il raccolto. In Germania è stato già dimostrato come la coltivazione al di sotto dell'impianto offre buoni risultati per i frutti di bosco, mele, ciliegie, patate, pomodori e cetrioli.



**Figura 3:** Carta illustrante la diffusione del sistema agrivoltaico nel mondo.

## 5.STATO ATTUALE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA INTERESSATA DALL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO

Al momento del sopralluogo effettuato in data 10/03/22 le aree in oggetto sono descrivibili come segue:

- Area 1: suolo nudo e lavorato e coltivazione del grano.(**Fig.4**)
- Area 2: coltivazione del grano e presenza di un uliveto. (**Fig.5**)
- Area 3: coltivazione del grano. (**Fig.6**)
- Area 4: coltivazione del grano. (**Fig.7**)



**Figura 4:** Foto illustrante l'area 1 al momento del sopralluogo.



**Figura 5:** Foto illustrante l'area 2 al momento del sopralluogo.



**Figura 6:** Foto illustrante l'area 3 al momento del sopralluogo.



**Figura 7:** Foto illustrante l'area 4 al momento del sopralluogo.

## 6. COLTIVAZIONE FUTURA

### 6.1 Superficie effettiva a scopo agricolo

L'area in oggetto ha un'estensione pari a circa 80 ha. In particolare, la superficie impiegata dall'impianto ( $S_{pv}$ ) risulta essere di circa 19,59 ha. Tale superficie, per la presenza delle stringhe di moduli dell'impianto, ai fini della coltivazione risulterà in parte ridotta. Più nello specifico la superficie utile allo sviluppo della coltivazione è stata calcolata, per ogni area di impianto in base alla larghezza minima dell'interfila (2,8 m) e la lunghezza delle stringhe dei moduli, differenti per ogni area perché dipendenti della conformazione della stessa. (**Tab.3**)

Si precisa che si prevedono tre differenti tipologie di strutture: ad una stringa (26 moduli, lunghezza pari a circa 35,13 m), a due stringhe (52 moduli, lunghezza pari a circa 69,53 m) ed a quattro stringhe (78 moduli, lunghezza pari a circa 103,93 m).

La superficie utile alla coltivazione per tutta l'area di impianto è pari a circa 62,25 ha. Le zone non utilizzabili per le coltivazioni da reddito (zona direttamente al di sotto dei pannelli e fascia ecologica), saranno interessate dalle specie utili per l'incremento della biodiversità, mentre la fascia ecologica sarà impegnata dalle coltivazioni a portamento arbustivo/rampicante utili a mascherare l'impianto ed il recinto.

Area	Superficie impiegata dall'impianto ( $S_{pv}$ )	Numero di interfila	Superficie utile alla coltivazione
<b>Area 1</b>	14,21 ha	455	47,22 ha
<b>Area 2</b>	2,87 ha	64	6,24 ha
<b>Area 3</b>	1,14 ha	58	3,29 ha
<b>Area 4</b>	1,35 ha	49	5,49 ha
<b>Totale</b>	<b>19,59 ha</b>		<b>62,24 ha</b>

**Tabella 3:** In tabella è illustrata la superficie utile per le coltivazioni e il numero di interfila predisposti per area.

### 6.2 Suddivisione delle coltivazioni per area di impianto

In questa trattazione riguardante lo sviluppo della coltivazione futura, per ogni area ci si riferirà solo alla superficie utile all'agricoltura e non alla superficie in toto. Si specifica inoltre che il piano colturale potrà subire variazioni in base alle esigenze di mercato, continuando comunque a garantire la coltivazione al di sotto dell'impianto.

#### 6.2.1 Area 1

La superficie relativa a quest'area risulta essere pari a 47,22 ha. Di cui 14 ha sono localizzati al di fuori della recinzione.

L'area dove è presente l'impianto risulta avere una superficie coltivabile pari a 33,22 ha. Detta area è caratterizzata da due appezzamenti confinanti, il primo pari a 8,9 ha e il secondo a 24,32 ha.

Per le coltivazioni autunno-vernine, il primo appezzamento verrà dedicato alla coltivazione dello spinacio (*Spinacia oleracea* fam. *Chenopodiacee*), seguirà per le coltivazioni primaverili-estive la coltivazione della carota (*Daucus Carota* fam. *Apiacee*). (Fig.9 e 10)

*Spinacia oleracea* fam. *Chenopodiacee*

Pianta erbacea di piccole dimensioni caratterizzata da foglie a rosetta. Questa specie orticola cresce molto rapidamente ed è particolarmente resistente al freddo. È una coltura di basse esigenze in quanto riesce a sfruttare la fertilità residua lasciata dalle altre coltivazioni. Preferisce zone ombreggiate, quindi al di sotto dell'impianto fotovoltaico potrebbero svilupparsi le condizioni migliori per la sua coltivazione. La semina avviene a settembre ed il sesto di impianto corrisponde a 40x15 cm. Esistono diverse varietà di spinacio. Per il progetto in oggetto verranno utilizzate in particolare le varietà Butterfly o Verdil, selezionate poiché resistenti al freddo e adatte per la coltivazione autunno-vernina.

*Daucus Carota* fam. *Apiacee*

È una specie erbacea caratterizzata da radici carnose che possono essere di forma e lunghezza assai varia a seconda della varietà, differiscono per colorazione, dal classico arancio al viola, rosso e bianco. In particolare verranno coltivate varietà non più utilizzate a scopo industriale, in modo da favorire la conservazione della biodiversità. Questa specie richiede un clima non troppo caldo, in generale si adattano a tutti i climi, ma sono decisamente più esigenti riguardo al tipo di suolo. La semina avviene in primavera, il sesto corrisponde a 25x8 cm, ed il seme viene interrato ad un massimo di 1 cm di profondità. Non necessita di elevate irrigazioni e concimazioni, il ciclo colturale va dai 75 ai 130 giorni a seconda della varietà seminata, per cui è possibile raccoglierla a due mesi dalla semina.

Il secondo appezzamento per le coltivazioni autunno-vernine sarà interessato dalla coltivazione dei cavoli rispettivamente, cavolo broccolo (*Brassica oleracea* var. *italica* fam. *Brassicaceae*) e cavolo verza (*Brassica oleracea* var. *sabauda* fam. *Brassicaceae*); per le coltivazioni primaverili-estive riguarderà la coltivazione della lenticchia (*Lens culinaris* fam. *Leguminoseae*). (Fig.9 e 10)

*Brassica oleracea* var. *italica* fam. *Brassicaceae* e *Brassica oleracea* var. *sabauda* fam. *Brassicaceae*

Il Cavolo Broccolo, *Brassica oleracea*, è una specie appartenente alla famiglia delle Brassicacee rientra nei tipici ortaggi invernali ed è di semplice coltivazione. Non è esigente in termini di ricchezza del terreno ed inoltre è caratterizzato da un'elevata resistenza al freddo. Il trapianto avviene a fine estate in particolare nel mese di settembre con un sesto di impianto 80x50 cm. La raccolta avviene a dicembre.

Il Cavolo Verza, *Brassica oleracea* var. *sabauda*, è uno degli ortaggi più semplici da coltivare tra quelli della famiglia delle Brassicacee, si adatta molto al tipo di terreno e non teme il freddo. Il periodo di trapianto coincide con quello di fine estate inizio settembre, il trapianto si effettua attuando un sesto di impianto di 60x50 cm. La raccolta avviene nel momento in cui il Cavolo Verza ha raggiunto le dimensioni adatte per essere commercializzato. Le varietà che possono essere coltivate si distinguono in base alle dimensioni del cespo e colore delle foglie, ma soprattutto per ciclo colturale. Quest'ultimo nelle varietà tardive può raggiungere anche i 5-6 mesi, le varietà precoci invece possono essere pronte alla raccolta anche dopo 90 giorni.

*Lens culinaris fam. Leguminosae*

La coltivazione della lenticchia è molto semplice, essendo questa una pianta molto rustica e di facile adattabilità, il periodo indicato per la semina è quello di marzo, caratterizzata da un sesto di impianto lungo le file 0,15 m circa a pianta, tra le file invece, per garantire un passaggio, si adottano distanze di 0,50 m, la semina deve essere effettuata a circa un centimetro di profondità. Il periodo di raccolta coincide con quello estivo, quando la pianta risulta allo stato secco.

*Coltivazione dell'area esterna all'impianto*

L'area esterna all'impianto è caratterizzata da una superficie di circa 14 ha, di questa circa 1 ha sarà impiegato per la realizzazione dell'isola di specie a buona fioritura rientrante nelle opere di mitigazione e compensazione previste per il progetto.

La superficie rimanente sarà così suddivisa:

- 5 ha destinati alla coltivazione della sulla per apicoltura, (*Hedysarum coronaria*);
- 8 ha destinati alla coltivazione del Cavolo Broccolo, (*Brassica oleracea var. italica*).

La realizzazione dell'apicoltura per il primo anno prevederà l'implementazione di 5 arnie, la Sulla è una specie erbacea di semplice coltivazione, la fioritura avviene in primavera, il fiore, tipico delle leguminose si presenta con una corolla vistosa rossa porpora, ed è molto apprezzato dalle api.

## 6.2.4 Area 2

Quest'area caratterizzata da una superficie utile di circa 6,2 ha, nel periodo autunno-invernale sarà interessata dalla coltivazione del finocchio (*Foeniculum vulgare fam: Apiaceae*) mentre nel periodo primaverile-estivo sarà interessata dalla coltivazione della rucola (*Eruca vesicaria fam: Brassicaceae*). **(Fig.11 e 12)**

*Foeniculum vulgare fam: Apiaceae*

Il Finocchio è un'ombrellifera originaria del bacino mediterraneo dove cresce spontaneamente. Ha radice fittonante, fusto con nodi basali molto ravvicinati, foglie con guaine molto larghe, carnose sovrapposte in modo da formare il caratteristico grumolo; le foglie sono pinnato-composte. Le varietà coltivate sono molteplici e si differenziano a seconda dell'epoca di semina. Il trapianto avviene a fine estate adottando un sesto di impianto pari a 50x25 cm; il ciclo colturale per le varietà tardive ha la durata di 180 giorni; quindi, la raccolta può essere effettuata a 3-4 mesi dal trapianto.

*Eruca vesicaria fam: Brassicaceae*

Si tratta di una pianta molto semplice da coltivare e molto produttiva, si adatta a qualsiasi tipo di suolo, può essere seminata da marzo a settembre, può essere effettuata a spaglio o a file, nel caso di quest'ultima il sesto di impianto corrisponde a 25x5/10 cm. A circa un mese dalla semina è possibile effettuare il primo raccolto. La pianta è in grado di ricacciare 5-6 volte per ciclo colturale.

### 6.2.2 Area 3

Quest'area è caratterizzata da una superficie di circa 3,2 ha, la sua estensione ridotta permetterà di effettuare delle prove di coltivazioni innovative, non tipicamente coltivate in loco; facilitando così lo sviluppo di nuove filiere utili all'incremento del reddito agricolo. Detta superficie nel periodo autunno-invernale sarà interessata dalla coltivazione dei tulipani (*Fam: Liliaceae, Genere: Tulipa*), mentre nel periodo primaverile estivo sarà interessata dalla coltivazione dell'arachide (*Arachis hypogea fam: Leguminoseae*). **(Fig.13 e 14)**  
*Fam: Liliaceae, Genere: Tulipa*

Il tulipano è una pianta dalla grande valenza ornamentale, si colloca nel mercato dei fiori recisi. I bulbi si piantano tra ottobre e dicembre, il terreno adatto deve presentare una discreta quantità di sostanza organica, ad una profondità che può andare dai 5 cm ai 15 cm a seconda della dimensione del bulbo. La distanza è di circa 10 cm. La raccolta dei fiori avviene ad aprile.

#### *Arachis hypogea fam: Leguminoseae*

La coltivazione di questa specie è molto semplice, essendo una leguminosa non richiede elevate concimazioni e risulta essere un'ottima specie da inserire nelle rotazioni. La semina avviene in primavera, considerando un sesto di impianto di 40x15 cm, raggiunge un'altezza di circa 30 cm, la raccolta avviene a settembre/ottobre quando i semi sono maturi; il ciclo colturale è di circa 100/130 giorni.

### 6.2.3 Area 4

La superficie utile calcolata in quest'area è di circa 5,4 ha. Tale superficie sarà dedicata alla coltivazione di piante officinali, in particolare la lavanda (*Lavanda officinalis fam: Lamiaceae*). **(Fig.15)**

#### *Lavanda officinalis fam: Lamiaceae*

La specie *Lavanda officinalis* (Lavanda) famiglia *Lamiaceae*, è caratterizzata da portamento cespuglioso. Nella sua fase di massima vegetazione raggiunge un'altezza di 0,50 m. Si tratta di una pianta erbacea perenne che non richiede molta manutenzione; i fiori sono delle spighe viola molto decorative ed apprezzate per il profumo che emanano. La lavanda è molto resistente al caldo e all'aridità. Il trapianto avviene a settembre ed il sesto di impianto corrisponde a 50x50 cm. La raccolta avviene in estate al momento della formazione dell'infiorescenza. Questa pianta può essere utilizzata sia a scopo cosmetico che medicinale, le vengono attribuite proprietà disinfettanti e benefiche per l'apparato respiratorio.



**Figura 9:** Ortofoto dell'area 1 indicante le coltivazioni future, in giallo l'area relativa alla coltivazione dello spinacio ed in bianco l'area relativa alla coltivazione dei cavoli.



**Figura 10:** Ortofoto illustrante la coltivazione futura relativa all'area 1, in viola l'area dedicata alla coltivazione della carota ed in arancione l'area relativa alla coltivazione della lenticchia.



**Figura 11:** Ortofoto relativa all'area 2, in bianco l'area di impianto che sarà interessata nel periodo autunno-invernale dalla coltivazione del finocchio.



**Figura 12:** Ortofoto relativa all'area 2, in giallo l'area di impianto che sarà interessata nel periodo primaverile-estivo dalla coltivazione della rucola.



**Figura 13:** Ortofoto illustrante la predisposizione della coltivazione autunno-vernina all'interno dell'Area 3, il poligono in blu indica la coltivazione del tulipano.



**Figura 14:** Ortofoto illustrante l'area 3, interessata dalla coltivazione dell'arachide nella stagione primaverile-estiva (poligono in marrone).



**Figura 15:** Ortofoto relativa all'area 4, è evidenziato in viola l'area di impianto che sarà interessata dalla coltivazione della Lavanda.

### 6.3 Coltivazione del suolo coperto dalle stringhe d'impianto

Questa superficie della larghezza di circa 2,17 m, per ogni area, non potrà essere coltivata con specie orticole in quanto la presenza dei moduli di pannelli creerebbe un ingombro per le lavorazioni, per questo detta superficie sarà interessata dalla coltivazione di specie tipiche del territorio utili alla crescita delle specie da reddito. Più in particolare si favorirà la diffusione della santoreggia e della borragine, che oltre ad avere l'importante funzione di specie utili agli insetti pronubi, trovano il loro utilizzo sia come specie officinali che come specie culinarie; in particolare, i fiori della borragine sono sempre più ricercati sul mercato soprattutto per la preparazione di piatti gourmet.

### 6.4 Coltivazione delle fasce ecologiche

Per fascia ecologica si intende quella fascia di terreno posta tra il confine e la recinzione, questa è caratterizzata da una larghezza di 2 m, e verrà coltivata maggiormente con delle specie dal portamento arbustivo o rampicante, che oltre a creare un muro verde tale da mascherare l'impianto, potranno costituire un ulteriore reddito per il coltivatore. In ultimo le siepi presentano diverse funzioni ecologiche, in particolare, offrono siti di nidificazione ad uccelli e insetti e riparo a piccoli mammiferi favorendo la biodiversità. **(Tab.4)**

AREA	Lunghezza recinto	Tipologia di coltivazione
Area 1	4.201 m	More ( <i>Rubus ulmifolius</i> )
Area 2	1.109 m	Alloro ( <i>Laurus nobilis</i> )
Area 3	1.244 m	Corbezzolo ( <i>Arbutus unedo</i> )
Area 4	1.131 m	Passiflora incarnata ( <i>Passiflora incarnata</i> )

**Tabella 4:** Tabella illustrante le specie da coltivare nell'area dedicata alla fascia ecologica ed al recinto.

*Rubus ulmifolius* fam: *Rosaceae*

Questa coltivazione è molto semplice, non è molto esigente ed è ben resistente sia al gelo che al caldo. Il frutto è generalmente di colore scuro, tra il viola e il nero. Le piante di rovo si trapiantano durante la primavera; l'operazione di trapianto è molto semplice. Il sesto di impianto è pari ad una distanza di 0,80 m sulla fila e 2,0 m tra le file. Questa richiede potature di allevamento che permettano il mantenimento della forma a siepe. Resiste bene alla siccità e non necessita di particolari irrigazioni. Si rinvencono numerose varietà di more, in questo progetto ci si dedicherà alla coltivazione della varietà Lockness.

*Laurus nobilis* fam: *Lauraceae*

Questa pianta è una tipica pianta ornamentale sempreverde mediterranea ideale per formare siepi fitte. L'alloro trova il suo utilizzo anche come pianta aromatica. È caratterizzata da portamento arbustivo, se la si lascia crescere liberamente può raggiungere anche i 10 m di altezza. Essendo una specie molto rustica non richiede cure particolari, si adatta a svariati tipi di suolo e richiede irrigazioni solo allo stato di giovane pianta, come tutte le siepi richiede delle potature da effettuarsi tra settembre-ottobre e marzo. La messa a dimora avviene tra ottobre e marzo con una distanza tra le piante dai 50 ai 100 cm.

*Arbutus unedo*, fam: *Ericaceae*

Il corbezzolo, è una specie dalle dimensioni variabili, può essere allevato come arbusto o albero, è caratterizzato da una chioma densa, tondeggianti, irregolare e può raggiungere un'altezza che varia da 1 a 8 m.

È originaria del bacino del mediterraneo ed è caratteristica della tipica macchia mediterranea. I frutti possono essere utilizzati a scopo alimentare. L'impianto può avvenire in primavera con una distanza tra le piante di 5 m.

*Passiflora incarnata* fam: *Passifloraceae*

La passiflora, nota anche come fiore della passione, è una pianta da fiore ricca di virtù, infatti si presta a vari usi come ornamentali, terapeutici e per il consumo dei frutti. È caratterizzata da un portamento rampicante, presentante quindi alcune sia parti erbacee che legnose. Predilige terreni non troppo ricchi di sostanza organica ed ha scarse esigenze idriche. Richiede potature a fine inverno, prima della piena ripresa vegetativa. L'impianto avviene in primavera a maggio, il sesto di impianto corrisponde a 75x45 cm.

## 7.TECNICHE AGRONOMICHE

Per tecniche agronomiche si intende l'insieme di tutte quelle attività volte all'ottenimento di una produzione agricola ottimale per le coltivazioni selezionate. Tali tecniche si attuano seguendo degli schemi precisi in modo da conservare la fertilità del suolo e l'ecosistema agrario.

Da esse dipende l'esito economico della coltivazione. Tra le tecniche agronomiche rientrano: gli avvicendamenti colturali, le consociazioni, semina e trapianto, le lavorazioni, le irrigazioni, i trattamenti fitosanitari e la raccolta.

### 7.1 Avvicendamenti colturali

Con il termine di avvicendamento colturale si indica la successione di colture diverse sullo stesso appezzamento. Ai fini di tale tecnica agronomica le colture sono tradizionalmente distinte in:

- depauperanti: colture esigenti dal punto di vista nutritivo, sfruttano il terreno e lo impoveriscono. Ad esse appartengono ad esempio tutti i cereali da granella;
- preparatorie: colture che richiedono cure colturali particolari (accurati lavori di preparazione e coltivazione, concimazioni organiche e chimiche abbondanti) i cui effetti positivi vanno a vantaggio anche delle piante che seguono; tra le colture da rinnovo si annoverano il pomodoro e le leguminose così come fagiolini, fava e piselli.
- miglioratrici: colture che accrescono la fertilità del terreno influenzando beneficamente sulla struttura e anche sulla fertilità, ad esempio, sull'arricchimento di azoto (Leguminose).

Nella pratica di avvicendamento si utilizzano anche le colture intercalari. Queste sono caratterizzate da rapido sviluppo e buon adattamento, la loro coltivazione si localizza tra due colture principali. I vantaggi dell'utilizzo della coltura intercalare sono:

- arricchimento della componente azotata e della sostanza organica del suolo impiegando le leguminose e praticando il sovescio;
- azione positiva sul fenomeno della stanchezza del suolo (progressivo impoverimento del terreno, minore produttività, diffusione di parassiti specifici).

Tra gli svantaggi invece si riscontrano:

- Interferire negativamente sulle lavorazioni della coltura principale;
- Utilizzazione delle riserve idriche a scapito della coltura principale.

Più in particolare nel progetto in esame il piano colturale è stato redatto sulla base di un anno ponendo attenzione ad alternare sia colture preparatrici che miglioratrici. Risulta importante, per la coltivazione di specie orticole, non far susseguire sullo stesso appezzamento specie della stessa famiglia. Inoltre, l'introduzione delle leguminose nella rotazione delle colture può contribuire, da diversi punti di vista, significativamente alla riduzione delle emissioni di gas serra. Innanzitutto, non necessitano di azoto ma lo fissano, rilasciandone talvolta una discreta quantità a disposizione delle colture in successione. Grazie a questo, per la coltura che segue, potranno essere fortemente ridotti gli apporti di azoto al suolo. Oltre al piano colturale, redatto sulla base di un anno, sono state ipotizzate delle possibili rotazioni nell'arco di tre annate agrarie tra le colture previste per ogni area, in modo da favorire la fertilità ed evitare di provocare il fenomeno della stanchezza del suolo. Il presente piano colturale potrà realizzarsi in tutto l'arco di tempo di durata dell'impianto (circa 30 anni) e potrà subire delle modifiche in accordo con l'agricoltore coltivatore delle aree in oggetto. **(Tab.6)**

Area	Periodo	Anno 1	Anno 2	Anno 3
<b>Area 1 (1)</b>	Aut-Inv	Spinacio <i>fam: Chenopodiaceae</i>	Cavolo Broccolo e Verza, <i>fam: Brassicaceae</i>	Tulipano <i>fam: Lialiaceae</i>
	Prim-Est	Carota <i>fam: Apiaceae</i>	Lenticchia <i>fam: Leguminosae</i>	Rucola <i>fam: Brassicaceae</i>
<b>Area 1 (2)</b>	Aut-Inv	Cavolo Broccolo e Verza, <i>fam: Brassicaceae</i>	Tulipano <i>fam: Lialiaceae</i>	Finocchio <i>fam: Apiaceae</i>
	Prim-Est	Lenticchia <i>fam: Leguminosae</i>	Arachide <i>fam: Leguminosae</i>	Arachide <i>fam: Leguminosae</i>
<b>Area 2</b>	Aut-Inv	Finocchio <i>fam: Apiaceae</i>	Spinacio <i>fam: Chenopodiaceae</i>	Cavolo Broccolo e verza, <i>fam: Brassicaceae</i>
	Prim-Est	Rucola <i>fam: Brassicaceae</i>	Carota <i>fam: Apiaceae</i>	Lenticchia <i>fam: Leguminosae</i>
<b>Area 3</b>	Aut-Inv	Tulipano <i>fam: Lialiaceae</i>	Finocchio <i>fam: Apiaceae</i>	Spinacio <i>fam: Chenopodiaceae</i>
	Prim-Est	Arachide <i>fam: Leguminosae</i>	Rucola <i>fam: Brassicaceae</i>	Carota <i>fam: Apiaceae</i>
<b>Area 4</b>		Lavanda <i>fam: Lamiaceae</i>	Lavanda <i>fam: Lamiaceae</i>	Lavanda <i>fam: Lamiaceae</i>

**Tabella 6:** Tabella illustrante una probabile rotazione da attuarsi sulle aree di impianto riferibile a tre annate agrarie.

## 7.2 Consociazioni

Con il termine di consociazioni si vuole indicare quella tecnica agronomica che riguarda la coltivazione di più specie sullo stesso appezzamento. Si tratta di una pratica agricola di antiche origini, in cui la biodiversità vegetale spontanea aiuta a mantenere l'ambiente sano. La monosuccessione o la presenza di una sola coltura in campo, pratiche tipiche dell'agricoltura moderna, rende le piante più esposte alla presenza di parassiti patogeni che possono quindi compromettere l'intero raccolto. Questo obbliga all'utilizzo massivo di contromisure drastiche come i trattamenti chimici. L'impiego della tecnica della consociazione punta ad attivare la sinergia tra le piante, le quali interagiscono sia tra loro che con il suolo, in diversi modi: scambiano sostanze nutritive, attirano o allontanano insetti utili tramite i loro fiori e profumi, ombreggiano il suolo e lo mantengono umido. L'utilizzo di questa tecnica permette di prevenire molti problemi che potrebbero riscontrarsi durante le coltivazioni. In sintesi, con l'utilizzo delle consociazioni si ottengono molti vantaggi, tra cui l'allontanamento di insetti nocivi e spore patogene, con la conseguente salvaguardia delle colture e l'incremento della percentuale di sostanze nutritive, nonché l'aumento della fertilità del

suolo, ciò si traduce in un miglioramento quantitativo e qualitativo del raccolto finale. Questa tecnica verrà applicata coltivando la zona direttamente al di sotto delle stringhe che non potrà essere occupata da specie orticole, in quanto risulta complessa per la gestione delle lavorazioni, con specie utili alla crescita delle specie orticole. Dette specie sono in particolare, la Santoreggia e la Borragine. La prima *Santureja montana* famiglia *Lamiaceae*, risulta essere molto importante per gli insetti pronubi; è caratterizzata da un portamento arbustivo, i cespugli, nel momento di massima vegetazione, raggiungono un'altezza di 0,35 m. Si presenta con foglie lanceolate e fiori viola. È una pianta molto rustica che resiste bene al freddo e non ha particolari esigenze nutrizionali. Il trapianto avviene in primavera con un sesto di impianto pari a 50x30 cm. Questa specie oltre ad essere utilizzata come aroma a livello culinario è utile anche a livello erboristico. La Borragine, *Borrago officinalis* famiglia *Borraginaceae*, è un'erba spontanea utile per gli insetti pronubi per l'orto, è caratterizzata da un portamento arbustivo, al momento di massima vegetazione raggiunge 0,50 m di altezza. Le radici sono fittonanti e si sviluppano profonde nel suolo. Si caratterizza per i suoi fiori con cinque petali blu disposti a stella, utili per l'orto e per l'agricoltura, in quanto attraggono insetti utili. Come molte specie infestanti è di semplice coltivazione, presenta inoltre fiori commestibili utilizzati a livello culinario. Può essere seminata in primavera e la sua presenza nel campo si protrae per tutto l'anno; alle prime gelate la pianta muore disseminando in modo autonomo i suoi semi, il sesto di impianto è di 50x20 cm.

### 7.3 Lavorazioni

Le lavorazioni del terreno sono un'importante pratica agronomica volta a creare e mantenere, mediante operazioni meccaniche eseguite dall'uomo, un profilo colturale idoneo a favorire la nascita e lo sviluppo delle piante. Gli obiettivi delle lavorazioni sono molteplici:

- ripristinare e migliorare la struttura del suolo;
- aumentare la porosità, promuovendo i processi di respirazione radicale e l'attività dei microrganismi;
- regolare il bilancio idrico, aumentando la permeabilità, favorendo l'immagazzinamento dell'acqua negli strati inferiori, riducendo le perdite di evaporazione con l'interruzione della capillarità e limitando il ruscellamento;
- migliorare il radicamento e l'espansione radicale;
- ripulire il terreno dalle infestanti e da alcuni parassiti animali e vegetali;
- interrare concimi, sementi e residui colturali;
- aumentare la capacità di riscaldamento del terreno influenzando sugli elementi che la limitano (umidità, presenza dei residui colturali, conformazione della superficie);
- consentire la preparazione di un buon letto di semina e facilitare le operazioni colturali (irrigazioni, raccolta).

Le lavorazioni del terreno si possono classificare in modo cronologico come segue:

- preliminari o di messa a coltura (disboscamento, spietramento, spianamento, scasso e dissodamento)
- preparatorie principali (aratura);
- preparatori complementari (estirpatura, erpicatura, fresatura, rullatura);
- consecutive e colturali (erpicatura, scarificazione, sarchiatura, rincalzatura, rullatura fresatura).

Nel presente progetto le lavorazioni di messa a coltura non verranno effettuate in quanto la superficie interessata è già utilizzata a scopo agricolo.

### 7.3.1 Lavori preparatori principali

Questo tipo di lavorazioni viene effettuato tra la raccolta di una coltura e la semina o la piantagione della successiva. A volte sono preceduti da operazioni preliminari di trinciatura e interrimento parziale o totale dei residui colturali. Servono per ottenere un miglioramento duraturo delle condizioni del terreno. Detti lavori corrispondono ad: aratura, vangatura, fresatura e scarificazione.

L'aratura è una delle tecniche di lavorazione più utilizzate, consiste nel ribaltare la fetta di terreno dopo aver proceduto al distaccamento dal suolo. Lo scopo è dunque quello di rimescolare gli strati superficiali del terreno, riossigenare il suolo, ricreare la struttura glomerulare, aumentare la capacità idrica, interrare i residui colturali o i concimi. L'aratura presenta alcuni aspetti negativi come quelli di riportare in superficie strati inerti, distruggere degli aggregati strutturali del suolo, ossidare mineralizzare e diminuire la sostanza organica. Per questo per evitare l'alterazione della stratigrafia del suolo e l'eccessivo ribaltamento degli orizzonti, per il progetto in oggetto si opterà per l'utilizzo della scarificazione o ripuntatura. Suddetta lavorazione si utilizza in sostituzione all'aratura e permette di ottenere il minimo disturbo del suolo con conservazione della fertilità, mancato trasporto in superficie di suolo indesiderato, parziale interrimento delle erbe infestanti, dei residui colturali e dei concimi. I vantaggi di questo tipo di lavorazione sono: miglior utilizzo della potenza della trattrice, diminuzione dei consumi energetici e dei tempi di lavorazione, conservazione della fertilità, limitazione della formazione della suola di lavorazione.

La lavorazione complementare alla ripuntatura corrisponde alla fresatura. Tale lavorazione consiste nell'amminutamento del terreno eseguito con strumenti il cui corpo lavoratore è un rotore orizzontale dotato di utensili rigidi (zappatrice) o elastici (fresatrice). Come lavoro principale si sostituisce all'aratura e ai lavori complementari nella preparazione del letto di semina. È convenientemente utilizzata in terreni sciolti o di medio impasto. I vantaggi di questa lavorazione sono: preparazione del letto di semina in un unico passaggio, diminuzione della zollosità, interrimento concimi, sminuzzamento dei residui colturali, distruzione delle infestanti annuali. La profondità di lavoro corrisponde ai 15-20 cm.

### 7.3.2. Lavorazioni complementari e di coltivazione

Le lavorazioni complementari si rendono necessarie in quanto l'aratura o la ripuntatura non risultano sufficienti per la preparazione di un adeguato letto di semina. I lavori di coltivazione invece si realizzano dopo la semina o impianto e hanno la funzionalità di mantenere la stabilità della coltivazione e di ottenere una produzione efficiente.

Tra queste lavorazioni si annoverano:

-Ercatura: è una lavorazione superficiale caratterizzata da una profondità di 10-20 cm, di norma completa l'aratura. Come lavorazione preparatoria complementare sminuzza e frantuma le zolle, livella il terreno, interra i concimi ed elimina le infestanti. Come lavorazione consecutiva, rompe la crosta superficiale in colture non sarchiate, interra i semi, diserbanti e concimi, elimina le infestanti superficiali nelle colture in atto.

-Rullatura: questa è una lavorazione complementare che si esegue per facilitare la circolazione dell'acqua e per far aderire le particelle di suolo al seme ed alle radici. Importante è il momento di intervento, in quanto con terreno troppo secco si ha un'eccessiva polverizzazione e le zolle non vengono rotte ma compresse nello strato attivo; se il terreno è troppo umido e quindi plastico si può avere l'occlusione definitiva degli spazi vuoti. Come lavorazione di coltivazione questa comprime il suolo scalzato dal gelo favorendo il radicamento delle colture invernali.

-Sarchiatura: è la lavorazione consecutiva più importante e consiste nello smuovere lo strato più superficiale del terreno (2-5 cm). Gli effetti maggiori che si ottengono sono: distruzione delle infestanti, eliminazione della crosta superficiale con successivo arieggiamento delle piantine, riscaldamento del terreno, interrimento dei concimi aumentando la permeabilità superficiale ed influenzamento del bilancio idrico nel terreno. A tal proposito, infatti, lo strato mosso viene arieggiato essiccandosi più rapidamente e ottenendo così un effetto pacciamante che limita il fenomeno della crepacciatura ed interrompe i casi di risalita capillare evitando ulteriori perdite di acqua per evaporazione;

-Rincalzatura: consiste nell'addossare una certa quantità di terreno ai piedi della pianta solitamente utilizzando degli aratri assolcatori. Ha diverse funzioni: proteggere le piante dai geli invernali e dalle brinate tardive, preparare il terreno all'irrigazione per infiltrazione laterale, eliminare infestanti e migliorare il radicamento favorendo l'emissione delle radici avventizie.

Le lavorazioni rappresentano, forse, la maggiore problematica per lo sviluppo del sistema integrato agrivoltaico; il sistema deve essere sviluppato con misure e larghezze tali da permettere il passaggio dei mezzi agricoli. In particolare, come suddetto, la larghezza massima dell'interfila corrisponde a 5 m e la larghezza minima corrispondente al momento della giornata in cui i pannelli sono orientati a 180 ° è di 2,83 m. L'ampiezza dell'interfila ritenuta coltivabile corrisponde a 3,73 m. Per le lavorazioni si potrà utilizzare una trattrice, cosiddette trattrici "strette" già ampiamente utilizzate in zona per le lavorazioni effettuate al di sotto del vigneto. Tali trattrici sono caratterizzate da una larghezza compresa tra 0,90 e 1,25 m, luce da 0,20 e 0,35 m, ruote di diametro ridotto, grande manovrabilità, ridotta distanza tra l'asse posteriore e l'estremità dell'attrezzo portato, sedile del conducente tenuto in posizione bassa. Di solito la potenza di queste trattrici è compresa normalmente tra 30 kW e 55 kW. (**Fig.17**)

Per le lavorazioni, gli attrezzi agricoli utilizzabili sono:

-Ripuntatore: larghezza massima di ingombro pari a 200 cm, larghezza di lavorazione 170 cm;

-Fresatrice agricola: larghezza massima 138 cm, larghezza di lavorazione 114 cm;

-Spandiconcime: dimensioni 163x127x92 cm;

-Trapiantatrice agevolatrice: fino ad 8 file (corrispondenti ad 8 moduli), per ottenere una larghezza minima è possibile utilizzare anche solo una fila o massimo due raggiungendo così una larghezza massima di 100 cm;

-Seminatrice: a seconda dei moduli da aggiungere potrà raggiungere una larghezza massima di 2,55 m, larghezza corrispondente al telaio principale.

-Sarchiatrice: 6 file, larghezza 350 cm;

-Rincalzatrice: larghezza massima di ingombro pari a 200 cm.

Per la maggior parte delle coltivazioni, la raccolta non potrà avvenire con le solite macchine raccogliatrici, in quanto, queste, sono caratterizzate da una larghezza di lavorazione elevata rispetto allo spazio a disposizione presente nel sistema agrivoltaico. Per questo la raccolta è da effettuarsi a mano oppure con macchine parcellari caratterizzate da una larghezza che va dai 125 ai 150 cm.



**Figura 17:** Immagini esemplificative di una trattore da frutteto (in alto) e di una mietitrebbia parcellare (in basso).

## 7.4 Irrigazione

L'irrigazione deve soddisfare il fabbisogno idrico della coltura evitando di superare la capacità di campo, allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione dei nutrienti e lo sviluppo di avversità. I volumi di irrigazione sono determinati in relazione al bilancio idrico che deve tener conto delle differenti fasi fenologiche, delle tipologie di suolo e delle condizioni climatiche dell'ambiente di coltivazione. Facendo riferimento alla sistemazione dei terreni, le diverse tecniche seguite nell'erogazione dell'acqua possono essere ricondotte a tre gruppi fondamentali: metodi per espansione superficiale, metodi per aspersione e a microportata di erogazione e subirrigazione nella quale l'apporto idrico viene erogato al di sotto della superficie. Per la superficie interessata e per il tipo di coltivazioni selezionate è stato scelto il metodo di irrigazione a microportata. Questo metodo permette di erogare l'acqua in piccolissime quantità attraverso numerosi gocciolatori presenti sulla tubazione (generalmente in PVC). Queste tubazioni sono poste sul terreno. I vantaggi del sistema a microportata sono molteplici:

- Viene bagnata solo la frazione di terreno interessata dagli apparati radicali;
- Consentono un'elevata efficienza irrigua (90%);
- Limitano notevolmente la crescita delle erbe infestanti;
- Evitano fenomeni di ruscellamento, erosione e costipamento del suolo;
- Riducono le perdite per evaporazione e non favoriscono la formazione di crosta;
- Non sono influenzati dalla ventosità;
- Non bagnano la coltura;
- Necessitano di pressioni di esercizio basse diminuendo anche la i costi di pompaggio;
- Bassa richiesta di manodopera e sono facilmente automatizzabili;
- Particolarmente indicati per distribuire fitofarmaci, fertilizzanti ed erbicidi;
- Consentono l'esecuzione di altre operazioni colturali durante l'intervento irriguo.

Questo sistema necessita però di filtraggio delle acque per evitare l'ostruzione dei gocciolatori.

## 7.5 Trapianto e semina

Le modalità di trapianto e semina (epoca, distanze e densità) devono consentire di raggiungere le rese produttive adeguate, nel rispetto dello stato fitosanitario, ottimizzando l'uso dei nutrienti e consentendo il risparmio idrico. Le coltivazioni saranno realizzate rispettando i sestri di impianto definiti dal Disciplinare di Produzione Integrata Puglia 2021. (**Tab. 7 e 8**)

Coltura	Sesto di impianto	di Estensione	Numero di interfila	di Lunghezza	N° di file per interfila, e n° di piante per fila
<b>Spinacio</b>	40x20 cm	8,99 ha	89	200 m	6 file 900 p/fila
<b>Cavolo</b>	80x50 cm	12,16 ha	183	210 m	3 file 400 p/fila
<b>Broccolo</b>					
<b>Cavolo Verza</b>	60x50 cm	12,16 ha	183	210 m	4 file 400 p/fila
<b>Tulipano</b>	25x10 cm	3,2 ha	58	80 m	10 file 800 p/fila
<b>Lavanda</b>	50x50 cm	5,4 ha	49	170 m	5 file 340 p/fila
<b>Finocchio</b>	50x25 cm	6,2 ha	64	210 m	5 file 800 p/fila

<b>Carota</b>	25x8 cm	8,99 ha	89	200 m	10 file 2500 p/fila
<b>Lenticchia</b>	50x15 cm	24,32 ha	366	210 m	5 file 1400 p/fila
<b>Arachide</b>	40x15 cm	3,2 ha	58	80 m	6 file 530 p/fila
<b>Rucola</b>	25x10cm	6,2 ha	64	210	10 file 2.100 p/fila
<b>Sulla</b>	20 kg/ha	5 ha	/	/	/

**Tabella 7:** Tabella illustrante i sestini di impianto e la densità delle colture in oggetto. Si è considerato come larghezza dell'interfila 2,5 m, in quanto viene calcolato anche lo spazio da lasciare per permettere il passaggio delle macchine agricole.

<b>Coltura</b>	<b>Sesto di impianto</b>	<b>Lunghezza recinzione</b>	<b>N° di piante</b>
<b>More</b>	2,0x0,80 m	4.201 m	5.251 p
<b>Corbezzolo</b>	5,0x5,0 m	1.109 m	221 p
<b>Passiflora incarnata</b>	0,75x0,45 m	1.244 m	2.764 p
<b>Alloro</b>	1,0x1,0 m	1.131 m	1.131 p

**Tabella 8:** Tabella illustrante il numero di piante ipotizzate per la realizzazione delle fasce ecologiche adiacenti al recinto.

## 7.6 Concimazione

Per un'opportuna concimazione nel rispetto dei fabbisogni colturali e in un'ottica di sostenibilità, sarà messa in atto la tecnica della fertirrigazione; quest'ultima consiste nello spargimento di acqua e sostanze fertilizzanti. Il materiale concimante, opportunamente miscelato in acqua e dosato alla concentrazione voluta mediante apposite apparecchiature, verrà introdotto nella rete irrigua e distribuito con sistemi a pressione o a gravità sulle colture. I vantaggi dell'utilizzo di questo metodo sono: riduzione dei tempi di distribuzione, minor danno al terreno per la diminuzione dei passaggi delle macchine e possibilità di adattare la concimazione azotata alle esigenze della pianta.

La coltivazione si rifarà all'utilizzo del disciplinare di produzione integrata della regione puglia. Per questo, per il piano di concimazione verranno calcolati gli opportuni fabbisogni colturali e si terrà conto delle schede tecniche di ogni coltura oggetto di coltivazione.

## 7.7 Difesa integrata

Per la difesa delle colture in oggetto verranno utilizzati i criteri di difesa integrata. Questi comprendono tutti quei criteri d'intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell'ottica di un minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili. La difesa si deve sviluppare valorizzando prioritariamente tutte le soluzioni alternative alla difesa chimica che possano consentire di razionalizzare gli interventi salvaguardando la salute degli operatori e dei consumatori, allo stesso tempo limitando i rischi per l'ambiente in un contesto di agricoltura sostenibile.

Quindi occorrerà:

- adottare sistemi di monitoraggio razionali che consentano di valutare adeguatamente la situazione fitosanitaria delle coltivazioni;
- favorire l'utilizzo degli ausiliari e la difesa a basso apporto di prodotti chimici attraverso l'adozione di tecniche agronomiche e mezzi alternativi;
- razionalizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari limitandone la quantità, lo spreco e le perdite per deriva, ruscellamento e percolazione;
- mettere a punto adeguate strategie di difesa che consentono di prevenire e gestire lo sviluppo di resistenze dei parassiti ai prodotti fitosanitari.

Con i disciplinari di difesa integrata si stabiliscono per ogni coltura le tecniche di difesa da utilizzare.

## 8.MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

### 8.1 Definizioni

Con "misure di mitigazione" si intendono diverse categorie di interventi:

- Quelle direttamente collegate agli impatti (ad esempio le barriere antirumore), esplicitate nella relazione delle mitigazioni e compensazioni.
- Le "opere di ottimizzazione" del progetto (le fasce vegetate);
- Le opere di compensazione, cioè gli interventi non strettamente collegati all'opera, che vengono realizzati a titolo di "compensazione" ambientale (ad esempio la creazione di habitat umidi o zone boscate o la bonifica e rivegetazione di siti, anche se non prodotti dal progetto in esame).

Il presente capitolo tratta le misure di mitigazione, intese come opere di ottimizzazione del progetto e opere di compensazione prettamente ambientale, riferite a fasce vegetate e creazione di habitat già presenti nel sito di intervento ma che a seguito della intensificazione dell'attività agricola sono stati degradati.

Le opere previste sono:

1. Misure per incremento e tutela della fauna e biodiversità. (Trattate anche nella relazione sulle mitigazioni e compensazioni);
2. Misure a protezione del suolo dagli inquinanti di origine agricola;
3. Misure per la tutela del paesaggio. (Trattate anche nella relazione sulle compensazioni e mitigazioni)

## 8.2 Misure per incremento e tutela della fauna e biodiversità

1. Isolette di specie a buona fioritura, sassaie e vegetazione prettamente mediterranea;
2. Siepi perimetrali;
3. Fasce di impollinazione.

### 1. Realizzazione di isole di specie a buona fioritura e sassaie

Come consigliato dalla relazione sulle compensazioni e mitigazioni, per ogni area progettuale sarà realizzata n°1 isoletta di specie a buona fioritura, più nello specifico si prevede:

- Isoletta area 1: caratterizzata da una superficie di circa 2.500 m<sup>2</sup> prevede la messa a dimora di circa 28 piante di *Buddleja davidii* (Albero delle farfalle) e 23 piante di Rose spp. Sarà inoltre creato un habitat ideale per i rettili tramite la creazione di sassaie. Saranno predisposte all'interno dell'area con minore superficie, circa per ogni stringa di impianto un totale di 96 piante di *Buddleja davidii* e 109 di Rose spp.
- Isoletta area 2: Per una superficie di circa 7.028 m<sup>2</sup>, è previsto il reimpianto di n° 39 ulivi con sesto di impianto di circa 10 x 10 m; inoltre al fine di creare un habitat prettamente mediterraneo si favorirà l'impianto di n° 4 piante rosmarino, n°3 origano, n° 3 Agave, oltre che la realizzazione di sassaie. All'interno dell'area di impianto saranno predisposte, circa per ogni stringa, 38 piante di *Buddleja davidii*.
- Isoletta area 3: l'area 3 è destinata alla coltivazione del tulipano, specie di grande valenza ornamentale, pertanto al fine di ottenere una armoniosità paesaggistica l'isoletta avente una superficie di circa 2.320 m<sup>2</sup>, sarà caratterizzata dall'impianto di n° 65 Erica, n° 14 piante di Ginestra e n° 9 piante di Cisto e per circa ogni stringa di impianto verranno predisposte 29 piante di Rose spp.
- Isoletta area 4: si caratterizza di una superficie di circa 2.490 m<sup>2</sup>, verranno messe a dimora n° 18 piante di Portulaca, n°13 piante di Menta, n° 13 di rosmarino e n° 17 di salvia. Anche in quest'ultima è prevista la realizzazione sassaie, all'interno di essa inoltre sono previste n° 5 arnie.

## 2.Siepi perimetrali

Le funzioni agro-ecologiche delle siepi sono:

- Funzioni di isolamento fisico tra microambienti e sistemi dissipativi;
- Funzioni di filtro selettivo, di microrganismi, polveri, pollini, assicurando una maggiore stabilità degli agro-ecosistemi interni;
- Funzione di superficie di comunicazione, tramite lo scambio della flora e della fauna in esse contenute, con gli agroecosistemi confinanti, conferendo maggiore stabilità a quest'ultimi;
- Funzione biochimica di superficie e sotto-superficiale (apparatî radicali) con scambio sinergico dei principi attivi con le specie circostanti.
- Sono luogo di conservazione e riproduzione dei predatori dei parassiti delle colture messe a dimora.
- Possono essere inoltre considerate elementi di diversificazione del paesaggio valorizzandolo.

Più nello specifico e come precedentemente riportato le specie interessate dal progetto saranno:

- Area 1: More (*Rubus ulmifolius*);
- Area 2: Alloro (*Laurus nobilis*);
- Area 3: Corbezzolo (*Arbutus unedo*);
- Area 4: Passiflora incarnata (*Passiflora incarnata*).

### 3. Fasce di impollinazione

L'agricoltura intensiva ed estensiva e l'uso dei pesticidi ed erbicidi sono tra i fattori di rischio più rilevanti per le api, sia selvatiche che allevate. Le monocolture rappresentano di per sé ambienti poco favorevoli alla sopravvivenza di queste, per la presenza di una sola tipologia di polline spesso di scarsa qualità, e per un periodo limitato nella stagione.

Una pubblicazione della IUCN sullo stato di conservazione delle api selvatiche, ha rilevato che il 4% delle specie di api conosciute in Europa è in pericolo di estinzione e un altro 5,2% corre il rischio di esserlo; il fenomeno della moria delle api prende il nome di “sindrome da spopolamento degli alveari” o CCD (*Colony Collapse Disorder*).

Per contrastare questo fenomeno, all'interno di tale progetto è prevista la realizzazione di fasce di impollinazione al di sotto delle stringhe di impianto per una superficie totale di 180.586,42 m<sup>2</sup>.

In particolare le specie interessate saranno: la borragine (*Borragio officinalis*) e la santoreggia (*Santureja montana*).

Inoltre è previsto lo sviluppo dell'apicoltura con la produzione di miele di sulla, per una superficie di circa 5 ha e 5 arnie.

### 8.3 Misure a protezione del suolo dagli inquinanti di origine agricola

Una delle prime cause di inquinamento da origine agricola è l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

*“Si definiscono prodotti fitosanitari i preparati contenenti una o più sostanze attive, destinate a proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti; influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti; conservare i prodotti vegetali, ecc..”*

Un prodotto fitosanitario è composto normalmente da quattro elementi: sostanza attiva, coadiuvante, coformulante e sinergizzante. Le modalità attraverso le quali i prodotti fitosanitari si disperdono nell'ambiente sono le seguenti:

- La **deriva**
- La **volatilità**;
- Il **ruscellamento**
- La **lisciviazione**

Nell'ambito di tale progetto seppur verranno applicate le Buone Pratiche Agricole allo scopo di realizzare un'agricoltura sostenibile, essendo la maggior parte delle coltivazioni specie orticole, non può essere totalmente esclusa l'applicazione di prodotti fitosanitari; pertanto con il fine di ridurre gli impatti sopra elencati, all'interno delle aree interessate saranno predisposte opportune misure di mitigazione.

In particolare: la fascia di rispetto vegetata e alcune superfici vegetate (tappeti vegetati) a protezione del suolo nel momento di lavaggio esterno dell'irroratrice.

## 1. Fasce di rispetto vegetate

Una fascia di rispetto vegetata è collocata nello spazio tra la sorgente emissiva, il prodotto inquinante (la barra, l'atomizzatore, il terreno trattato) e l'elemento da proteggere.

In particolare tali fasce saranno realizzate in Area 1 e Area 2, e saranno caratterizzate rispettivamente da una superficie di circa 700 m<sup>2</sup> e 600 m<sup>2</sup>. È prevista la coltivazione dell'erba medica (*Medicago sativa*); essa è caratterizzata da una crescita rapida, radici profonde ed è ampiamente utilizzata per il fitorisanamento dei suoli dai metalli tossici. (Grifferty et al., 2000; Peralta et al., 2001; Jadia et al., 2008)

L'esteso apparato radicale potenzia inoltre l'attività dei batteri degradanti, favorendo il tasso di biorisanamento da numerosi contaminanti organici come i policlorobifenili (PCB), idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e il trinitrotoluene (TNT). (Chekol et al., 2001; Fan et al., 2008; Sun et al., 2011).

## 2. Tappeti vegetati

Il piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, definisce le linee guida per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura. In particolare, nelle operazioni successive al trattamento è obbligatorio gestire correttamente ogni tipo di residuo al fine di evitare danni alle persone, agli animali e all'ambiente.

È importante eseguire inoltre la pulizia interna ed esterna dell'irroratrice, a cadenza regolare ma anche in relazione ai trattamenti da effettuare su colture differenti o sulla stessa coltura con prodotti fitosanitari differenti. Oltre al lavaggio interno dell'irroratrice, che se effettuato in campo prevede la dispersione dell'acqua residua sulla coltura appena trattata; il lavaggio esterno dell'irroratrice può essere effettuato in campo per mezzo di una lancia.

Al fine di mitigare l'inquinamento del suolo dovuto da eventuali residui di miscela presenti sulle componenti esterne dell'irroratrice, sarà predisposto nell'Area 1 un tappeto vegetato con funzioni di protezione e fitodegradazione.

Il tappeto vegetato sarà caratterizzato da una superficie di circa 1000 mq, e prevederà la coltivazione di Erba medica, Lino e Colza. Quest'ultime si distinguono per la capacità di degradare sia sostanze organiche che inorganiche presenti all'interno della miscela del trattamento.

## 9.MONITORAGGIO DELLA COLTIVAZIONE

L'attività di monitoraggio è utile sia alla verifica dei parametri fondamentali, quali la continuità dell'attività agricola sull'area sottostante gli impianti, sia di parametri volti a rilevare effetti sui benefici concorrenti. In particolare i parametri soggetti a monitoraggio saranno:

- Ambiente: temperatura dell'aria e umidità relativa;
- Piovosità: pluviometro;
- Vento: Velocità del vento;
- Sole: Radiazione solare totale, PAR e UV;
- Piante: Bagnatura fogliare;
- Suolo: Umidità, Temperatura e Conducibilità elettrica.

Tra tutti i parametri, a scopo agronomico, si esplicherà di seguito l'importanza dei sensori di bagnatura fogliare e di umidità, temperatura e conducibilità elettrica del suolo che permetteranno l'implementazione di tecniche di agricoltura 4.0, con maggiori benefici sia di efficientamento di utilizzo delle risorse idriche che delle concimazioni e gestione delle patologie.

### 9.1 Sensore di Bagnatura fogliare

La bagnatura fogliare è un parametro agronomico che permette di misurare la quantità di acqua che si accumula sulle superfici fogliari. Il sensore ha un comportamento simile a quello di una foglia e fornisce il grado di bagnatura fogliare in termini percentuali, viene utilizzato per il monitoraggio ambientale come il controllo di patogeni, sistemi di irrigazione e condizioni di umidità dovuti alla nebbia e rugiada.

### 9.2 Sensori di Umidità, Temperatura e Conducibilità elettrica del suolo

I sensori di umidità consentono una gestione dell'irrigazione in linea con le migliori pratiche irrigue che tengono conto della Capacità di Campo (FC), del Punto di Appassimento Permanente (PWP), del contenuto di acqua disponibile (AWC) e dell'intervallo ottimale di irrigazione (MAD), in base alla tipologia di terreno e della coltivazione.

Il contenuto di acqua disponibile (*Available Water Content, AWC*) è la quantità massima di acqua che il terreno può immagazzinare per essere estratta dalle piante. Si tratta dell'acqua trattenuta tra la capacità di campo e il punto di appassimento permanente.

Il valore di MAD (*Management Allowable Depletion*) specifica la % minima del contenuto di acqua disponibile (AWC) che si ritiene di voler mantenere nella gestione dell'irrigazione. Infatti, la coltura utilizza solo una parte della capacità di ritenzione idrica disponibile prima di sviluppare lo stress idrico. Quindi il valore di MAD è inferiore al suo AWC totale. I benefici che si ottengono dall'utilizzo di questo sensore sono risparmi significativi sull'utilizzo della risorsa idrica, riduzione del rischio di stress delle piante e incremento generale della coltivazione.

Il monitoraggio della temperatura del suolo risulta fondamentale in quanto quest'ultima influenza le reazioni biochimiche nel terreno, i processi fisiologici (fotosintesi, respirazione), i flussi di acqua e l'attività microbica. L'insieme di questi fattori determina la disponibilità di sostanza organica e dei nutrienti utili alla crescita delle piante.

Il sensore di conducibilità elettrica (ECB), misura la conducibilità elettrica totale che rappresenta la misura di tutti gli ioni che conducono elettricità all'interno delle soluzioni acquose del suolo. Dato che la concentrazione di sali minerali nell'acqua influenza direttamente la sua conduttività, la misurazione della conduttività elettrica è un modo per stimare le concentrazioni di sali minerali. Quest'ultimi sono fonti di nutrimento per la pianta e sono responsabili della crescita sia in senso di deficit che di eccesso. Inoltre una maggiore concentrazione di sali comporta una maggiore pressione osmotica che causa la diminuzione della capacità di assorbimento dell'acqua da parte delle radici.

In sintesi la conducibilità elettrica della soluzione circolante nel suolo, indicata come ECW, ottenuta dalla misurazione della ECB, è il parametro fondamentale da usare nella gestione della fertirrigazione in quanto fornisce la stima di sali minerali che effettivamente sono in circolazione nell'acqua interstiziale nei micropori e permette di definire il giusto apporto di nutrienti, ottenendo una migliore qualità del prodotto finale oltre che una coltivazione più sostenibile.

## 10. ANALISI MULTICRITERIO

L'analisi multicriterio consiste in un insieme di tecniche utilizzate per confrontare alternative sulla base di criteri diversi tra loro, tenendo conto in modo esplicito dell'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi. Diversamente da un'analisi costi-benefici, nella quale gli elementi rilevanti sono resi commensurabili riportandoli a grandezze monetarie, nell'analisi multicriterio i criteri decisionali sono espressi su una scala normalizzata e poi confrontati sulla base di un peso. I criteri di valutazione possono essere obiettivi del progetto o dei portatori di interesse, criteri tecnici, sociali etc. Le alternative vengono elencate nelle colonne della matrice, mentre i criteri di valutazione sono descritti nelle righe. Il grado di raggiungimento di ogni obiettivo da parte delle alternative considerate può essere indicato tramite un indice che può variare da 0 a 5 e assumere anche valori negativi nel caso di non raggiungimento dell'obiettivo, in questo caso il valore 0 assume valore nullo. Ad ogni criterio può essere quindi dato un peso (valore compreso tra 0 e 1) che può essere moltiplicato per ogni valore assegnato ai vari obiettivi. I valori di ogni obiettivo vengono sommati per ogni alternativa in modo da assegnare un punteggio totale ad ogni alternativa progettuale. L'AMC permette di arrivare alla scelta della soluzione preferibile in quanto tiene conto di tutti i benefici e gli impatti, inclusi quelli di difficile quantificazione.

	<b>VOCE</b>	<b>COLTIVAZIONE ATTUALE (SPECIE CEREALICOLE)</b>	<b>SISTEMA INTEGRATO AGRIVOLTAICO (COLTIVAZIONE DI SPECIE ORTICOLE ED INNOVATIVE)</b>
<b>1</b>	<b>Occupazione (impegno di personale)</b>	(+3) Parziale, meccanizzazione quasi completa.	(+5) Quasi totale, per le operazioni di trapianto, coltivazione e raccolta. Impiego di personale per la manutenzione del recinto vegetale/fascia ecologica. Altra voce è rappresentata dai tecnici impiegati nella costruzione e manutenzione dell'impianto.

2	<b>Fertilità agronomica del suolo (contenuto di sostanza organica)</b>	(+3) La coltivazione di specie cerealicole non viene effettuata con arature profonde, il sistema intensivo comunque comporta una perdita di sostanza organica.	(+4) Il sistema integrato agrivoltaico non permette lo sviluppo dell'agricoltura intensiva, non verranno effettuate lavorazioni profonde se non per la fascia ecologica.
3	<b>Effetti sul sistema idrico (consumo di acqua e qualità)</b>	(+2) Non necessita di irrigazione. Necessita di trattamenti antiparassitari e concimazioni, che inquinano le acque superficiali e di falda.	(+3) Necessita di irrigazione, con utilizzo del sistema a microportata di erogazione, sviluppo della fertirrigazione e monitoraggi dello stato delle piante che permettono di intervenire in via preventiva nella lotta delle patologie, diminuendo così l'apporto di prodotti fitosanitari.
4	<b>Utilizzo di carburanti fossili per le macchine agricole</b>	(+2) La quasi completa meccanizzazione richiede un elevato consumo di carburante.	(+3) La coltivazione richiede un ridotto utilizzo di macchine agricole, con una conseguente riduzione del consumo di carburante.
5	<b>Biodiversità floristica e faunistica</b>	(0) La coltivazione avviene con un sistema monocolturale, con minimo sviluppo della biodiversità.	(+5) La coltivazione permette di avere una biodiversità elevata dovuta alla coltivazione di più specie orticole ponendo attenzione alle varietà locali, alle fasce ecologiche ed alla coltivazione di specie importanti per gli insetti pronubi. Inoltre le opere di compensazione e mitigazione contribuiscono all'incremento di specie e diversificazione, favorendo ulteriormente la biodiversità.
6	<b>Margine lordo (valore economico del prodotto agricolo)</b>	(+3) Le colture cerealicole non permettono un reddito elevato.	(+5) Le colture orticole permettono un reddito elevato, la realizzazione di coltivazioni innovative permette lo sviluppo di nuove filiere incrementando ulteriormente questo reddito.
7	<b>Produzione di energia rinnovabile</b>	(0) La coltivazione delle specie cerealicole non permette la produzione di energie rinnovabili.	(+5) Il sistema integrato agrivoltaico permette la produzione di energia rinnovabili raggiungendo annualmente 37,68 MW.
	<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>30</b>

La matrice costruita confronta i due sistemi, quello attuale e quello futuro, in base ad alcuni criteri socioeconomici ed ambientali. Si assume che tutti i criteri abbiano un'egual misura pari a 1. La matrice evidenzia come il sistema integrato agrivoltaico abbia un punteggio significativamente maggiore pari a 30, rispetto al sistema colturale attuale con punteggio pari a 13. Risulta evidente come il sistema agrivoltaico rende possibile il raggiungimento di maggiori obiettivi rispetto al sistema di semplice coltivazione; quindi, il suo sviluppo risulta favorevole per il territorio in oggetto.

## 11. CONCLUSIONI

Dagli studi e le analisi effettuate si evince che il sistema agrivoltaico:

- ✓ si integra bene con la coltivazione di specie orticole a portamento basso;
- ✓ l'acqua di lavaggio dei pannelli non costituisce una problematica in quanto non vengono utilizzati solventi;
- ✓ i cavi interrati non costituiscono un ingombro per le lavorazioni in quanto interrati ad 0,80 m seguendo uno schema ben preciso;
- ✓ il monitoraggio costante della coltivazione permetterà l'utilizzo di sistemi di supporto delle decisioni, utili alle irrigazioni e al controllo dei patogeni ed allo stato delle colture, favorendo l'utilizzo delle buone pratiche agricole.
- ✓ favorisce la biodiversità, tramite la coltivazione di più specie orticole tradizionali, e specie officinali contribuendo anche alla conservazione del materiale genetico.
- ✓ favorisce lo sviluppo di nuove filiere, coltivando specie innovative per il territorio.

Il sistema previsto rispetta gli indici identificati dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici (Giugno 2022), di cui all'art. 2 del decreto legislativo n.199 del 2021; in quanto dal calcolo delle superfici, risulta un valore di LAOR minore del 40% (**23,94%**) ed un indice di coltivabilità maggiore del 70% (**76,05%**); prevede inoltre lo sviluppo delle tecniche di agricoltura 4.0 ed il mantenimento della coltivazione è garantito per tutti gli anni di attività dell'impianto.

Infine, così come risulta dall'analisi multicriterio lo sviluppo del sistema agrivoltaico nei territori in oggetto, può rappresentare una valida alternativa alla coltivazione tradizionale.

## 12. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

1. Adeh, E. H., Selker, J.S. & Higgins, C.W. Remarkable agrivoltaic influence on soil moisture, micrometeorology and water-use efficiency. Plos One 13, doi: 10.1371/journal.pone.0203256 (2018).
2. Toledo C. & Sconamiglio A. Agrivoltaic System Design and Assessment: A Critical Review, and a Descriptive Model towards a Sustainable Landscape Vision (Three-Dimensional Agrivoltaic Patterns).
3. Svanera L., Ghidese G. & Knoche R. Agrovoltaico: 10 Years Design and Operation Experience. AIP Conference Proceedings 2361, 090002; <https://doi.org/10.1063/5.0055869>. (2021)
4. Disciplinare di Produzione Prodotti di Qualità Puglia: Alberi da frutto.
5. Disciplinare di Produzione Prodotti di Qualità Puglia: Ortaggi a Frutto.
6. Disciplinare di Produzione Prodotti di Qualità Puglia: Ortaggi in Foglia o A Fusto.
7. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia- n.40 del 18-3-2021, Determinazione del Dirigente sezione competitività delle filiere agroalimentari 2 marzo 2021, n.67. “Disciplinare di Produzione Integrata Regione Puglia”, adozione “Piano di Controllo Nazionale” - Anno 2021.
8. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia- n.60 del 29-4-2021, Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio fitosanitario 21 aprile 2021, n. 32, Norme Eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie nella Regione Puglia- Aggiornamento 2021.
9. <https://biodiversitapuglia.it>
10. Giardini, L., 2012, Patron editore, “L’agronomia per conservare il futuro”, sesta edizione.
11. Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, Giugno 2022.