Unità Mappa	Caratteristiche pedologiche	Soil Taxonomy (1975 - 1997)	Legenda FAO - Unesco (1988)	Destinazioni d'uso
a - paesaggi delle formazioni metamorfiche del Paleozoico (filladi, filladi sericitiche, quarzitoscisti, gneiss, ecc.), e relativi depositi di versante				
2	I suoli hanno profili di tipo A, A/ Bw, A/ Bw/ BC, C/ A/ Bw/ BC, C/ A/ Bw/ C, con potenza inferiore a 30 - 35 cm il profilo e l'orizzonte Bw presenta spesso caratteri vertici. Tessitura da franca a franco argillosa a franca. Reazione subacida o di tinta tra subacida e neutra. Saturazione in basi da media a molto elevata. Capacità di scambio cationico da moderata a molto elevata. Il valore di saturazione in basi è molto elevato. Il contenuto in sostanza organica è da medio a basso. Il rapporto C/N è da medio a basso e i dati mostrano molto filmi e/o substrati costituiti da depositi colluviali fortemente pedogenizzati. I suoli hanno profili A, A/ Bw, A/ Bw/ BC, C/ A/ Bw/ BC, C/ A/ Bw/ C, con Bw/ BC/ C/ A/ Bw/ C/ A/ Bw/ C/ A/ Bw