

## LEGENDA:

## Categorie forestali

- Mrbusteti
- Castagneti
- Селете Conifere varie, pure o miste
- Faggete
- Formazioni riparie Latifogli e varie, pure o miste
- Leccete
- Orno-ostrieti
- 🧱 Pineta di Villetta Barrea
- Pineta naturale di Pino nero di Villetta Barrea
- Querceti di Roverella
- Robinieto-ailanteti

## Tipologie forestali

- Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili
- IIII Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fasicia montana e sub
- Arbusteto a prevalenza di ginestre
- Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo
- IIII Arbusteto a prevalenza di specie della macchia macchia
- Boscaglia pi oni era calanchiva
- Boschi di forra
- Castagneto (neutrofilo-acidofilo)
- Castagneto da frutto
- Cerreta mesofila
- Cerreta mes oxerofila Faggeta altomontana rupestre
- Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila) 📙 Faggeta termofila e basso montana
- 🌃 Latifoglie di invasione miste e varie
- Lecceta costiera termofila:
- Lecceta mesoxerofila
- Lecceta rupicola 🌉 Mugheta appenninica

Ostrieto mesofilo

- Orno-ostrieto pioniero
- Ostrieto mesoxerofilo
- 📕 Pineta naturale di Pino nero di Villetta Barrea
- Pioppeto di pioppo tremulo
- Pioppo-saliceto ripariale
- 💹 Querceto a roverella pioniero
- Querceto a roverella tipico Querceto di roverella mesoxerofilo
- Rimboschimiento di conifere mediterranee
- Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e subm
- Rimboschimento di conifere nella fascia montana
- Robinieto-ailanteto
- Variante abete bianco

