tipi di vegetazione berchidda eolico 2023

Id

- 1 — Rimboschimento; consociazione di Pinus nigra con Quercus suber e Q. ilex; parzialmente bruciato; vegetazione arbustiva composta prevalentemente da Erica arborea, Cistus monspeliensis, Cistus Salvifolius, Lavandula stoechas
- Scarpata stradale; vegetazione arborea composta da radi allievi di Pinus nigra; vegetazione arbustiva composta prevalentemente da Erica arborea, Cistus monspeliensis, Cistus Salvifolius
- 4
- pascolo e gariga
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- PERIMETRI INTERVENTO
- WTG

cod	descrizione
1	**Banchina stradale**; area degradata infestata da Inula viscosa
4	**Scarpata stradale**; vegetazione arborea con radi giovani di Pinus nigra, vegetazione arbustiva, prevalentemente Erica arborea, Cistus monspeliensis, Cistus salvifolius
5	**Rimboschimento**; consociazione di Pinus nigra con Quercus suber e Quercus ilex; parzialmente bruciato; vegetazione arbustiva, prevalente Erica arborea, Cistus monspeliensis, Cistus monspeliensis, Lavandula stoechas
6	**Scarpata stradale**; vegetazione erbacea
7	**Rimboschimento trattato a taglio raso del Pinus nigra (2013-2014)**; ex vivaio taglio del cipressuolo arbustivo; vegetazione arborea molto rada con alberetti sfilati di Quercus suber e Quercus ilex; vegetazione arbustiva con prevalente Inula viscosa, poi Cistus monspeliensis, Cistus salvifolius, polloni di Erica arborea e scoparia, Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, Myrtus communis, Lavandula stoechas, Citisus villosus; vegetazione erbacea: briofite frequenti, poacee come brachypodium spp, Asphodelus spp, Crocus minimus, Galactites tomentosa, Carlina corymbosa, Sanguisorba minor, Leontodon saxatile, Pilosotemnon cavaborae, Cynara cardunculus
8	**Scarpata stradale**; vegetazione arborea con radi giovani di Quercus ilex e suber; vegetazione arbustiva alta fino a 3-4 mt con Arbutus unedo e Erica arborea, anche in forma di alberetto, Lavandula stoechas, Cistus monspeliensis e salvifolius
9	**Scarpata stradale**; vegetazione arborea con radi alberi giovani e plantule di Quercus suber e Ilex; rada vegetazione arbustiva alta fino a 1,5 mt, prevalente Erica arborea, Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, Lavandula stoechas, Cistus monspeliensis
10	**Rimboschimento**; consociazione di Pinus nigra dominante (1) - 12 mt), con Quercus suber e Quercus ilex dominati, sfilati (altezze fino a 6 mt); vegetazione arbustiva con Arbutus unedo e Erica scoparia (altezze fino a 4 - 6 mt), altre specie frequenti; Rubus ulmifolius, Smilax aspera; filto fetro di agli di pino, tronchi di Pinus nigra secchi ed in decomposizione
11	**Rimboschimento**; vegetazione arborea con radi plantule e giovani alberi di Quercus suber e Ilex; vegetazione arbustiva rada (altezze da 0,5 - 2 mt) con Erica arborea, Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, Lavandula stoechas
12	**Rimboschimento**; consociazione di Pinus nigra dominante (8 - 15 mt), con Quercus suber e Quercus ilex dominati, sfilati; vegetazione arbustiva prevalente con Arbutus unedo e Erica scoparia (altezze fino a 2 - 3 mt), Rubus ulmifolius, Smilax aspera
13	**Nucleo di vegetazione preesistente il rimboschimento**; vegetazione arborea con individui adulti di Quercus suber; vegetazione arbustiva (alta da 0,5 a 3-4 mt) con Erica Arborea e Arbutus unedo, rari alberetti di Juniperus oxycedrus; Lavandula stoechas, Cistus monspeliensis e salvifolius
14	**Superfici non rimboschite**;vegetazione arborea con giovani alberi e plantule di Quercus suber e Ilex; vegetazione arbustiva (alta da 0,5 a 3-4 mt) con Erica Arborea, Arbutus unedo e Juniperus oxycedrus anche come alberetti; Calycotome villosa, Lavandula stoechas, Cistus monspeliensis e salvifolius
15	**Superfici rocciose con pietraccia superficiale**; rari Juniperus oxycedrus giovani e Phillyrea angustifolia, prevalente Cistus monspeliensis e salvifolius Lavandula stoechas; meno frequente Calycotome spinosa; vegetazione erbacea, frequente Asphodelus spp, briofite, Crocus minimus, Carlina corymbosa
16	**Superficie rimboschita trattata a taglio raso di Pinus nigra (2013-2014)**; vegetazione arborea rada composta da poche o nessuna matricina di Pinus nigra; pacci frequenti giovani alberi e plantule di Pinus nigra, Quercus suber e Quercus ilex; vegetazione arbustiva fitta alta fino a 1,5 mt composta prevalentemente da Cistus monspeliensis, Cistus salvifolius, Erica arborea e scoparia, Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, Lavandula stoechas; specie erbacee: briofite frequenti, poacee come Brachypodium spp, Asphodelus spp, Crocus minimus, Galactites tomentosa, Carlina corymbosa, Sanguisorba minor, Leontodon saxatile, Pilosotemnon cavaborae, Cynara cardunculus
17	**Rimboschimento su superfici sottoposte a esbosco del Pinus nigra nel 2013-14**; giovani alberi di Pinus nigra, giovani alberi e plantule di Quercus suber e Ilex; vegetazione arbustiva fitto (fino a 2-3 mt) prevalentemente costituita da Arbutus unedo e Juniperus oxycedrus anche come alberetto, Erica scoparia, Phillyrea angustifolia, Myrtus communis, Cistus monspeliensis e salvifolius, meno frequente Daphne gnidium e Calycotome spinosa
18	Rimboschimento su superfici di compluvio a/o con migliori condizioni edafiche, sottoposte a esbosco del Pinus nigra nel 2013-14; giovani alberi di Pinus nigra, giovani alberi e plantule di Quercus suber e Ilex; vegetazione arbustiva (fino a 3-4 mt), a tratti impenetrabile, prevalentemente costituita da Arbutus unedo e Juniperus oxycedrus anche come alberetto, Erica scoparia, Phillyrea angustifolia, Myrtus communis, Cistus monspeliensis e salvifolius, meno frequente Daphne gnidium
19	**Rimboschimento su superfici sottoposte a esbosco del Pinus nigra nel 2013-14**; giovani alberi e plantule di Quercus suber e Ilex; vegetazione arbustiva penetrabile, alta 1 mt, prevalente Erica scoparia, Cistus monspeliensis e salvifolius, Arbutus unedo e Juniperus oxycedrus anche come alberetto, Phillyrea angustifolia, Myrtus communis, meno frequente Daphne gnidium
20	**Rimboschimento; consociazione prevalente Quercus suber e Quercus ilex**; buone condizioni edafiche rispetto ai suoli adiacenti; vegetazione arborea costituita da giovani alberi e plantule di Quercus suber e Ilex (rari giovani alberi di Pinus nigra); vegetazione arbustiva a tratti impenetrabile (alta da 1 a 1,5 mt), prevalentemente costituita da Arbutus unedo e Juniperus oxycedrus anche come alberetto, Erica scoparia, Phillyrea angustifolia, Myrtus communis, Cistus monspeliensis e salvifolius, meno frequente Daphne gnidium e Cytisus villosus
21	**Rimboschimento consociazione Quercus suber e Quercus ilex**; vegetazione arborea costituita da radi giovani alberi e plantule di Quercus suber e Ilex; vegetazione arbustiva penetrabile (alta da 1 a 2 mt), prevalentemente costituita Cistus monspeliensis e salvifolius, meno frequente Erica scoparia, Phillyrea angustifolia , Myrtus communis
22	**Nucleo di vegetazione naturale; alberi adulti di Quercus suber**; vegetazione arbustiva fitta, impenetrabile (alta fino a 5 - 6 mt) con Erica Arborea e Arbutus unedo, alberetti di Juniperus oxycedrus; Lavandula stoechas, Cistus monspeliensis e salvifolius

Comune di: BERCHIDDA

Provincia di: SASSARI

Regione: SARDEGNA

Provincia di Sassari

Regione Autonoma della Sardegna

PROPONENTE

VIGORITO
ORESTE
18.10.2023
14:41:44
GMT+01:00

OPERA

PROGETTO IMPIANTO EOLICO DI BERCHIDDA

OGGETTO

TITOLO ELABORATO:

CARTA VEGETAZIONE AREA PROGETTO

DATA:	GIUGNO 2023	N°/CODICE ELABORATO	
SCALA:	1:5.000	SA_TAV. 3	
Folder:		Tipologia: D	Lingua: ITALIANO

N° REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	ELABORAZIONE.